



Encuesta Nacional de Adicciones 2002

Secretariado Técnico del
Consejo Nacional contra las Adicciones

Encuesta Nacional

de Adicciones 2002



EPIDEMIOLOGÍA



Primera Edición

Encuesta Nacional de Adicciones 2002

ISBN: 970-721-314-0

Secretaría de Salud

Directorio

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud

Dr. Enrique Ruelas Barajas
Subsecretario de Innovación y Calidad

Dr. Roberto Tapia Conyer
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. María Eugenia de León May
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Jaime Sepúlveda Amor
Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud

Dr. Gabriel García Pérez
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Dr. Eduardo González Pier
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Juan Antonio García Villa
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. Carlos Tena Tamayo
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Act. Juan Antonio Fernández Ortíz
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Adriana Cuevas Argumedo
Directora General de Comunicación Social

Dr. Cristóbal Ruíz Gaytán López
Secretario Técnico del Consejo Nacional
contra las Adicciones

Encuesta Nacional de Adicciones 2002

Diseño conceptual

Dra. Ma. Elena Medina-Mora, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Dra. Patricia Cravioto, Dirección General de Epidemiología

Lic. Jorge Villatoro, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Dr. Pablo Kuri Morales, Dirección General de Epidemiología

Dr. Cristóbal Ruíz Gaytán Lopez, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. José Manuel Castrejón Vacio, Consejo Nacional contra las Adicciones

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

Diseño muestral y levantamiento de campo

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

Supervisores de campo

Lic. Estela Rojas, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Lic. Clara Fleiz B, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Lic. Ma. Guadalupe Corona Uscanga, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. Raquel Solís Sánchez, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. Lidia Mora Cuellar, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. Juan Carlos Gerardo Guzmán, Consejo Nacional contra las Adicciones

Capacitación de trabajadores de campo (aspectos conceptuales)

Lic. Jorge Villatoro, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Lic. Clara Fleiz, Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"

Capacitación de trabajadores de campo (marco muestral y logística de campo)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

Procesamiento

Lic. Jorge Villatoro, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”

Fis. Mat. Fernando Galván, Dirección General de Epidemiología

Lic. José Manuel Castrejón Vacio, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. Alma Rosa García Blancas, Consejo Nacional contra las Adicciones

Lic. Blanca Estela Jiménez, Dirección General de Epidemiología

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

Análisis

Dra. Ma. Elena Medina-Mora, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”

Dra. Patricia Cravioto, Dirección General de Epidemiología

Lic. Jorge Villatoro, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”

Fis. Mat. Fernando Galván, Dirección General de Epidemiología

Lic. José Manuel Castrejón Vacio, Consejo Nacional contra las Adicciones

Dr. Pablo Kuri, Dirección General de Epidemiología

Dr. Cristóbal Ruíz Gaytán Lopez, Consejo Nacional contra las Adicciones

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.

Revisión conceptual y metodológica

Lic. Alma Rosa García Blancas, Consejo Nacional contra las Adicciones

Responsables de la edición

Lic. José Ocaña Bernal, Consejo Nacional contra las Adicciones

Diseño Gráfico

DCV. Cecilia Sánchez Ortiz

D.C.G. Gabriel de la Rosa

Instituciones participantes:

Consejo Nacional contra las Adicciones
www.conadic.gob.mx

Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”
www.inprf.org.mx

Dirección General de Epidemiología
www.dgepi.salud.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
www.inegi.gob.mx

Favor de citar el presente documento como sigue:

Capítulo Tabaco

Tapia-Conyer, R., Kuri, P; Cravioto, P; Galván F; Jiménez, B., Cortés, M., Medina-Mora, ME., Villatoro, J. Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Capitulo de Tabaco. Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM, Dirección General de Epidemiología, DGE, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.

Capítulo Alcohol

Medina-Mora, ME., Cravioto, P., Villatoro, J.; Galván F; Fleiz, C., Rojas E., Kuri, P., Ruiz, C., Castrejón, J., Velez, A., García A. Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Capítulo de Alcohol. Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM, Dirección General de Epidemiología, DGE, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.

Capítulo Drogas

Villatoro, J., Medina-Mora, ME., Cravioto, P; Fleiz, C., Galván F; Rojas E., Kuri, P., Ruiz, C., Castrejón, J., Velez, A., García A. Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Capítulo de Drogas. Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM, Dirección General de Epidemiología, DGE, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.

Índice General

	Página
1. Introducción	09
2. Uso y abuso de tabaco, alcohol y drogas en México	13
3. Recomendaciones	43
Bibliografía	47
Glosario	53
Anexo 1	
Aspectos Generales de la Encuesta	59
Anexo 2	
2.1 Indicadores de Tabaco	77
2.2 Tabulados de Tabaco	83
Anexo 3	
3.1 Indicadores de Alcohol	105
3.2 Tabulados de Alcohol	115
Anexo 4	
4.1 Indicadores de Drogas	173
4.2 Tabulados de Drogas	179
Anexo 5	
Tarjeta de Registro de Hogares	185
Anexo 6	
Cuestionario de Adicciones	189
Anexo 7	
Definiciones operacionales de la encuesta	217

1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El problema de abuso de alcohol, tabaco y drogas en México ha presentado una evolución desigual afectando en forma heterogénea a la población. Varía la proporción afectada, las normas sociales, los problemas que el abuso representa para el individuo, la familia y la sociedad, la percepción social frente al problema y las alternativas de manejo.

La sociedad está en general y con justa razón, preocupada por el abuso de drogas y sus consecuencias; el tabaquismo y su impacto en la salud de fumadores y no fumadores expuestos, ha cobrado relevancia en años recientes, el abuso de bebidas alcohólicas, en cambio, es con frecuencia tolerado, a pesar de que por su elevada prevalencia, afecta a un número importante de familias mexicanas.

La convicción de que las políticas públicas deben basarse en evidencia científica ha llevado a la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, a apoyar la realización de Encuestas de Hogares SS, (20-23), con el fin de conocer el problema y sus tendencias. Dichas encuestas han sido realizadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y por la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, con la excepción de la encuesta de 1993 conducida solamente por ésta última dependencia. En 2002 por primera vez, la encuesta se efectúa en poblaciones rurales, las tendencias de cultivo y distribución ilegal de drogas, así como la migración internacional que afecta de manera particular a las comunidades rurales, hacen suponer que éstas, han sido afectadas por el problema de uso de drogas ilegales antes considerado preponderantemente urbano.

El abuso de alcohol es un fenómeno endémico, es el principal problema de salud pública del país, en lo que se refiere a abuso de sustancias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (34), el abuso de alcohol ocupa el cuarto lugar en el mundo entre 27 factores de riesgo, por debajo del bajo peso, sexo inseguro, la hipertensión y tabaquismo, en el peso global de la enfermedad medida en muerte prematura y días de vida sanos perdidos. En América Latina, en los países de baja tasa de mortalidad entre los que se ubica México, el abuso de alcohol ocupa el primer lugar. Las encuestas mexicanas han documentado cómo de 1988 a 1998, disminuyó en diez años la edad de mayor índice de consumidores y de consumidores fuertes; mientras que en 1988 el mayor índice se ubicaba en la década comprendida entre los 40 y 49 años, en 1998 esta ocurre entre los 30 y 39 años (20, 22). Estudios recientes han documentado la mayor participación de las mujeres en las prácticas de consumo y una disminución en la edad de inicio (31). Estas tendencias presumen un incremento en los índices de problemas junto con una ocurrencia a una menor edad y por tanto una mayor carga del problema para la sociedad.

En lo que respecta al tabaco la evidencia epidemiológica en el ámbito mundial, es ilustrativa de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Datos de la misma OMS señalan que del total de la población mundial, 30% de los adultos son fumadores y de estos, 4 millones de personas fallecen al año, lo que equivale a la muerte de casi 11,000 personas diarias por causas relacionadas con este producto. En México, más de 53 mil personas fumadoras mueren al año por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que significa que al menos mueren 147 personas diariamente.

En los últimos años, particularmente durante la década de los 90's, ocurrió un incremento muy significativo del consumo de drogas, especialmente la marihuana y la cocaína (7, 12,15, 20, 22, 26, 30).

Datos más recientes de la encuesta de estudiantes de enseñanza media y media superior de la Ciudad de México (32), de las estadísticas de población que solicita ayuda en los Centros de Integración Juvenil (3) y en instituciones no gubernamentales (27) muestran que ha habido una estabilización en el consumo de cocaína, tanto entre estudiantes como en los usuarios que asisten a tratamiento en los diferentes centros del país y aún un descenso junto con el incremento de casos de consumo de estimulantes tipo anfetamínico, especialmente en la frontera con Estados Unidos, en la costa del pacífico y en el centro del país. Desde los finales de la década anterior y en lo que ha transcurrido de ésta, el consumo de estimulantes tipo anfetamínico ("tachas" o "éxtasis", etc.) se ha puesto de moda en nuestros adolescentes (3, 27). El consumo de heroína se ha concentrado en la frontera norte del país, con la presencia de casos aislados en otras regiones (3, 5, 27).

Este seguimiento del panorama epidemiológico de la problemática del consumo de drogas ha sido posible gracias a que en el país se cuenta con una gran cantidad de investigaciones en el área, que incluye al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SISVEA) (27), así como registros de casos por parte de los Centros de Integración Juvenil (3) y por el Sistema de Reporte de Drogas SRID (15), que opera en la Ciudad de México. Las encuestas nacionales de adicciones efectuadas en hogares (9-11, 13, 24, 25), las encuestas de estudiantes (Villatoro y cols), (30-32) y de poblaciones especiales; (5, 8, 17, 18, 28). La confluencia de todas estas fuentes de información se realiza gracias al esfuerzo de todas las instituciones participantes, en el Observatorio Epidemiológico.

En el caso de las encuestas nacionales de adicciones, al presente se cuenta con 4 estudios realizados en intervalos aproximados de 4 años (20-23). Estas encuestas se realizan en entrevista cara a cara con el informante, en una población de 12 a 65 años de edad y que habita en sus hogares. Es el objetivo del presente trabajo, presentar los datos de consumo de drogas legales, médicas e ilegales de la cuarta encuesta de adicciones, cuyo levantamiento de campo se realizó entre marzo y junio del 2002. El diseño logístico, el diseño y selección de la muestra, la recolección de la información y la producción de los concentrados de resultados estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI)¹.

¹ Nota metodológica: Esta encuesta se realizó con una metodología relativamente diferente de las encuestas anteriores. Por ello, es importante señalar que al analizar las tendencias del consumo entre las diversas encuestas, se considere que en sentido estricto esta encuesta no es totalmente comparable con las anteriores.


2. USO Y ABUSO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN MÉXICO

2. USO Y ABUSO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN MÉXICO

RESULTADOS

Consumo de Tabaco

En el ámbito nacional, al clasificar la población de acuerdo al consumo de tabaco, se encontró que más de 16 millones de personas (23.5%), son fumadores, 17.4% exfumadores y más de la mitad (59.1%) manifestaron ser no fumadores. Al comparar estos resultados con los de la encuesta anterior (ENA-98), se observa que la proporción de fumadores disminuyó de 27.7 a 23.5%, en contraste con la proporción de exfumadores y no fumadores cuyas proporciones aumentaron (Gráfica 1).



Al analizar el hábito tabáquico con relación al sexo, se observa que en los grupos que tienen o han tenido consumo de tabaco (fumadores y exfumadores), el sexo masculino representa más del 60% en cada una, presentando una relación hombre-mujer de 2.2 a 1 y de 1.5 a 1 respectivamente, mientras que en el grupo de no fumadores casi el 70% son mujeres (Cuadro 1).


Cuadro 1 Patrón de fumadores por sexo

Sexo	Clasificación de fumadores						TOTAL	
	Fumadores		Ex - fumadores		No fumadores		Núm.	%
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%		
Masculino	11,359,627	69.4	7,359,980	60.5	12,674,050	30.7	31,393,657	45.0
Femenino	5,011,974	30.6	4,795,252	39.5	28,566,184	69.3	38,373,410	55.0
TOTAL	16,371,601	100.00	12,155,232	100.00	41,240,234	100.00	69,767,067	100.00

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Entre los aspectos que se investigaron durante la entrevista, estuvieron los relacionados con la percepción de riesgo a la salud que se tiene al consumir algunas sustancias adictivas, en el caso específico del tabaco

se cuestionó ¿Qué tan grave es el uso de cigarrillos? Las respuestas no fueron del todo satisfactorias al encontrar que 3.3% de la población entrevistada no considera grave el consumo de tabaco y el 15.1% opinan que es poco grave (Gráfica 2).



Asimismo, a las preguntas asociadas con la dependencia al consumo de tabaco, se les otorgó un valor a cada una, según su respuesta y se obtuvo el total de puntos para cada individuo, de acuerdo con los puntos obtenidos y tomando como base los criterios propuestos por Fagerstrom, se conformaron cuatro grupos:

- Grupo uno: Fumador dependiente.
- Grupo dos: Fumador diario, pero sin dependencia.
- Grupo tres: Los fumadores ocasionales y ex-fumadores.
- Grupo cuatro: Los no fumadores.

Esta clasificación es una herramienta sumamente útil para poder identificar la magnitud de las necesidades de atención para la salud, que se presentan en los diferentes grupos respecto al consumo de tabaco.

Con este propósito se determinaron las necesidades específicas de atención para cada grupo de acuerdo con el grado de dependencia al consumo de tabaco, definiéndose dichas necesidades de la siguiente manera:

- Grupo uno: Necesidad de tratamiento especializado.
- Grupo dos: Necesidad de intervención breve.
- Grupo tres: Requiere de observación y prevención.
- Grupo cuatro: Requiere prevención.

Una vez definidos e integrados los grupos, se llevó a cabo un análisis comparativo entre ellos.

Resultados de acuerdo al nivel de dependencia

Durante la encuesta del 2002 se encontró que 1.4% de la población entrevistada se clasificó como fumador dependiente, lo que representa a más de un millón de personas que requieren de atención especializada para resolver su problema de tabaquismo. El siguiente grupo conformado por los que fuman diario pero sin presentar síntomas de dependencia, y por ello requieren de una intervención breve, representa el 11% y aquellos que fuman ocasionalmente y los exfumadores que requieren de observación alcanzaron 28.5%, y por último como se mencionó anteriormente el grupo con mayor porcentaje son los no fumadores a los que se tienen que dirigir las campañas anti-tabáquicas de prevención (Cuadro 2).

Cuadro 2 Grupos de acuerdo a criterios de dependencia a tabaco

Grupos	N	%
1. Fumador dependiente	1,009,128	1.4
2. Fumador diario, pero sin dependencia	7,639,874	11.0
3. Fumador ocasional y ex – fumador	19,877,831	28.5
4. No fumador	41,240,234	59.1
Total	69,767,067	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Cuando se analizan los grupos de dependencia de acuerdo al sexo se hace evidente que los hombres tienen los mayores porcentajes en los tres primeros grupos, los cuales implican consumo de tabaco, presentándose el valor más alto (71.4%) en el grupo de fumador dependiente, mientras que las mujeres su mayor porcentaje (69.3) se registró en el grupo de no fumadores (Cuadro 3).

Cuadro 3 Grupo de dependencia por sexo

Sexo	Grupos									
	Dependencia		Fumador diario sin dependencia		Fumador ocasional y ex - fumador		No fumador		TOTAL	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Masculino	720,016	71.4	5,435,553	71.1	12,564,038	63.2	12,674,050	30.7	31,393,657	45.0
Femenino	289,112	28.6	2,204,321	28.9	7,313,793	36.8	28,566,184	69.3	38,373,410	55.0
TOTAL	1,009,128	100.0	7,639,874	100.0	19,877,831	100.0	41,240,234	100.0	69,767,067	100.00

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Del total de la población clasificada como fumadores de acuerdo a la definición considerada, 1,009,128 (6.2%) de ellos presentan dependencia al consumo de tabaco, asimismo, 7,639,874 (46.7%) fuman a diario pero todavía no presentan síntoma de dependencia y una cifra aproximada (7,722,599) lo conforman los fumadores ocasionales, por otro lado los ex-fumadores que se ubican en el grupo tres junto con los fumadores ocasionales representan más de doce millones de personas (Cuadro 4).

Cuadro 4 Grupo de dependencia por tipo de fumador

Clasificación de fumadores	Grupos									
	Dependencia		Fumador diario sin dependencia		Fumador ocasional y ex-fumador		No fumador		TOTAL	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Fumadores	1,009,128	100	7,639,874	100	7,722,599	38.9	-	-	16,371,601	23.5
Ex -fumadores	-	-	-	-	12,155,232	61.1	-	-	12,155,232	17.4
No fumadores	-	-	-	-	-	-	41,240,234	100	41,240,234	59.1
TOTAL	1,009,128	100	7,639,874	100	19,877,831	100	41,240,234	100	69,767,067	100

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Los cuatro grupos definidos por el grado de dependencia, analizados de acuerdo al tipo de comunidad, hace evidente que en comunidades urbanas el problema que se identifica de tabaquismo es mayor que en áreas rurales, al observarse por ejemplo, que el 86.5% de las personas con dependencia a tabaco son habitantes de áreas urbanas, de igual forma entre los que fuman a diario y los fumadores ocasionales la proporción de habitantes de zonas urbanas es mayor a 80% (Cuadro 5).

Cuadro 5 Grupo de dependencia por tipo de comunidad

Comunidad	Grupos									
	Dependencia		Fumador diario sin dependencia		Fumador ocasional y ex-fumador		No fumador		TOTAL	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Urbana	872,958	86.5	6,654,728	87.1	16,053,628	80.8	29,306,164	71.1	52,887,532	75.8
Rural	136,170	13.5	985,092	12.9	3,824,203	19.2	11,934,070	28.9	16,879,535	24.2
TOTAL	1,009,128	100.0	7,639,874	100.0	19,877,831	100.0	41,240,234	100.0	69,767,067	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Los niveles de dependencia de acuerdo con los grupos de edad presentan un comportamiento similar entre ellos, en donde el porcentaje aumenta en cada grupo de dependencia al aumentar la edad, observándose dos excepciones; la primera en el grupo de los fumadores diarios sin dependencia al disminuir de 47.3% a 47.1% en los grupos de 18 a 34 y de 35 a 65 años respectivamente; la segunda se presentó en los mismos grupos de edad pero entre los no fumadores, disminuyendo de 37.4% a 34.8% (Cuadro 6).

Cuadro 6 Dependencia por grupo de edad

Grupo de edad	Grupos									
	Dependencia		Fumador diario sin dependencia		Fumador ocasional y ex - fumador		No fumador		TOTAL	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
12-17 años	24,759	2.5	433,279	5.7	1,744,354	8.8	11,482,967	27.8	13,685,359	19.6
18-34 años	259,152	25.7	3,611,677	47.3	8,271,140	41.6	15,409,585	37.4	27,551,554	39.5
35-65 años	725,217	71.9	3,594,918	47.1	9,862,337	49.6	14,347,682	34.8	28,530,154	40.9
TOTAL	1,009,128	100.0	7,639,874	100.0	19,877,831	100.0	41,240,234	100.0	69,767,067	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Entre los factores que más influyen al tomar la decisión de fumar o no fumar, se encuentra la percepción que cada persona tiene sobre el consumo de tabaco, durante el estudio esto fue un aspecto que se cuestionó a los entrevistados. En general se observó que al interior de cada uno de los grupos definidos de acuerdo al grado de dependencia, los porcentajes son mayores cuanto más grave es la percepción de riesgo, por ejemplo: entre los fumadores dependientes al tabaco el 5.9%, que representa a casi 60,000 personas, consideran que el uso de cigarrillos no es nada grave, mientras que para el 38.5% del mismo grupo el uso de cigarrillos es muy grave (Cuadro 7).

Cuadro 7 Dependencia por percepción de riesgo

Percepción de la gravedad del consumo de cigarrillos	Grupos									
	Dependencia		Fumador diario sin dependencia		Fumador ocasional y ex - fumador		No fumador		TOTAL	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Nada grave	58,879	5.9	529,535	7.0	798,820	4.0	920,475	2.3	2,307,709	3.3
Poco grave	208,828	21.0	1,604,834	21.2	3,494,577	17.7	5,090,548	12.5	10,398,787	15.1
Bastante grave	343,327	34.5	3,019,958	39.9	7,695,104	38.9	16,447,332	40.4	27,505,721	33.9
Muy grave	383,106	38.5	2,418,308	31.9	7,770,852	39.3	18,203,162	44.8	28,775,428	41.7
Total	994,140	100.0	7,572,635	100.0	19,759,353	100.0	40,661,517	100.0	68,987,645	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Nota: El total de la población del cuadro es menor a lo reportado debido a la no respuesta.

Resultados del grupo: Fumadores dependientes


El porcentaje de la población que fue clasificada como fumadores dependientes al tabaco, es decir, aquellos que requieren de atención especializada para atender su problema de tabaquismo, representa a más de un millón de personas, entre las que se observa que la mayoría son hombres, sin embargo la diferencia en la distribución por sexo comparada con la encontrada cuando se les clasificó únicamente como fumadores se hizo mayor, lo que se manifiesta con el aumento en la relación hombre–mujer de fumadores de 2.2 a 2.5 hombres por cada mujer entre los dependientes a tabaco (Cuadro 8).

Cuadro 8 Distribución por sexo en el grupo de fumadores dependientes a tabaco


Sexo	Frecuencia	%
Masculino	720,016	71.4
Femenino	289,112	28.6
Total	1,009,128	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

El grupo de edad más afectado con dependencia al tabaco es el de 35 a 65 años, que alcanza casi el 72% de fumadores dependientes, esto puede parecer obvio porque en apariencia este grupo etáreo tiene un mayor tiempo de contacto con el tabaco, pero es de llamar la atención que el 2.5% de menores de 18 años que representan a cerca de 25,000 jóvenes que a pesar de su corta edad, requieren de atención especializada para dejar de fumar (Gráfica 3).



De igual forma se preguntó a éstas personas ¿Qué tan grave es fumar cigarrillos?, encontrando que sólo 38% consideraron que era muy grave, cabe señalar que para el 20.7% es poco grave, sin embargo el 5.8% de las personas que tienen problemas de dependencia al tabaco consideran que no es nada grave su consumo (Gráfica 4).



Con relación a la edad en que iniciaron el consumo de tabaco los individuos que desarrollaron dependencia, se encontró que quienes reportan su inicio a los 6 años en contraste con aquellos que manifestaron iniciar a los 45 años, la distribución de la edad de inicio presentó un rango de 39 años, media de 15.8 años, la moda fue de 14 y la mediana de 15 años.

Al agrupar la edad de inicio considerando periodos similares a los formados en la ENA-98, observamos que el grupo que inició el consumo de tabaco entre los 15 y 17 años de edad, equivale a 406,786 (40.9%) fumadores dependientes, seguido por los que iniciaron entre los 11 y 14 años (34.2%). Al compararlo con lo reportado en la ENA-98, donde el segundo lugar lo ocupó el grupo que inició entre los 18 y 25 años, se puede inferir que la población entrevistada en la ENA-2002 inició el consumo de tabaco a menor edad que la entrevistada en la ENA-98 (Cuadro 9).

Cuadro 9 Distribución de la edad de inicio de fumadores dependientes, por sexo


Edad de inicio	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		Núm.	%
	Núm.	%	Núm.	%		
10 años y menos	28,676	4.1	3,397	1.2	32,073	3.2
11-14 años	273,176	38.7	67,520	23.4	340,696	34.2
15-17 años	266,959	37.8	139,827	48.4	406,786	40.9
18-25 años	137,263	19.4	74,044	25.6	211,307	21.2
26-35 años	-	-	3,931	1.4	3,931	0.4
36-45 años	-	-	393	0.1	393	0.0
Total	706,074	100.0	289,112	100.0	995,186	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


Nota: El total es menor al número de fumadores dependientes debido a que no todos iniciaron el consumo de drogas con tabaco.

En la distribución por sexo de estos grupos se observa que los hombres mantienen los mayores porcentajes en los dos grupos de menor edad, cabe señalar que las mujeres reportan mayor porcentaje en los grupos de 15 años en adelante.

Del total de fumadores dependientes (1,009.128), el 5.8% manifestó haber solicitado ayuda por el consumo de tabaco durante los últimos doce meses, por lo que se estima que cerca de 59,000 personas acudieron a alguna instancia en busca de apoyo (Gráfica 5).



Al preguntar a los fumadores dependientes que solicitaron ayuda, ¿a quién? o ¿a qué lugar se dirigieron en busca de apoyo para aliviar su dependencia al tabaco?, se observó que más de la mitad buscó ayuda en algún grupo de atención médica o médico privado, seguida de los que acudieron a curanderos (30.8%) y de los que utilizaron otras alternativas como son los parches, chicles, etc. (Gráfica 6).



Resultados del grupo: Fumadores diarios sin dependencia al tabaco


El porcentaje de la población que fue clasificada como fumadores diarios pero sin presentar dependencia al tabaco y que por tanto requieren de intervención breve para atender su problema de tabaquismo, equivalentes a más de cinco millones de personas entre las que se observa que la mayoría (71.1%) son hombres (Cuadro 10).

Cuadro 10 Distribución por sexo entre el grupo de fumadores diarios sin dependencia

Sexo	Frecuencia	%
Masculino	5,435,553	71.1
Femenino	2,204,321	28.9
Total	7,639,874	100.0


Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Entre los fumadores diarios sin dependencia, los grupos de edad de 18 a 34 y de 35 a 65 años, presentaron porcentajes muy similares (47.2 y 47.1 respectivamente), y a pesar de que los adolescentes sólo representaron el 5.7%, estamos hablando de 435,473 individuos menores de edad.



Al preguntar a estas personas, ¿Qué tan grave es fumar cigarrillos? la mayoría manifestó que era bastante grave (39.5%), encontrando que sólo 31.7% consideraron que era muy grave, cabe señalar que únicamente para el 6.9% no es nada grave su consumo (Gráfica 8).

Gráfica 8
Percepción del riesgo de consumir cigarros, entre
fumadores diarios sin dependencia a tabaco
N= 7,639,874



Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Con relación a la edad en que iniciaron el consumo de tabaco las personas que fuman diario pero sin presentar dependencia, se encontró que quienes reportan su inicio a los 6 años en contraste con aquellos que manifestaron iniciar a los 50 años, la distribución de la edad de inicio entonces presentó un rango de 44 años, media de 17.2 años, la moda fue de 15 años y la mediana de 17 años.


Al agrupar la edad de inicio considerando periodos similares a los de la ENA-98, observamos que el grupo que inició el consumo entre los 15 y 17 años de edad, fueron 3, 119,627 individuos (40.8%), seguido por los que iniciaron entre los 18 y 25 años (Cuadro 11).

La distribución por sexo de estos grupos muestra que los hombres mantienen los mayores porcentajes casi en todos los grupos de edad, a excepción del grupo que inició entre los 26 y 35 años donde la mayoría fueron mujeres (Cuadro 11).


Cuadro 11 Distribución de la edad de inicio de fumadores diarios
sin dependencia, por sexo

Edad de inicio	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino			
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
10 años y menos	164,302	95.2	8,213	4.8	172,515	100.0
11-14 años	946,884	73.1	348,982	26.9	1,295,866	100.0
15-17 años	2,383,710	76.4	735,917	23.6	3,119,627	100.0
18-25 años	1,761,020	64.7	962,489	35.3	2,723,509	100.0
26-35 años	95,858	40.7	139,727	59.3	235,585	100.0
36-45 años	65,366	87.9	8,993	12.1	74,359	100.0
45-64 años	6,219	100.0	0	0.0	6,219	100.0
No responde	12,194	100.0	0	0.0	12,194	100.0
Total	5,435,553	71.1	2,204,321	28.9	7,639,874	100.0

Del total de fumadores diarios pero sin dependencia (7,639,874), menos del uno por ciento manifestó haber solicitado ayuda por el consumo de tabaco durante los últimos doce meses, por lo que se estima que únicamente 55,927 personas acudieron a alguna instancia en busca de apoyo (Gráfica 9).




Al cuestionarles a los 55,227 fumadores diarios sin dependencia que solicitaron ayuda, ¿a quién? o ¿a qué lugar? se dirigieron en busca de apoyo para atender su consumo de tabaco, se observó que el 44.1% buscó ayuda en algún Hospital General o Centro Comunitario, seguida de los que utilizaron otras alternativas como son los parches, chicles (29.1%); es de resaltar que 18.9% acudió con un sacerdote en busca de ayuda para dejar de fumar (Gráfica 10).



Resultados del grupo: Fumadores ocasionales y ex-fumadores

La población que fue clasificada dentro del grupo de fumadores ocasionales y exfumadores, para el cual se identificó que requieren de observación y prevención, representan 19,877,831 de personas entrevistadas y está conformado en su mayoría por exfumadores (61.1%), (Gráfica 11).



La distribución por sexo al interior de cada una de las categorías nos indica que más del 60% de cada uno de los grupos son varones, resultados que se reflejan en la distribución total (Cuadro 12).

Cuadro 12 Distribución del grupo de fumadores ocasionales y ex- fumadores por sexo

Sexo	Grupo de fumadores ocasionales y ex - fumadores				Total	
	Fumadores ocasionales		Ex – fumadores		Núm.	%
	Núm.	%	Núm.	%		
Masculino	5,204,058	67.4	7,359,980	60.5	12,564,038	63.2
Femenino	2,518,541	32.6	4,795,252	39.5	7,313,793	36.8
TOTAL	7,722,599	100.0	12,155,232	100.0	19,877,831	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


Al observar la distribución de los grupos de edad de ambas categorías se observa que en los grupos de 12 a 17 y de 18 a 34 años, las proporciones de fumadores ocasionales son mayores a las de los ex-fumadores, sin embargo entre los de 35 a 65 años el resultado es inverso, la mayor proporción se registró en los ex-fumadores (Cuadro 13).

Cuadro 13 Distribución del grupo de fumadores ocasionales y ex-fumadores, por sexo

Grupos de edad	Grupo de fumadores ocasionales y ex - fumadores					
	Fumadores ocasionales		Ex – fumadores		Total	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
12-17 años	772,720	10.0	971,634	8.0	1,744,354	8.8
18-34 años	3,805,172	49.3	4,465,968	36.7	8,271,140	41.6
35-65 años	3,144,707	40.7	6,717,630	55.3	9,862,337	49.6
TOTAL	7,722,599	100.0	12,155,232	100.0	19,877,831	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

La opinión acerca del riesgo que implica el consumo de cigarros entre los fumadores ocasionales y los ex-fumadores hace evidente que para los primeros las categorías de menor gravedad obtienen porcentajes mayores, sin embargo en las categorías de bastante y muy grave, son los ex-fumadores quienes tienen mayor porcentaje; cabe mencionar que para ambos grupos los mayores porcentajes se reportan en las categorías de mayor riesgo (Gráfica 12).



Con respecto a la edad de inicio reportada por ambos grupos, entre los ex-fumadores una cuarta parte (25.2%) manifestaron haber iniciado antes de los 15 años, mientras que entre los fumadores ocasionales el mayor porcentaje se obtuvo en el grupo de 15 a 17 años (Cuadro14).

Cuadro 14 Edad de inicio de fumadores ocasionales y ex-fumadores

Grupos de edad	Grupo de fumadores ocasionales y ex - fumadores					
	Fumadores ocasionales		Ex – fumadores		Total	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
10 años y menos	108,562	1.4	466,462	3.8	575,024	2.9
11-14 años	971,516	12.6	2,598,420	21.4	3,569,936	18.0
15-17 años	3,237,567	41.9	4,013,789	33.0	7,251,356	36.5
18-25 años	2,950,452	38.2	4,373,020	36.0	7,323,472	36.8
26-35 años	307,430	4.0	501,184	4.1	808,614	4.1
36-45 años	92,944	1.2	138,265	1.1	231,209	1.2
45-65 años	49,177	0.6	45,568	0.4	94,745	0.5
No responde	4,951	0.1	18,524	0.2	23,475	0.1
TOTAL	7,722,599	100.0	12,155,232	100.0	19,877,831	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


Al cuestionar acerca de la búsqueda de ayuda con el propósito de abandonar el consumo de tabaco, menos del uno por ciento en ambos grupos mencionó haber solicitado ayuda, cabe señalar que aunque esta proporción es muy baja se estima que representa a casi 70,000 personas (Cuadro 15).

Cuadro 15 Solicitud de ayuda en el último año para el grupo de fumadores ocasionales y ex-fumadores

Solicitó ayuda	Grupo de fumadores ocasionales y ex - fumadores					
	Fumadores ocasionales		Ex – fumadores		Total	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Sí	19,453	0.3	50,025	0.4	69,478	0.3
No	7,703,146	99.7	12,105,207	99.6	19,808,353	99.7
Total	7,722,599	100.0	12,155,232	100.0	19,877,831	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


Del total de personas que solicitaron ayuda, del grupo clasificado como fumadores ocasionales o ex-fumadores, los primeros han buscado ayuda principalmente en Hospitales o Centros comunitarios (37.8%), mientras que cerca de la mitad de los ex-fumadores han utilizado otro tipo de alternativa como es el uso de chicles, parches, etc., y el 37.1% acudió a un padre o sacerdote en busca de ayuda (Gráfica 13).



Resultados del grupo de: Fumadores Pasivos

Además de los grupos conformados de acuerdo al consumo de tabaco y el grado de dependencia que presentaron, se formó un grupo adicional denominado "Fumadores pasivos", el cual se integró con las personas que manifestaron no haber consumido tabaco nunca (No fumadores) y aquellos que tienen al menos un año de haber dejado de fumar (ex-fumadores), pero que conviven habitualmente con personas fumadoras. De esta forma, la prevalencia del grupo de fumadores pasivos (25.6%), se estima que representa a 17, 860,537 personas.

La distribución por sexo de los fumadores pasivos mostró un mayor porcentaje (70.5%) de mujeres alcanzando casi tres cuartas partes del total (Gráfica 14).



Con respecto a los grupos de edad, al compararlos entre sí respecto a la exposición involuntaria al humo de tabaco, sin considerar el tipo de actividad que realizan, se observa que los porcentajes encontrados presentan diferencias que no exceden de 8 puntos porcentuales, lo que muy probablemente sea consecuencia de que en todos los ámbitos (laboral, académico y en el hogar), existe exposición involuntaria al humo de tabaco (Cuadro 16).

Cuadro 16 Distribución por grupos de edad de fumadores pasivos

Grupos de edad	Frecuencia	%
12-17 años	5,235,696	29.3
18-34 años	6,582,042	36.9
35-65 años	6,042,799	33.8
Total	17,860,537	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


De la población expuesta involuntariamente al humo de tabaco más de tres cuartas partes (78.8%), son residentes de comunidades urbanas (Cuadro 17).

Cuadro 17 Distribución de fumadores pasivos por tipo de comunidad

Tipo de comunidad	Frecuencia	%
Urbana	14,070,264	78.8
Rural	3,790,273	21.2
Total	17,860,537	100.0

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


Con relación a la opinión que manifestaron los fumadores pasivos respecto al riesgo de fumar, el mayor porcentaje reportado fue muy grave (41.8%), y únicamente el 3.2% mencionó que no era nada grave (Gráfica 15).



Consumo de alcohol

Existen en el país poco más de 32.3 millones de personas que consumen bebidas con alcohol, de estos 22.7 millones reportan que la cerveza es su bebida de preferencia, 14.7, los destilados, 7.3 millones los vinos de mesa, 3.8 las bebidas preparadas como los "coolers" y una proporción menor (2.4 millones) bebidas como los aguardientes, el pulque o el alcohol de 96° ingerido como bebida alcohólica que son consumidos con más frecuencia en poblaciones rurales (Gráfica 16).

Los hombres que consumen alcohol prefieren con más frecuencia la cerveza que las mujeres, éstas se inclinan más por el vino de mesa con mayor índice de preferencia entre éstas que en los varones, los índices de preferencia por los destilados y de las bebidas preparadas son similares para ambos sexos, la preferencia por los aguardientes tiende a ser más masculina.




El índice de abstemios entre las personas que tienen la edad legal para beber, es importante (30% en varones y 63% en mujeres) una proporción de estos (2%) dejaron de beber por considerar que tenían un problema.

El consumo es poco frecuente, solo 7.04% de la población rural y urbana entre 12 y 65 años reportó consumir entre una y cuatro veces por semana, sin embargo, particularmente en los hombres las ocasiones de consumo se asocian con grandes cantidades (Gráfica 17).

El consumo es más frecuente en las poblaciones urbanas que en las rurales y entre los varones más que en las mujeres. El consumo diario es poco frecuente solo 0.5% de la población adulta reporta esta frecuencia de consumo, alcanzando solo 3.2% de la población masculina urbana, grupo en el que se concentra el mayor porcentaje. El consumo de grandes cantidades es en cambio muy frecuente, siendo el patrón característico de hombres rurales y urbanos (47% y 45% de la población entre 18 y 65 años que vive en estas localidades). Las diferencias más substanciales en los patrones de consumo se observan entre las mujeres, siendo el consumo significativamente más elevado en aquellas que viven en zonas urbanas (Gráfica 18).

Gráfica 17
Frecuencia y cantidad de consumo de alcohol
Población de 12 a 64 años



Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Los adolescentes consumen en menor proporción alcohol, sin embargo uno de cada tres menores de edad en poblaciones urbanas reportó consumir bebidas con alcohol, esta proporción solo alcanza al 14% de las poblaciones rurales. El consumo es más frecuente entre los 18 y 49 años y desciende después de los 50 años.

Gráfica 18
Prevalencia del uso de alcohol
Población de 18 a 65 años

	Hombres		Mujeres		Total		Total
	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	
Bebedores*	60.7	72.2	18.9	42.7	37.4	55.6	51.3
Consumo diario	2.4	3.2	0.3	0.6	1.2	1.7	0.5
Consumo alto**	46.7	44.9	4.5	8.2	23.1	24.3	24.0
C. Consuetudinario***	10.0	12.4	0.2	0.7	4.5	5.7	5.5

% del total de la población por sexo y localidad


*Personas que reportaron consumir alcohol el año anterior al estudio.

**Bebedores que reportaron consumir 5 copas o más por ocasión de consumo independientemente de la frecuencia.


*** Bebedores que reportaron consumir 5+ por ocasión por lo menos una vez a la semana.

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.


En la población rural el índice de mayor consumo se ubica entre los 40 y 49 años, como ocurría en la población urbana en la década de los 1980's antes de que el consumo se incrementara en la población más joven. Hoy en día el consumo entre los 18 y 49 años de edad muestra pocas diferencias (Gráfica 19).




Los índices de consumo y dependencia de la población adulta entre 18 y 65 años muestran pocas diferencias en las encuestas de 1998 y 2002, entre las mujeres aumentaron los índices de consumo alto. En 1998, 4% de las mujeres reportaron beber 5 copas o más por ocasión de consumo una vez al mes o más frecuentemente, en 2002, la proporción que reportó este patrón de consumo fue de 5.3%, sin embargo los índices de crecimiento en el consumo y en el abuso entre los adolescentes menores de edad se incrementó significativamente entre hombres de 0.6% en 1998 a 2.7% en 2002 y en mujeres de 0.2% a 0.8% en este período (Gráfica 20).



Hombres y mujeres con dependencia alcohólica prefieren consumir aguardiente, cerca de la mitad de los bebedores de este producto cumplían el criterio de abuso o dependencia al alcohol. El Pulque y las bebidas preparadas le siguen en importancia; los destilados y la cerveza ocupan el tercer lugar y el vino de mesa es el que presenta menos preferencia por este grupo de la población. Existen pocas diferencias en la proporción de personas en los diferentes grupos de edad que presentan dependencia y dicen preferir la cerveza (Gráfica 21).




El lugar más frecuente de consumo es la casa del bebedor, esto ocurrió en un 35% en segundo lugar la casa de otra persona, restaurantes y establecimientos de venta y en menor proporción en la calle y en el trabajo. En total, cerca del 65% del consumo ocurre fuera de la casa de la persona (Gráfica 22).



Una proporción importante de la población reporta haber presentado problemas asociados con su forma de beber, 3.4% de la población de 12 a 65 años que viven en comunidades urbanas y rurales del país reportó haber tenido discusiones o peleas familiares, 2.2% problemas con las autoridades de tránsito y 0.8% reporta haber sido arrestado por haber conducido después de tomarse algunas copas.

Los datos de la encuesta permiten conocer la proporción de la población que requiere atención en el sistema de salud y del tipo de atención que requiere (Gráfica 23). Para este fin se desarrolló una tipología que incluye:

- Personas que beben con niveles de bajo riesgo o son abstemios excluyendo de este último grupo a aquellos que habían dejado de beber por tener un problema con el alcohol. Se considera que estas personas requieren de intervenciones universales, de educación para la salud que les permita mantenerse en este nivel de consumo.
- Personas que requieren una intervención preventiva de más intensidad porque beben en grandes cantidades y aún no tienen problemas o porque no beben por haber tenido un problema, con el fin de que reduzcan su nivel de consumo los primeros y eviten la recaída los segundos.
- Personas que empiezan a tener problemas con el manejo del alcohol pero que aún no cumplen el criterio de dependencia y no presentan síntomas de dependencia física (tolerancia, abstinencia, pérdida de control) quienes son candidatos a programas de re aprendizaje que les permitan asumir patrones de consumo de menor riesgo o la abstinencia si no logran mantener niveles de consumo controlados.
- Personas con dependencia severa (con los tres criterios de dependencia física) que requieren tratamiento para lograr y mantener la abstinencia.



El 55% de los varones y el 90% de las mujeres beben con niveles de bajo riesgo o son abstemios. 652,603 hombres y 14 703 mujeres tienen dependencia severa y requieren de tratamiento especializado; 19'426,97 hombres y 231,300 mujeres tienen dependencia moderada o leve o problemas con el manejo del alcohol y pueden beneficiarse con programas de intervención breve; 15 millones requieren acceso a programas de prevención que incluyan desarrollo de habilidades que les permitan mantenerse con niveles de bajo riesgo de consumo, 51.8 millones requieren de programas de prevención universal que les permitan mantenerse en niveles de bajo riesgo de consumo o en abstinencia (Cuadro 18).

Cuadro 18 Necesidades de prevención y tratamiento por sexo y localidad

	Urbano			Rural		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Con dependencia física	2.3	.0	1.0	1.5	.1	.7
Con problemas sin incluir dependencia física	5.8	.7	3.0	7.4	.2	3.5
Abuso de alcohol	36.6	11.0	22.5	35.7	4.6	18.7
Abstemios	55.3	88.3	73.5	55.5	95.1	77.1

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

En total es necesario llevar a las comunidades rurales programas de tratamiento para dar atención a las personas con problemas de abuso / dependencia al alcohol. En general, el 0.7% de la población total del país entre 12 y 65 años requiere programas de tratamiento con enfoque de género.

Consumo de Drogas

En México, 3'508,641 personas entre 12 y 65 años que habitan zonas rurales y urbanas del país, han hecho un uso ilícito de drogas. Se consideró uso ilícito al consumo de drogas ilegales, inhalables y las drogas con utilidad médica cuando se hace fuera de prescripción¹. 2'697,970 fueron hombres y 810,671 mujeres, esto es, el consumo de drogas ocurre en una proporción de 3.3 hombres por cada mujer.



• Otras drogas	N	%
– Heroína	62,292	0.1
– Estimulantes tipo anfetamínico	55,526	0.1
– Alucinógenos	175,546	0.3
• Cocaína	857,766	1.2
– Polvo	851,549	1.2
– Pasta	24,445	*
– Crack	69,874	0.1
• Drogas Médicas		
– Tranquilizantes	476,714	0.7
– Sedantes	169,170	0.2
– Anfetaminas	239,088	0.3

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

¹ Se consideró como uso fuera de prescripción aquel consumo realizado sin receta médica o cuando el uso ocurrió en mayor tiempo a mayores dosis o por razones diferentes a las indicadas por el médico.


En proporción al total de la población incluida en el estudio (urbana y rural de 12 a 65 años), 8.59% de los hombres y 2.11% de las mujeres han usado drogas con un total para ambos sexos de 5.03%. En promedio cada usuario consume 1.3 drogas (Gráfica 25).

Gráfica 25
Prevalencia del uso de drogas por sexo, edad y tipo de localidad

	Rural		Urbano		Total	
	Alguna vez	Último año	Alguna vez	Último año	Alguna vez	Último año
	1.1 %	0.3 %	2.4 %	0.6 %	2.1 %	0.5 %
	6.0 %	1.6 %	9.4 %	2.5 %	8.6 %	2.2 %
Total	3.3 %	0.9 %	5.6 %	1.4 %	5.0 %	1.3 %


Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Si bien en poblaciones urbanas se encuentra un número significativamente mayor de usuarios de drogas (2'945,399, han reportado su uso, en comparación con solamente 563,242 en poblaciones rurales), el consumo en estas últimas, proporcional a su tamaño es importante, 5.6% de la población urbana reporta consumo en comparación con 3.3% en la población rural, esto es una razón de 1.7 usuarios urbanos por uno rural. Como era de esperarse las diferencias en los índices de consumo son menores entre los varones rurales y urbanos, 1.6:1, que entre las mujeres entre quienes encontramos una razón de 2.18 usuarias en zonas urbanas por cada una en población rural (Gráfica 26).



La marihuana es la droga que más consume la población. Hay 2.8 personas que reportan haber usado marihuana por cada uno que ha probado la cocaína, que es la droga que ocupa el segundo lugar de consumo después de la marihuana.

Las drogas de uso médico usadas fuera de prescripción ocupan el tercer lugar de consumo. En total 845,561 personas (1.21%) reportaron haber usado este tipo de sustancias sin que un médico se los hubiera indicado o lo hicieron en mayor tiempo o dosis o por razones diferentes a las indicadas. El consumo es mayor en zonas urbanas (1.38%) que en rurales (0.67%) y es ligeramente mayor entre hombres (1.27%) que entre mujeres (1.16%) (Gráfica 27).



Dentro del grupo de las drogas médicas sobresale el consumo de tranquilizantes, los medicamentos de los que se abusa con más frecuencia son diazepam, tafil y valium; en segundo lugar tenemos a las anfetaminas entre las que sobresale el sexenal, sedinil y sopor; los opioides, ocuparon el tercer lugar de este grupo, los medicamentos más frecuentemente usados fuera de prescripción fueron roxanol y nubain; drogas clasificadas como sedantes como el flunitracepam, fueron también mencionadas con frecuencia.

Como se ha reportado en otros estudios, el consumo de estimulantes tipo anfetamínico ha cobrado importancia, en esta encuesta se detectaron 55,526 usuarios (0.2%), las sustancias más frecuentemente reportadas fueron las "tachas" y las "pingas".

El número total de heroinómanos estimado fue de 62,292 sujetos (Gráfica 24), con una proporción de 6 hombres por cada mujer, y hasta el momento parece limitarse a la población urbana, no se detectaron casos de uso de esta droga en las comunidades rurales, lo que indica que en todo caso existen casos aislados cuya baja incidencia no permite que sean detectados con el tamaño de muestra usado en este estudio. Los inhalables ocupan el último lugar de consumo.

En comparación con las encuestas pasadas, encontramos una disminución del uso de inhalables, una estabilización del consumo de cocaína, una disminución del uso de marihuana y una proporción mayor del número total de usuarios que se explica por la emergencia del consumo de otras drogas como los


estimulantes tipo anfetamínico y por el mayor número de casos de heroína (Gráfica 24). No se observan modificaciones en la tasa de continuidad del uso, en 1998 18% de las personas que habían reportado el consumo ilícito de drogas eran casos activos en el mes previo al estudio, en el presente estudio el índice fue de 16%.

Las drogas de inicio más temprano son los inhalables, (con una media de 17 años), pero el que menos persiste en la vida de los usuarios. La marihuana ocupa el segundo lugar en cuanto a la edad de inicio (18 años), seguida por la cocaína (22 años) y las drogas médicas usadas fuera de prescripción (28 años). En general el inicio en el consumo de drogas es temprano, la media de inicio se ubica entre los 19 y los 24 años de edad, es más temprano para los hombres (19 años) que para las mujeres (23 años) y en poblaciones urbanas (20 años) que en poblaciones rurales (22 años).

Los amigos siguen siendo la principal fuente de obtención de drogas (56%) sin embargo llama la atención la mayor proporción de usuarios de drogas que reportaron conseguirlas en las calles (30%), lo que refuerza la importancia de reforzar las acciones preventivas y de eliminación de drogas de las calles.

Las preferencias por las drogas varía de forma significativa en función del sexo de la persona, para los hombres, la marihuana es la droga de preferencia y solo en segundo lugar reportan el uso de cocaína, las mujeres prefieren las drogas de uso médico y solo en segundo lugar la marihuana, para las mujeres, la cocaína ocupa el tercer lugar, en tanto que los hombres prefieren en tercer lugar las drogas médicas (Gráfica 27).


Combinando la información que proporciona el cuestionario sobre el número de veces que el individuo en entrevista reporta haber tomado cada droga, es posible diferenciar desde patrones experimentales hasta un uso crónico de la sustancia. Así, sabemos que una proporción importante de los usuarios de sustancias son experimentadores, alrededor del 65% de los usuarios de drogas las han usado en menos de 5 ocasiones y que un 14% las han ingerido en más de 50 ocasiones. Si bien, como se mencionó el problema afecta a una proporción mayor de varones, una vez que hombres y mujeres inician el consumo lo hacen en patrones similares (Gráfica 28).



Por tipo de sustancia, el uso experimental fue más frecuente en el caso de la marihuana (2.3%) y la cocaína en polvo (0.7%); en contraste, en la heroína, las metanfetaminas, el crack y la pasta básica de cocaína, es más frecuente que las personas que experimentan con estas sustancias desarrollen patrones de uso crónico.


Resultados de la encuesta permiten confirmar el bajo número de personas que usan las drogas por vía inyectada, en total, 0.1% de la población reportó haberse inyectado drogas. Si bien la mayor parte de los usuarios de heroína reportan la vía inyectada (72.5%), su proporción en la población es pequeña y la mayor parte de los usuarios de cocaína, adicción más frecuente en nuestro país, no usan la vía de inyección (97%).



Los problemas más frecuentemente reportados fueron las discusiones con la familia y los amigos, las peleas, los problemas con la policía, en la escuela y en el trabajo, y los de tipo económico, vinieron después (Gráfica 29).



En promedio, el 0.4% de la población presentó dependencia a las sustancias, esto ocurre con una proporción de 8 hombres por cada mujer. Una proporción menor de personas de usuarios ha solicitado ayuda y presenta dependencia. De ellos, usan servicios 6% de los hombres que han usado drogas y 2% de las mujeres (Gráfica 30).

Gráfica 30
Necesidades de atención. Consumo de drogas
Población de 12 a 65 años




		
No usuarios	91.4 %	97.9 %
Usuarios sin síntomas	7.1 %	2.0 %
Usuarios con síntomas sin dependencia	0 %	0.7 %
Dependientes	0.8 %	0.1 %
Población total	100 %	100 %
Total de usuarios	100 %	100 %
Ha solicitado ayuda	5.7 %	2.1 %

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Con el fin de determinar las necesidades de servicios se dividió a la población en 4 grupos, los no usuarios (que son la mayoría de la población), que deben de ser sujetos a esfuerzos preventivos; los usuarios que no reportaron problemas, que deben ser sujetos de esfuerzos preventivos más intensivos con el fin de evitar la progresión en el uso de drogas (2'981,447 personas); aquellos que tienen problemas pero no cumplen el criterio de dependencia y son sujetos de intervenciones reeducativas (219,333 personas) y aquellos que requieren tratamiento especializado (307,861 personas), (Gráfica 31).

Gráfica 31
Necesidades de atención para el consumo de drogas



Contexto: Normas de protección a la salud
 Población considerada 70 millones de habitantes

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

3. RECOMENDACIONES

3. Recomendaciones

En relación con el consumo de tabaco, los resultados de la encuesta muestran que la prevalencia de fumadores se mantiene relativamente estable, además se hace patente que en nuestro país cada vez se está fumando a más temprana edad, haciendo evidente que ningún programa preventivo y que ni ninguna medida regulatoria empleada hasta el momento ha funcionado. Cabe señalar que esto no significa que las medidas empleadas sean incorrectas, sino que su instrumentación y vigilancia de cumplimiento no se ha realizado con eficacia, lo que esperamos suceda con la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, vigente a partir de mayo del 2004.

De igual modo, el incremento del consumo del tabaco en adolescentes y mujeres es considerable, por lo que resulta fundamental emprender acciones preventivas dirigidas a estos grupos y adicionalmente, concientizar a los fumadores sobre los daños a su salud que esta adicción tiene y ofrecerles alternativas terapéuticas. En todo ello, el papel del personal de salud es importante, por lo que es necesario crear en el Sistema de Salud todas aquellas redes de apoyo para abatir el consumo de tabaco en su personal y retomar el liderazgo en esta lucha.

Por otra parte, aproximadamente 18 millones de mexicanos están expuestos de manera involuntaria a los daños a la salud causados por el tabaco, lo que representa poco menos de la quinta parte de la población total de México, por ello es importante avanzar en la incorporación de cada vez más lugares libres del humo del tabaco y por ende respetar los derechos de los no fumadores.

Por lo anterior es evidente que en nuestro país el tabaquismo entre los niños, adolescentes y mujeres es un problema que está en ascenso, por lo tanto es de esperar que de no combatir eficazmente este problema, las consecuencias en la salud de la población se verán reflejadas en pocos años. Ante esta situación México se unió al esfuerzo multinacional que encabeza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suscribir un Convenio Marco para el Control de Tabaco, antes mencionado, que permita enfrentar de manera conjunta y armónica los grandes intereses económicos y políticos que la industria tabacalera tiene. Las recomendaciones planteadas por la OMS buscan, sobre todo, detener el consumo del tabaco y que el control de éste sea una prioridad en las políticas públicas de los gobiernos.

Los resultados sobre el consumo de alcohol muestran patrones de problemas que se derivan de un alto índice de abstemios, un consumo poco frecuente, altas cantidades de alcohol consumidas cuando se consume y una alta incidencia de eventos de consumo fuera del hogar. Esto implica que en nuestro país el alcohol se concentra en una proporción menor de bebedores de lo que se observa en otras culturas en donde el índice de abstemios es menor (33). La distribución de ocasiones de consumo poco frecuentes y grandes cantidades por ocasión se ha asociado con mayor índice de problemas que cuando el consumo ocurre con mayor frecuencia pero con cantidades limitadas de alcohol por evento (16).

Los resultados muestran un incremento en los niveles de consumo de grandes cantidades en la población femenina pero particularmente en los índices de consumo y abuso en la población adolescente de 12 a 17 años. Este incremento en los niveles de consumo coincide con lo reportado por otros estudios y tiene como consecuencia una aparición más temprana de los problemas crónicos que se derivan del abuso de alcohol.

Datos de otros estudios señalan, al contrario de lo que se observa en países de economía de mercado, que hay un incremento del consumo per capita, (33), y un índice mayor de dependencia alcohólica de lo que se observa en Europa (29) y similar a la reportada por hombres mayores de 26 años en Estados Unidos (19). La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señaló también la poca utilización de tratamiento por parte de la población con dependencia alcohólica (29).

La combinación de consumo fuera del hogar y el patrón de consumo antes descrito incrementa el riesgo de accidentes y experiencias de victimización. Así, los datos del estudio explican la incidencia más elevada de ingresos en salas de urgencia por eventos traumáticos, con niveles positivos de alcohol en sangre, que ocurre en México en comparación con la que ocurre en sociedades con mayores índices de consumo global pero con menor asociación de eventos de consumo con eventos de intoxicación y políticas públicas efectivas que limitan el consumo antes y durante la conducción de automóviles (6).

La información sobre la extensión del consumo de drogas y sus tendencias coinciden con lo reportado por otros estudios especialmente en lo que se refiere a la disminución del consumo de inhalables que se venía observando desde la década de los 90's, un incremento en el consumo de estimulantes tipo anfetamínico en este mismo período y del nivelamiento y posterior decremento del consumo de cocaína que se observa desde el inicio de este milenio.

La disminución de la edad de inicio, el índice de inyección con drogas, aún bajo pero no por eso menos preocupante por su relación con VIH y hepatitis B y C, y el número ya importante de heroinómanos, obligan a pensar en nuevas estrategias de atención especialmente de tratamiento de los adictos, adaptados a sus necesidades, con enfoque de género, adecuados a las condiciones socioculturales y al tipo de droga utilizada.

La encuesta documenta la gran necesidad de programas preventivos, si bien existe una gama amplia de modelos probados (4), es importante aumentar los recursos para lograr una mejor cobertura y garantizar la sustentabilidad de los programas, solo los esfuerzos continuos han mostrado tener resultados a largo plazo.

Las intervenciones breves han mostrado ser especialmente útiles, al respecto existen modelos desarrollados y probados en nuestro contexto, que pueden incluirse en los programas de atención a la salud en primer nivel de atención y en hospitales y salas de urgencia¹ y en el lugar de trabajo (2), para los familiares de los alcohólicos (14) por mencionar solo algunos.

Los resultados del estudio apoyan los esfuerzos del CONADIC y de los CIJ's por normar la atención a la adicción a la heroína con programas que incluyen la administración de fármacos, y programas psicosociales, con indicaciones precisas del tipo de usuario, la severidad de la adicción, el tiempo que lleva consumiendo y los resultados de tratamientos previos. La inclusión de metadona y de nuevos fármacos como terapias de sustitución para los enfermos refractarios a otros tipos de tratamiento deberán incluir un fortalecimiento de la infraestructura de salud, la integración de servicios, así como la evaluación y seguimiento de los enfermos para evitar desviaciones hacia el mercado ilícito.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

1. AYALA H, ECHEVERRÍA L: Autocontrol Dirigido: Intervenciones breves para bebedores excesivos de alcohol en México. *Revista Mexicana Psicología*, 14(2):113-127, 1997.
2. CARREÑO S, MEDINA-MORA ME, ORTÍZ A, NATERA G, TIBURCIO M, VÉLEZ A: Modelo de prevención del uso de alcohol, tabaco y otras drogas en el lugar de trabajo. *Modelos preventivos*. CONADIC, 14-21, México, 2003.
3. CASTILLO I, GUTIÉRREZ A, DÍAZ B, SÁNCHEZ R, GUIZA V: Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD). Centros de Integración Juvenil. En: *Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras drogas 2002*. CONADIC, SSA, 63-81, México, 2002.
4. CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: Modelos preventivos. CONADIC 56p. México, D. F., 2003.
5. CRAVIOTO P, MEDINA-MORA ME, DE LA ROSA B, GALVÁN F, TAPIA R: Patrones de consumo de heroína en una cárcel de la frontera norte de México: barreras de acceso a tratamiento. *Salud Pública Mex*, 45(3):181-190, 2003.
6. CHERPITEL C, YE Y, BOND J, BORGES G: The causal attribution of injury to alcohol consumption: a cross-national meta-analysis from the emergency room collaborative alcohol analysis project. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 27(11): 1805-1812, 2003.
7. DÍAZ DB, BALANZARIO, MC, CASTILLO I, GUTIÉRREZ A, GARCIA R: Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México*. CONADIC, SSA, 66-71, México, 2001.
8. GUTIÉRREZ R, VEGA L, RODRÍGUEZ E, GALVÁN J: Consumo de sustancias con efectos psicotrópicos entre la población de niñas y niños. En Comexani (ed). *Avances y retrocesos: Balance de una década, 5o. informe sobre los derechos del niño y la situación de la niñez. 1998-2000*. Comexani, 411-418, México, 2000.
9. MEDINA-MORA ME, RASCÓN ML, OTERO BR, GUTIÉRREZ E: Patrones de consumo de alcohol en México. En: Jean Gilbert (ed). *Alcohol consumption among mexicans and mexican Americans. A binational perspective*. U. C. L A., 27-52, Los Angeles, Calif., 1988.
10. MEDINA-MORA ME, TAPIA R, SEPÚLVEDA J, OTERO BR, RASCÓN ML, SOLACHE G, LAZCANO F, VILLATORO J, MARIÑO MC, LÓPEZ E, DE LA SERNA J, ROJAS E: Extensión del consumo de drogas en México. *Encuesta Nacional de Adicciones. Resultados Nacionales*. *Salud Mental*, 12(2): 7-12, 1989.
11. MEDINA-MORA ME y cols.: Patterns of alcohol use in mexican urban population: Results from a National Survey, Paper presented at the 17th. Annual Alcohol Epidemiology Symposium; Sigtuna, Suecia, 1991.
12. MEDINA M E, ROJAS E, JUÁREZ F, BERENZON S, CARREÑO S, GALVÁN J, VILLATORO J y cols.: Consumo de sustancias con efectos psicotrópicos en la población estudiantil de enseñanza media y media superior de la República Mexicana. *Salud Mental*, 16(3): 2-8, 1993.
13. MEDINA-MORA ME, CRAVIOTO P, VILLATORO J, FLEIZ C, GALVÁN F, TAPIA R: Consumo de drogas entre adolescentes: Resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones de 1998. *Salud Pública Mex*, 45 (Supl 1): 16-25, 2003.
14. NATERA G: Una estrategia para apoyar a los familiares que tienen problemas por el consumo de alcohol y drogas. Un enfoque para la promoción de la salud. En: García M (ed). *Salud Comunitaria y Promoción de la Salud*. 993-1011. ICEPSS (eds). España, 1999.

15. ORTÍZ A, SORIANO A, GALVÁN J: El Sistema de Reporte de Información en Drogas SRID. En: Observatorio epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México. CONADIC, 44-50, México, 2001.
16. REHM J, MONTEIRO M, ROOM R, GMEL G, JERNINGAN D, FRICK U, GRAHAM K: Steps towards constructing a global comparative risk analysis for alcohol consumption: determining indicators and empirical weights for patterns of drinking, deciding about theoretical minimum, and dealing with different consequences. *European Addiction Research*, 7: 138-47, 2001.
17. RODRÍGUEZ E, GUTIÉRREZ R, VEGA L: Consumo de drogas en mujeres dedicadas a la prostitución: la zona de La Merced. *Salud Mental*, 26(5): 73-81, 2003.
18. ROMERO M: ¿Por qué delinquen las mujeres? Parte II. Vertientes analíticas desde una perspectiva de género. *Salud Mental*, 26(1): 32-41, 2003.
19. SAMHSA. Office of Applied Studies. National Household Survey on Drug Abuse. 2002.
20. SECRETARÍA DE SALUD, INSTITUTO MEXICANO DE PSIQUIATRÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: Primera Encuesta Nacional de Adicciones. México, 1989.
21. SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA: Segunda Encuesta Nacional de Adicciones. México, 1994.
22. SECRETARÍA DE SALUD, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, INSTITUTO MEXICANO DE PSIQUIATRÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México, 1999.
23. SECRETARÍA DE SALUD, CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA: Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones. Resumen Ejecutivo. México, 2002.
24. TAPIA R, MEDINA-MORA ME, SEPULVEDA J, DE LA FUENTE R, KUMATE J: La Encuesta Nacional de Adicciones en México. *Salud Pública Mex.* 32: 507-522, 1990.
25. TAPIA R, CRAVIOTO P, MEDINA-MORA ME, HOY M, KURI P: Encuestas nacionales de adicciones 1988, 1993, 1998. En: Peña-Corona MP, Kuri P, Tapia R (eds). El consumo de tabaco en México y encuesta nacional de adicciones 1998. Tabaco. Secretaría de Salud, 53-59, México, 2000.
26. TAPIA-CONYER R, KURI P, CRAVIOTO P y cols.: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). En: Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México. CONADIC, SSA, 51-63, México, 2001.
27. TAPIA-CONYER R, KURI P, CRAVIOTO P y cols.: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). En: Observatorio Mexicano en tabaco, alcohol y otras drogas 2002, CONADIC, SSA, México, 33-61, 2002.
28. TAPIA R, CRAVIOTO P, DE LA ROSA B, GALVÁN F, MEDINA-MORA ME: Historia natural del consumo de la cocaína: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. *Salud Mental*, 26(2), 12-21, 2003.
29. THE WHO WORLD MENTAL HEALTH SURVEY CONSORTIUM: Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *JAMA*, 291(21): 2581-2590, 2004.
30. VILLATORO J, MEDINA-MORA M.E, CARDIEL H, FLEIZ C, ALCÁNTAR EN, HERNÁNDEZ S, PARRA J, NÉQUIZ G: La situación del consumo de sustancias entre estudiantes de la Ciudad de México: Medición otoño 1997. *Salud Mental*, 22(2): 18-30, 1999.

31. VILLATORO J, MEDINA-MORA M.E, ROJANO C, FLEIZ C, BERMÚDEZ P, CASTRO P, JUÁREZ, F: ¿Ha cambiado el consumo de drogas de los estudiantes? Resultados de la encuesta de estudiantes. Medición otoño del 2000. Salud Mental. 25(1): 43-54, 2002.
32. VILLATORO J, MEDINA-MORA ME, HERNÁNDEZ M, FLEIZ C, AMADOR N, BERMÚDEZ, P: La encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de la ciudad de México: noviembre 2003. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. Salud Mental. En prensa. 2004.
33. WORLD HEALTH ORGANIZATION: Global Status Report on Alcohol. Ginebra, Suiza, pp. 391, 1999.
34. WORLD HEALTH ORGANIZATION: The World Health Report. Ginebra, Suiza, 2002.

GLOSARIO

Glosario

A

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Actividades cuyo propósito fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado y generar ingresos monetarios y/o en especie.

ÁREA DE LISTADO (AL). Porción de terreno perfectamente delimitada y localizada dentro de una ageb, que ha sido seleccionada mediante métodos probabilísticos y dentro de la cual se realiza el listado de viviendas, para posteriormente seleccionar las unidades de viviendas donde se realizarán las entrevistas.

ÁREAS GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS (Ageb). Subdivisión de los municipios o delegaciones que conforman el país, utilizada por primera vez en el X Censo General de Población y Vivienda 1980. Su utilidad radica en permitir la formación de unidades primarias de muestreo y la organización de la información estadística. Tiene tres atributos fundamentales: a) es perfectamente reconocible en el terreno por estar delimitada por rasgos topográficos identificables y perdurables; b) por lo general es homogénea en cuanto a sus características geográficas, económicas y sociales; c) su extensión es tal que puede ser recorrida por una sola persona. Las ageb se clasifican en más y menos urbanizadas, dependiendo de su densidad de viviendas. Una ageb menos urbanizada puede comprender una o más localidades menores a 100 000 habitantes.

C

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD. Clasificación de la población de 12 y más años activa o inactiva, de acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica o con la búsqueda activa de ésta en la semana de referencia.

CONDICIÓN DE INACTIVIDAD. Clasificación de la población no económicamente activa, según el motivo de inactividad: estudiantes, amas de casa, pensionados o jubilados, incapacitados y otros inactivos.

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN. Distinción de la población económicamente activa en ocupada y desocupada o desempleada abierta, de acuerdo con el desempeño de un trabajo o de la búsqueda activa de uno, respectivamente.

CUESTIONARIO BÁSICO (CB). Instrumento de levantamiento de la Encuesta Nacional de Adicciones mediante el cual se capta el consumo de tabaco, alcohol y drogas en la población de 12 a 65 años.

E

EDAD. Se capta en años cumplidos al momento de la entrevista.

ESTADO CIVIL. Es la situación que cada persona de 12 años y más tiene de acuerdo con las leyes o costumbres conyugales o matrimoniales del país, las cuales son:

- Soltero(a). Persona que nunca ha estado casado(a) o en unión libre.
- Casado(a). Persona que ha contraído matrimonio conforme a la ley y/o de acuerdo con cualquier religión.
- Unión Libre. Persona que vive con su pareja como si estuviera casada, sin estarlo.
- Divorciado(a). Persona que se encuentra separada por una sentencia de divorcio dictada por la autoridad competente y que no ha vuelto a casarse ni a vivir en unión libre.
- Separado(a). Se refiere a la persona que vive separada de hecho de su cónyuge o compañero (sin mediar una sentencia legal), sin que se haya vuelto a casar o vivir en unión libre.
- Viudo(a). Persona que ha perdido a su esposo(a) compañero(a) por fallecimiento y no se ha vuelto a casar ni a vivir en unión libre.

G

GRUPOS DE OCUPACIÓN. Clasificación de los ocupados, según las tareas o funciones específicas que desempeñaron en su trabajo en la semana de referencia.

H

HOGAR. Persona o conjunto de personas que viven en una misma vivienda, que hacen vida en común, comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar o proveniente de transferencias) destinado a cubrir su sustento.

N

NIVEL DE INGRESOS. Mide la percepción monetaria mensual de los ocupados.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN O DE ESCOLARIDAD. Registra el último curso educativo formal aprobado por las personas de 6 años y más.

P

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEA O ACTIVOS. Son todas las personas de 12 y más años que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban parte de la población desocupada abierta.

POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEI O INACTIVOS. Personas de 12 y más años que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas ni eran parte de la población desocupada abierta.

R

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. Clasifica a los ocupados de acuerdo con el tipo de producto o servicio que se genera en la empresa, negocio o institución donde trabajaron en la semana de referencia.

RELIGIÓN. Culto al que declare pertenecer la persona entrevistada. La clasificación es: católica, protestante o evangélica, judía, otra religión y ninguna.

RESIDENTE DE LA VIVIENDA. Personas que unidas o no por lazos de parentesco habitan regularmente en la vivienda (o al menos duermen en ella la mayor parte de la semana) sosteniéndose de un gasto común. Incluye las que se encuentran temporalmente ausentes.

RESIDENTE HABITUAL DE LA VIVIENDA. Personas que duermen la mayor parte de la semana en la vivienda seleccionada. También se considera como residentes habituales a los sirvientes y a los hijos de éstos, siempre y cuando duerman en la vivienda, así como a todas aquellas personas que hayan llegado a la vivienda hasta el último día de la semana de referencia con la intención de permanecer en ella por un periodo mayor a tres meses.

S

SEMANA DE LEVANTAMIENTO. Espacio temporal de siete días (lunes a domingo) durante los cuales el operativo de campo de la encuesta realiza las entrevistas en las viviendas seleccionadas.

SEXO. Condición orgánica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

T

TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES (TRH). Instrumento de levantamiento de la encuesta, que capta información sobre las viviendas y las características sociodemográficas de todos los miembros del hogar.

TIPO DE LOCALIDAD. Se entiende por localidad a un conjunto de viviendas reconocido por un nombre dado por ley o costumbre; los resultados de la encuesta consideran dos tipos:

- Área urbana. Localidades conformadas por un número mayor o igual a 2 500 habitantes.
- Área rural. Son localidades que tienen menos de 2 500 habitantes.

V

VIVIENDA. Espacio físico con entrada independiente que puede albergar uno o varios hogares. Únicamente son motivo de entrevista para la encuesta las viviendas particulares (destinadas al alojamiento de las familias). Se excluyen las viviendas colectivas (hoteles, cárceles, posadas, conventos, hospitales, cuarteles, etcétera).

VIVIENDAS NO ENTREVISTADAS. Motivos por los cuales no fue posible recolectar la información en una vivienda que originalmente se seleccionó para la entrevista. Éstas se clasifican en:

- Tipo "A" (viviendas ocupadas). Viviendas en las que no fue posible realizar la entrevista por diferentes motivos, como el no encontrar a sus residentes o la renuencia a proporcionar la información.
- Tipo "B" (viviendas desocupadas). Viviendas que están desocupadas por encontrarse deterioradas, en construcción o acondicionadas como negocios temporales.
- Tipo "C" (viviendas no localizadas). Viviendas que no fueron localizadas por haber sido demolidas, cambiadas de sitio, transformadas en negocios permanentes o fusionadas estructuralmente con otras viviendas no seleccionadas.
- Tipo "D" (seleccionado sin información). Entrevistas no logradas por situaciones relacionadas con la persona seleccionada, tales como: ausencia, negativa, incapacidad, o por tratarse de una vivienda en donde las personas que la habitan están fuera del rango de edad establecido.

ANEXO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA ENCUESTA

1. Aspectos generales de la encuesta

1.1 ANTECEDENTES

La Encuesta Nacional de Adicciones 2002 es un proyecto conjunto de la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cuya finalidad es generar información estadística a nivel nacional acerca del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entre la población de 12 a 65 años. Adicionalmente, busca identificar los patrones de consumo de las sustancias referidas entre las personas entrevistadas, relacionando este fenómeno con algunos factores como son: el sexo, la edad, el nivel de escolaridad y tipo de localidad, entre otros.

Dentro de la temática que cubre la ENA 2002 destaca:

- El consumo de tabaco, alcohol, drogas médicas (opiáceos, tranquilizantes, anfetaminas, sedantes y barbitúricos) y drogas ilegales (mariguana, cocaína, heroína, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas).
- Identifica además algunas situaciones por las que ha pasado la población consumidora, y su opinión acerca del tema.

La información se presenta relacionada con las variables sociodemográficas más comunes (sexo, edad y escolaridad); los tabulados se presentan por tamaño de localidad: áreas urbanas (localidades con 2 500 habitantes o más) y áreas rurales (localidades con menos de 2 500 personas). Las características mencionadas se captaron mediante la aplicación de una tarjeta de registro de hogares (TRH), la cual contiene, además de las variables señaladas, información sobre las características más sobresalientes de la vivienda y el área geográfica donde está ubicada, la tipología del hogar y algunas variables contextualizadoras: estado civil, el número de hijos nacidos vivos, la condición de residencia y religión.

1.2 OBJETIVO GENERAL

- El objetivo de la encuesta es contar con una base de información estadística sobre las características del uso de diversas sustancias entre la población de 12 a 65 años a nivel nacional, así como lo concerniente a los patrones de consumo predominantes entre la población entrevistada, relacionando esas condiciones con los factores sociodemográficos y económicos de las personas.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar el consumo de tabaco y alcohol, así como el patrón observado y su uso en los últimos 12 meses, haciendo énfasis en la cantidad y la frecuencia.
- Conocer los problemas derivados del consumo de alcohol.
- Determinar el consumo de las siguientes sustancias: drogas médicas, drogas ilegales (mariguana, cocaína e inhalables) y otras drogas.
- Investigar respecto a las sustancias mencionadas en el párrafo anterior la edad que se tenía al primer consumo, número de veces que se ha(n) utilizado y lugar o fuente de obtención, así como frecuencia del uso a lo largo de la vida, en el último mes y en el último año.
- Conocer respecto a las drogas médicas si se utilizaron fuera de prescripción médica, en relación con el tiempo de uso, a las dosis indicadas o con una finalidad diferente a la prescrita.
- Investigar qué problemas se han experimentado debido al uso de las sustancias referidas.
- Obtener información acerca de la ayuda solicitada en relación con los problemas surgidos por el consumo de tabaco, drogas y/o bebidas alcohólicas.

1.4 DISEÑO DE LA MUESTRA

El diseño de la muestra es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados.

Marco muestral

Para realizar la ENA 2002 se contó con el marco muestral de propósitos múltiples del INEGI, constituido por la información demográfica y cartográfica obtenida a partir del levantamiento del Censo de Población y Vivienda de 1995, cuya organización se presenta a continuación.

Al interior de cada entidad federativa se conforman zonas que agrupan a las localidades de la siguiente manera:

Formación de unidades de muestreo

Unidad primaria de muestreo (UPM)

Las unidades primarias de muestreo (UPM) están constituidas por una o parte de un Área geoestadística básica (Ageb)¹, o de varias colindantes; esto aplica cuando no se completa el mínimo de viviendas requeridas para formar la UPM. Dependiendo de la zona de referencia, su constitución es la siguiente:

ZONA	DESCRIPCIÓN
Urbano alto	Ciudades y áreas metropolitanas objeto de estudio de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).
	Resto de las ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.
Complemento urbano de alta densidad	Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.
Complemento urbano de baja densidad	Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.
Rural	Localidades con menos de 2 500 habitantes.

UPM en urbano alto:

- Un Ageb con un mínimo de 480 viviendas.
- La unión de dos o más Ageb colindantes y del mismo estrato, con un mínimo de 480 viviendas en conjunto.

UPM en el resto de las zonas:

Un Ageb o la unión de dos o más Ageb que contengan:

- De 100 a 1 000 viviendas en localidades urbanas.
- De 50 a 850 viviendas en localidades rurales.

¹ Áreas geoestadísticas básicas definidas por el INEGI de acuerdo con características afines, tamaño y tiempo de recorrido similares.

Cabe aclarar que en la zona rural, por lo regular, una Ageb está conformada por varias localidades con población menor a 2 500 habitantes, por lo tanto la dispersión de la población en el área geográfica puede ser muy grande, en este caso se clasifican en UPM con población no dispersa o de fácil acceso y UPM con población dispersa o de difícil acceso.

Dependiendo del tipo de situación que tenga la UPM, se le aplicó el tratamiento correspondiente en el momento de la selección de la última etapa.

Unidad secundaria de muestreo (USM)

USM en urbano alto:

La formación de la USM o área de listado se realiza únicamente en las ciudades ENEU y está conformada por la agrupación de viviendas con las siguientes condiciones:

- Puede estar formada por una manzana que tenga un mínimo de 40 viviendas habitadas.
- Puede estar formada por dos o más manzanas contiguas con al menos 40 viviendas habitadas.

USM en el resto de las zonas:

En las zonas definidas como no ENEU, la unidad secundaria de muestreo está constituida por las viviendas particulares habitadas permanentemente o aptas para habitarse.

Unidad terciaria de muestreo (UTM)

Las unidades terciarias de muestreo se definen solamente en la zona denominada ciudades ENEU y se conforman por las viviendas particulares, habitadas permanentemente o aptas para habitarse.

Esquema de muestreo

La ENA 2002 fue diseñada con base en un esquema de muestreo probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados:

a) Probabilístico

Esto significa que las unidades de selección tienen una probabilidad conocida, y distinta de cero, de entrar en la muestra para cada miembro de la población, lo cual permite conocer la precisión de los resultados muestrales.

b) Estratificado

Porque las unidades de selección son agrupadas por características similares de tipo geográficas y socioeconómicas.

c) Polietápico

Porque la unidad última de selección (vivienda) es seleccionada después de varias etapas.

d) Por conglomerados

Porque previamente se conforman conjuntos de unidades muestrales de los cuales se obtiene la muestra.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra fue calculado para dar estimaciones a nivel nacional, tomando como variable pivote la proporción de personas que, según el levantamiento de 1998, manifestaron haber consumido alguna vez drogas ilegales, para lo cual se empleó la siguiente expresión:

$$n = \frac{z^2 q \text{DEFF}}{r^2 p (1 - \text{TNR}) (\text{PHV})}$$

Donde:

- n = Tamaño de la muestra.
- p = Estimación de la proporción.
- q = (1-p).
- r = Error relativo máximo aceptable.
- z = Valor asentado en las tablas estadísticas de la distribución normal para una confianza prefijada.
- DEFF = Cociente de la varianza del diseño utilizado entre la varianza del muestreo aleatorio simple para un mismo tamaño de muestra.
- TNR = Tasa de no respuesta esperada.
- PHV = Promedio de habitantes por vivienda.

Con base en un nivel de confianza de 90%, un efecto de diseño de 2.183, un error relativo máximo esperado de 5.45%, una tasa de no respuesta máxima esperada de 15%, un promedio de habitantes por vivienda de tres, para una proporción de 5.27%, se obtuvo un tamaño de muestra de 14 019, el cual se ajustó a 14 020 viviendas a nivel nacional.

Afijación de la muestra

La afijación de la muestra se realiza dentro de cada entidad entre los diferentes estratos de manera proporcional a su tamaño, para lo cual se emplea la siguiente expresión:

$$m_{eh} = \frac{m_{eh}}{m_e} m_e$$

Donde:

- m_{eh} = Número de viviendas en muestra para el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.
- m_e = Número total de viviendas en muestra para la e-ésima entidad.
- M_{eh} = Número total de viviendas en el e-ésimo estrato en la e-ésima entidad.
- M_e = Número total de viviendas en la e-ésima entidad.

Selección de la muestra

La selección de la muestra para la ENA 2002 se realizó de forma independiente en cada entidad y estrato con el siguiente procedimiento.

Urbano alto (ciudades ENEU)

1. De las k áreas de listado seleccionadas por UPM de la ENEU, se seleccionaron k^* áreas de listado para la ENA 2002, empleando muestreo sistemático con arranque aleatorio.

De estas áreas de listado se seleccionaron cinco viviendas empleando muestreo sistemático con arranque aleatorio; en consecuencia, la probabilidad de seleccionar una vivienda es:

$$P \{ V_{ehijs} \} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \cdot \frac{6m_{ehij}}{m_{ehi}} \cdot \frac{k}{6} \cdot \frac{k^*}{k} \cdot \frac{5}{m_{ehij}^*} \cdot \frac{5k^* n_{eh} m_{ehij}}{m_{eh} m_{ehij}^*}$$

Donde:

n_{eh} = Número de UPM a seleccionar en el h -ésimo estrato en la e -ésima entidad.

m_{ehi} = Número de viviendas de la i -ésima UPM en el h -ésimo estrato de la e -ésima entidad.

m_{eh} = Número de viviendas en el h -ésimo estrato de la e -ésima entidad.

m_{ehij} = Número total de viviendas en la j -ésima USM de la i -ésima UPM en el h -ésimo estrato de la e -ésima entidad.

k^* = Número total de USM seleccionadas para la ENA 2002.

m_{ehij}^* = Número total de viviendas en la j -ésima UPM en el h -ésimo estrato para la e -ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.

Su factor de expansión está dado por:

$$F_{ehijs} = \frac{m_{eh} m_{ehij}^*}{5 n_{eh} m_{ehij}}$$

Urbano alto (ciudades no ENEU) y complemento urbano

1. Entre las n_{eh} UPM que se seleccionaron en el marco con probabilidad proporcional a su tamaño, se seleccionaron n_{eh}^* UPM con igual probabilidad.
2. En cada UPM seleccionada, se seleccionaron 20 viviendas con muestreo sistemático y arranque aleatorio.

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una vivienda es:

$$P\{V_{ehijs}\} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \frac{n_{eh}^*}{n_{eh}} \frac{20}{m_{ehi}^*} \frac{20m_{ehi} n_{eh}^*}{m_{eh} m_{ehij}^*}$$

Donde:

n_{eh} = Número de UPM seleccionadas en el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

m_{ehi} = Número de viviendas de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

m_{eh} = Número de viviendas en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

m_{ehi}^* = Número total de viviendas en la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.

n_{eh}^* = Número de UPM seleccionadas para la ENA 2002 en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Su factor de expansión está dado por: $F_{ehis} = \frac{m_{eh} m_{ehi}^*}{20 m_{ehi} n_{eh}^*}$

Rural

1. Entre las n_{eh} UPM que se seleccionaron en el marco con probabilidad proporcional a su tamaño, se seleccionaron n_{eh}^* UPM con igual probabilidad.
2. En cada UPM seleccionada se seleccionaron dos segmentos de diez viviendas aproximadamente, con igual probabilidad.

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una vivienda está dada por:

$$P\{V_{ehis}\} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \frac{n_{eh}^*}{n_{eh}} \frac{2 \cdot 10}{m_{ehi}^*} \frac{20 m_{ehi} n_{eh}^*}{m_{eh} m_{ehij}^*}$$

Donde:

n_{eh} = Número de UPM seleccionadas en el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

m_{ehi} = Número de viviendas de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

m_{eh} = Número de viviendas en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

m_{ehi}^* = Número total de viviendas en la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.

n_{eh}^* = Número de UPM seleccionadas para la ENA 2002 en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Su factor de expansión está dado por: $F_{ehis} = \frac{m_{eh} m_{ehij}^*}{5 n_{eh} m_{ehij}}$

Estimadores

El estimador del total de la característica X:

A nivel nacional es: $\hat{X}_{NAL} = \sum_h \sum_i \sum_j \sum_s F_{ehijs}^{ENEU} (\sum_{ehij} X_{ehij}^{ENEU}) + \sum_h \sum_i \sum_s F_{ehis}^R (\sum_{ehisl} X_{ehisl}^R) + \sum_h \sum_i \sum_s F_{ehis}^{CU} (\sum_{ehisl} X_{ehisl}^{CU})$

Donde:

F_{ehijs}^{ENEU} = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la j-ésima USM, de la i-ésima UPM, en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

X_{ehijl}^{ENEU} = Valor observado de la característica de interés X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la j-ésima USM de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

F_{ehis}^R = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato en la e-ésima entidad del área rural.

X_{ehisl}^R = Valor observado de la característica X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la j-ésima UPM del h-ésimo estrato en la e-ésima entidad del área rural.

F_{ehis}^{CU} = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato en la e-ésima entidad del área complemento urbano.

X_{ehisl}^{CU} = Valor observado de la característica X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato para la e-ésima entidad del área complemento urbano.

Para la estimación de proporciones, tasas y promedios, se utiliza el estimador de razón.

$$\hat{R}_{NAL} = \frac{\hat{X}_{NAL}}{\hat{Y}_{NAL}}$$

Donde, la variable \hat{Y}_{NAL} es definida en forma análoga a \hat{X}_{NAL} .

Estimación de las precisiones

En la evaluación de los errores de muestreo de las principales estimaciones nacionales proporcionadas por la ENA-2002 se utilizó el método de conglomerados últimos. El término conglomerados últimos se utiliza para denotar el total de unidades en muestra de una Unidad Primaria de Muestreo². En consecuencia, la UPM de la primera etapa de muestreo, es una parte importante en el cálculo de la varianza de estimadores lineales (p. ej. totales). Así, el método de conglomerados últimos, conjuntamente con el de series de Taylor, son aplicados a los estadísticos no lineales para estimar las precisiones de estos últimos.

² Véase: Hansen, M. H., Horwitz, W. N. y Madow, W. G., Sample Survey Methods and Theory, (1953), vol. 1, p. 242.

La fórmula empleada para calcular la precisión \hat{R}_{NAL} de es la siguiente.

$$V(\hat{R}_{NAL}) = \frac{1}{\hat{Y}_{NAL}^2} \sum_h^{32} \left\{ \sum_h^{L_e} \frac{n_{eh}}{n_{eh}-1} \sum_i^{n_{eh}} [(X_{ehi} - 1) \frac{\hat{X}_{eh}}{n_{eh}} - \hat{R}_{NAL} (Y_{ehi} - \frac{1}{n_{eh}} Y_{eh})]^2 \right\}$$

Donde:

\hat{X}_{ehi} = Total ponderado de la variable de estudio X para la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

\hat{Y}_{eh} = Total ponderado de la variable de estudio X para el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

n_{eh} = Número de UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Estas definiciones son análogas para la variable de estudio "Y".

La estimación de la precisión del estimador del total, se calcula con la fórmula siguiente:

$$\hat{V}(\hat{X}_{NAL}) = \sum_h^{32} \sum_h^{L_e} \frac{n_{eh}}{n_{eh}-1} \sum_i^{n_{eh}} (X_{ehi} - 1) \frac{\hat{X}_{eh}}{n_{eh}})^2$$

Las estimaciones de la desviación estándar (D.E.), coeficiente de variación (C.V.) y el efecto de diseño (DEFF), se calculan mediante las siguientes expresiones.

$$D.E. = \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}$$

$$C.V. = \frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}}{\hat{\theta}}$$

$$DEFF = \frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}}{\hat{V}(\hat{\theta})_{m\acute{a}s}}$$

Donde:

$\hat{\theta}$ = Estimador del parámetro poblacional $(\hat{\theta})$.

$\hat{V}(\hat{\theta})_{m\acute{a}s}$ = Estimador de la varianza, bajo muestreo aleatorio simple.

Finalmente, el Intervalo de confianza al 90%, está construido de la siguiente forma.

$$I_{1-\alpha} = (\hat{\theta} - 1.645 \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}, \hat{\theta} + 1.645 \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})})$$

donde el nivel de significancia es de $\alpha = 0.10$.

Errores esperados

En los siguientes cuadros se muestran los errores esperados por dominio de interés considerando una confianza de 90%, una tasa de no respuesta esperada de 15%, un promedio de habitantes entre 12 y 65 años por vivienda de tres y un efecto de diseño de 2.183.

Como se puede observar en el cuadro 2, los errores esperados para las proporciones de consumo de marihuana y consumo de drogas alguna vez son menores a 10%, mientras que para las proporciones de consumo de inhalables y cocaína los errores son mayores a 10%.

Cuadro 1
Distribución de la muestra por entidad federativa (1a. Parte)

Clave	Entidad	Viviendas seleccionadas			Total
		Urbano		Rural	
		ENEU	Complemento Urbano		
01	Aguascalientes	170	80	100	350
02	Baja California	370	80	100	550
03	Baja California Sur	170	80	100	350
04	Campeche	210	40	100	350
05	Coahuila de Zaragoza	260	40	100	400
06	Colima	210	40	100	350
07	Chiapas	210	100	140	450
08	Chihuahua	380	80	140	600
09	Distrito Federal	560	0	40	600
10	Durango	240	60	100	400
11	Guanajuato	230	60	160	450
12	Guerrero	210	120	120	450
13	Hidalgo	200	80	120	400
14	Jalisco	450	80	120	650
15	México	340	60	100	500
16	Michoacán de Ocampo	270	160	120	550
17	Morelos	190	60	100	350
18	Nayarit	170	80	100	350
19	Nuevo León	490	60	100	650
20	Oaxaca	200	80	120	400
21	Puebla	210	100	140	450
22	Querétaro de Arteaga	210	40	100	350
23	Quintana Roo	170	80	100	350

Cuadro 1
Distribución de la muestra por entidad federativa (2a. Parte).

24	San Luis Potosí	180	100	120	400
25	Sinaloa	150	80	120	350
26	Sonora	140	140	120	400
27	Tabasco	170	60	120	350
28	Tamaulipas	410	60	100	570
29	Tlaxcala	170	60	120	350
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	300	80	120	500
31	Yucatán	170	80	100	350
32	Zacatecas	210	80	160	450
Total		8 020	2 400	3 600	14 020

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Cuadro 2
Errores esperados para proporciones de algunas de las variables de interés dado un tamaño de muestra

Variable	P ³	z(90%)	deff	TNR	PHV	n = 14,020 r (%)
Mariguana	0.047	1.645	2.183	0.15	3	5.79
Inhalables	0.008	1.645	2.183	0.15	3	14.31
Cocaína	0.0145	1.645	2.183	0.15	3	10.60
Consumió alguna vez drogas	0.0527	1.645	2.183	0.15	3	5.45

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Errores esperados para diferentes proporciones dados los parámetros y el tamaño de muestra de 14 020 viviendas a nivel nacional

P	z(90%)	Deff	TNR	PHV	N=14,020 r(%)
0.01	1.645	2.183	0.15	3	12.79
0.02	1.645	2.183	0.15	3	9.00
0.03	1.645	2.183	0.15	3	7.31
0.04	1.645	2.183	0.15	3	6.30
0.05	1.645	2.183	0.15	3	5.60
0.06	1.645	2.183	0.15	3	5.09
0.07	1.645	2.183	0.15	3	4.69
0.08	1.645	2.183	0.15	3	4.36
0.09	1.645	2.183	0.15	3	4.09
0.10	1.645	2.183	0.15	3	3.86
0.12	1.645	2.183	0.15	3	3.48
0.13	1.645	2.183	0.15	3	3.33
0.14	1.645	2.183	0.15	3	3.19
0.15	1.645	2.183	0.15	3	3.06
0.18	1.645	2.183	0.15	3	2.74
0.20	1.645	2.183	0.15	3	2.57
0.25	1.645	2.183	0.15	3	2.23
0.30	1.645	2.183	0.15	3	1.96
0.35	1.645	2.183	0.15	3	1.75
0.40	1.645	2.183	0.15	3	1.57
0.45	1.645	2.183	0.15	3	1.42
0.50	1.645	2.183	0.15	3	1.29

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Como se puede observar en el cuadro 3, los errores esperados que se obtienen para proporciones menores a 1% son mayores a 10% y para proporciones mayores a 2% son menores a 10%.

1.5 LEVANTAMIENTO

El levantamiento de la ENA-2002 se realizó de febrero a mayo de ese año, con una infraestructura de personal específicamente capacitado para el levantamiento de esta encuesta. La ENA se aplicó utilizando una tarjeta de registro de hogares, e inmediatamente después del llenado de ésta, se seleccionaba una persona cuya edad estuviera entre 12 y 65 años, para que en forma privada respondiera las preguntas contenidas en el cuestionario básico correspondiente.

Como se mencionó, el material utilizado consistió en una tarjeta de registro de hogares (TRH), comúnmente aplicada en las encuestas de ese tipo realizadas por el INEGI, así como un cuestionario específico sobre el tema, en el cual se recogieron las respuestas de la población de 12 a 65 años seleccionados en los hogares que se visitaron. La riqueza de la ENA consiste no solamente en las cifras y prevalencias que se pueden obtener de las preguntas del cuestionario utilizado, sino que éstas pueden relacionarse con las características de la población entrevistada: edad, sexo, estado civil, escolaridad, etc., particularidades que son captadas mediante la aplicación de la TRH, y que permiten vincular algunas variables importantes con los comportamientos referidos por las personas entrevistadas.

1.6 PERIODO DE REFERENCIA

La tarjeta de registro de hogares capta los datos requeridos en ella con una temporalidad específica; así las características de la vivienda y la zona donde está ubicada se obtienen al momento de la entrevista, lo mismo ocurre con los servicios de la vivienda y la tipología del hogar que la habita; los datos sociodemográficos de los miembros del hogar se establecen tomando como referencia el día de la entrevista. Con la finalidad de determinar claramente la caracterización laboral de las personas que son residentes habituales de la vivienda, la condición de residencia se pregunta utilizando como referencia la semana anterior a la entrevista.

La mayor parte de las preguntas con algunas excepciones, se plantean en forma intemporal, inquiriendo inicialmente sobre el consumo de determinadas sustancias, sin importar la temporalidad del hecho, tal como se puede apreciar en el cuestionario anexo a esta publicación. Sin embargo, buscando establecer patrones de consumo consuetudinario o habitual, para cada una de las sustancias de interés, se pregunta sobre la edad a la que se utilizó por primera vez, cuántas veces se ha empleado, la última vez que se usó y cuántos días se consumió en el mes anterior a la entrevista.

1.7 OPERATIVO DE CAMPO

Previo al operativo se llevó a cabo la capacitación del personal que participaría en el levantamiento, para lo cual se concentró al personal en la ciudad de Aguascalientes, donde un equipo especializado de instructores impartió la capacitación tanto para la TRH como para el cuestionario. En ese evento se enfatizó sobre todo la caracterización de las diferentes sustancias y sus usos, con la finalidad de familiarizar a los capacitandos con los diversos tipos de drogas y las formas habituales de consumo, las unidades de medida a utilizar para determinar los consumos de alcohol, así como prevenirlos sobre algunas situaciones que se podían presentar cuando se tocan los temas relativos al consumo de drogas, tales como suspicacia, búsqueda de consejo, desahogos emocionales, etcétera.

El operativo de campo propiamente dicho comprendió las siguientes etapas:

- a) Levantamiento de entrevistas.
- b) Supervisión del trabajo de campo:
 - b.1) Observación: consistió en la observación directa de la aplicación de un número determinado de entrevistas, acompañando a los entrevistadores en algunas viviendas seleccionadas, con el fin de detectar eventuales errores en el transcurso de la recolección de la información.
 - b.2) Verificación de visita: se seleccionó una entrevista completa por cada listado de viviendas, acudiendo a ella para verificar que se había visitado y que la persona seleccionada hubiera respondido directamente el cuestionario.
 - b.3) Supervisión de la no entrevista: en las viviendas que por cualquier causa no se pudo lograr la entrevista, se acudió a corroborar o rectificar la causa de esa situación, recuperando, si era el caso, la información en las viviendas habitadas.
- c) Crítica y codificación de la información, así como control de calidad de la totalidad del proceso.

Los resultados definitivos obtenidos en el levantamiento se resumen en el siguiente cuadro:

Concepto	Absoluto	Relativo
Viviendas seleccionadas	14 043	100.00
Viviendas de entrevista	11 252	80.13
Viviendas de no entrevista	2 791	19.87
Tipo "A" (Viviendas ocupadas)	298	2.12
Tipo "B" (Viviendas desocupadas)	1 588	11.31
Tipo "C" (Viviendas no localizadas)	201	1.43
Tipo "D" (Seleccionado sin información)	704	5.01

Fuente: ENA 2002, CONADIC, INP RFM, DGE, INEGI.

Cabe señalar que en 536 viviendas, que representan 3.8% de las seleccionadas, se aplicó únicamente la tarjeta de registro de hogares, ya que carecían de residentes habituales dentro del rango de edad requerido por la encuesta. La población de las viviendas referidas, forma parte de la población total obtenida por la expansión de la muestra de la ENA 2002, no así en lo que respecta al cuestionario básico utilizado, debido a que no hubo respuesta en éste.

1.8 INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN

Como se mencionó para captar la información de la Encuesta Nacional de Adicciones, se utilizó la tarjeta de registro de hogares y el cuestionario básico.

A continuación se especifica cual fue el objetivo de cada uno de estos instrumentos de captación:

a) Tarjeta de registro de hogares

La TRH es un formato en el que se registran los datos básicos de cada unidad en muestra, que es útil para recolectar las características de la vivienda y la zona en que está ubicada, así como los datos sociodemográficos del hogar albergado en ella. Adicionalmente, permite identificar a la persona seleccionada que responderá el cuestionario de adicciones y determinar el tipo de no entrevista observado para su posterior supervisión. Las preguntas de esta tarjeta en particular, podían ser respondidas por cualquier residente de la vivienda que contara con 15 o más años y que conociera los datos que se solicitarían; no así el cuestionario básico, el cual debía ser respondido específicamente por la persona que hubiera resultado seleccionada, de acuerdo con el método que se describirá más adelante. Fue aplicada en todos los hogares entrevistados y permitió:

- Obtener información sobre las características generales de la vivienda, como: tipo, condición de propiedad de la misma, número de cuartos, material de construcción, servicios en la vivienda y equipamiento con que cuenta el hogar.
- Determinar la clasificación del tipo de hogar que conforman los residentes habituales.
- Investigar las características predominantes de la zona donde se ubica la vivienda seleccionada.
- Determinar el tipo de no entrevista observado, clasificándolo de acuerdo con su causa como tipo A (viviendas ocupadas), B (viviendas desocupadas), C (situaciones muestrales) y D (situaciones relacionadas con el informante).

- Obtener información sociodemográfica de todas las personas que cumplieran con los criterios de residentes habituales del hogar, tales como: parentesco, sexo, día y mes de nacimiento, edad, estado civil, fecundidad, escolaridad, condición de residencia, elegibilidad, filiación a servicios médicos, religión profesada y caracterización laboral.
- Identificar a la persona del rango de edad determinado que respondería el cuestionario de adicciones.

b) Cuestionario básico

Una vez llenada la TRH, por medio de los datos de día y mes de nacimiento, se identificaba a la persona más próxima a cumplir años, cuya edad estuviera entre los 12 y 65. Este método, ya utilizado con anterioridad, al ser rigurosamente aplicado reproduce la distribución por grupos de edad y sexo de la población objetivo, dada su calidad de aleatoriedad.

Cabe hacer mención que debido a las preguntas que se aplicarían y al carácter mismo de la encuesta, en varias ocasiones durante la capacitación se enfatizó la necesidad de que el cuestionario básico se levantara bajo estrictas normas de confidencialidad, evitando en todo momento que durante la entrevista estuviera presente una tercera persona. Esto permitiría obtener respuestas directas que no estuvieran sesgadas por la actitud del informante, posiblemente inhibido ante la presencia de otros miembros del hogar.

Mediante el cuestionario básico, se indagó entre los seleccionados el uso de diversas sustancias, además de las particularidades de los patrones de su consumo. De acuerdo con las diferentes variables y drogas que interesaban para el estudio, el cuestionario se dividió en dieciocho capítulos o secciones:

- Historia migratoria.
- Consumo de tabaco.
- Uso de alcohol.
- Opiáceos.
- Tranquilizantes.
- Sedantes y barbitúricos.
- Anfetaminas.
- Marihuana.
- Cocaína.
- Pasta de cocaína.
- Crack.
- Alucinógenos.
- Inhalables.
- Heroína.
- Metanfetaminas.
- Problemas relacionados con el consumo de drogas.
- Utilización de servicios de asistencia contra adicciones.
- Opinión sobre la gravedad del uso de drogas, información sobre su consumo y asistencia a cursos sobre el tema.

1.9 PLAN DE TABULACIONES

Los tabulados desarrollados tomaron en cuenta el tipo de pregunta, es decir cuantitativa o de opinión, relacionando la respuesta dada con las características sociodemográficas de las personas. En los casos de las preguntas específicas sobre el consumo de las sustancias de interés para el estudio, se utilizó la clasificación de las mismas proporcionada por la Secretaría de Salud.

1.10 NOTA METODOLÓGICA

Es importante señalar que esta encuesta se realizó con una metodología relativamente diferente a la utilizada en las encuestas anteriores. Entre otros aspectos, se incluyó por primera vez el componente rural, además no se realizó sobremuestreo de las ciudades, ni de adolescentes que se hizo en la encuesta de 1998. Por ello, es importante señalar que al analizar las tendencias del consumo entre las diversas encuestas, se considere que en sentido estricto, esta encuesta no es totalmente comparable con las anteriores.

ANEXO 2

2.1 INDICADORES DE TABACO

2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (1a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	31,393,657	38,373,410
Nunca ha fumado tabaco	41,240,234	12,674,050	28,566,184
Alguna vez ha fumado tabaco	28,526,833	18,719,607	9,807,226
2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:	28,526,833	18,719,607	9,807,226
De 5 a 9 años	359,240	269,544	89,696
De 10 a 14 años	5,509,716	4,068,247	1,441,469
De 15 a 19 años	16,319,411	11,133,513	5,185,898
De 20 a 24 años	4,192,925	2,405,180	1,787,745
De 25 a 29 años	1,064,055	455,962	608,093
De 30 a 34 años	544,447	144,147	400,300
De B4835 años y más	500,586	208,481	292,105
No especificado	36,453	34,533	1,920
3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:	28,526,833	18,719,607	9,807,226
Fumador	16,371,601	11,359,627	5,011,974
Ex fumador	12,155,232	7,359,980	4,795,252
4. Población de 12 a 65 años que fuma por:	16,371,601	11,359,627	5,011,974
Cigarrillos fumados diariamente:			
No fuma diario ^a	7,722,599	5,204,058	2,518,541
De 1 a 5	5,513,258	3,930,886	1,582,372
De 6 a 10	1,668,638	1,153,762	514,876
De 11 a 20	906,336	709,774	196,562
Más de 20	560,770	361,147	199,623
Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:	16,371,601	11,359,627	5,011,974
Tiene dificultad	925,275	568,225	357,050
No tiene dificultad	15,446,326	10,791,402	4,654,924
Cigarrillo más difícil de dejar:	16,371,601	11,359,627	5,011,974
El primero de la mañana	1,213,599	771,662	441,937
El de después de comer	2,552,894	1,956,276	596,618
Cuando está bajo tensión	2,660,020	1,807,196	852,824
El de antes de dormir	1,629,382	1,191,863	437,519
Algún otro	1,402,183	953,793	448,390
Todos	585,201	386,256	198,945
No fuma a diario ^b	6,262,357	4,247,092	2,015,265
No especificado	65,965	45,489	20,476
Intentó dejar de fumar	16,371,601	11,359,627	5,011,974
Intentó	6,851,935	4,708,704	2,143,231
No intentó	9,519,666	6,650,923	2,868,743

2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (2a. Parte)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Nunca ha fumado tabaco	59.11	40,37	74,44
Alguna vez ha fumado tabaco	40.89	59,63	25,56
2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:	40.89	59.63	25.56
5 a 9 años	0.51	0.86	0.23
10 a 14 años	7.90	12.96	3.76
15 a 19 años	23.39	35.46	13.51
20 a 24 años	6.01	7.66	4.66
25 a 29 años	1.53	1.45	1.58
30 a 34 años	0.78	0.46	1.04
35 años y más	0.72	0.66	0.76
No especificado	0.05	0.11	0.01
3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:	40.89	59.63	25.56
Fumador	23.47	36.18	13.06
Ex fumador	17.42	23.44	12.50
4. Población de 12 a 65 años que fuma por:	23.47	36.18	13.06
Cigarrillos fumados diariamente:	23.47	36.18	13.06
No fuma diario ^a	11.07	16.58	6.56
De 1 a 5	7.90	12.52	4.12
De 6 a 10	2.39	3.68	1.34
De 11 a 20	1.30	2.26	0.51
Más de 20	0.80	1.15	0.52
Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:	23.47	36.18	13.06
Tiene dificultad	1.33	1.81	0.93
No tiene dificultad	22.14	34.47	12.13
Cigarrillo más difícil de dejar:	23.47	36.18	13.06
El primero de la mañana	1.74	2.46	1.15
El de después de comer	3.66	6.23	1.55
Cuando está bajo tensión	3.81	5.76	2.22
El de antes de dormir	2.34	3.80	1.14
Algún otro	2.01	3.04	1.17
Todos	0.84	1.23	0.52
No fuma diario ^b	8.98	13.53	5.25
No especificado	0.09	0.14	0.05
Intentó dejar de fumar:	23.47	36.18	13.06
Intentó	9.82	15.00	5.59
No intentó	13.64	21.19	7.48

2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (3a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	52,887,532	16,879,535
Nunca ha fumado tabaco	41,240,234	29,306,164	11,934,070
Alguna vez ha fumado tabaco	28,526,833	23,581,368	4,945,465
2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:	28,526,833	23,581,368	4,945,465
De 5 a 9 años	359,240	198,762	160,478
De 10 a 14 años	5,509,716	4,563,794	945,922
De 15 a 19 años	16,319,411	13,802,039	2,517,372
De 20 a 24 años	4,192,925	3,325,237	867,688
De 25 a 29 años	1,064,055	815,388	248,667
De 30 a 34 años	544,447	463,960	80,487
De 35 años y más	500,586	376,871	123,715
No especificado	36,453	35,317	1,136
3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:	28,526,833	23,581,368	4,945,465
Fumador	16,371,601	13,963,261	2,408,340
Ex fumador	12,155,232	9,618,107	2,537,125
4. Población de 12 a 65 años que fuma por: Cigarrillos fumados diariamente:	16,371,601	13,963,261	2,408,340
No fuma diario ^a	7,722,599	6,435,521	1,287,078
De 1 a 5	5,513,258	4,917,434	595,824
De 6 a 10	1,668,638	1,374,358	294,280
De 11 a 20	906,336	775,995	130,341
Más de 20	560,770	459,953	100,817
Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:	16,371,601	13,963,261	2,408,340
Tiene dificultad	925,275	738,777	186,498
No tiene dificultad	15,446,326	13,224,484	2,221,842
Cigarrillo más difícil de dejar:	16,371,601	13,963,261	2,408,340
El primero de la mañana	1,213,599	1,051,230	162,369
El de después de comer	2,552,894	2,131,626	421,268
Cuando está bajo tensión	2,660,020	2,537,711	122,309
El de antes de dormir	1,629,382	1,398,271	231,111
Algún otro	1,402,183	1,151,687	250,496
Todos	585,201	451,156	134,045
No fuma a diario ^b	6,262,357	5,175,615	1,086,742
No especificado	65,965	65,965	0
Intentó dejar de fumar	16,371,601	13,963,261	2,408,340
Intentó	6,851,935	5,634,308	1,217,627
No intentó	9,519,666	8,328,953	1,190,713

2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (4a. Parte y última)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Nunca ha fumado tabaco	59.11	55.41	70.70
Alguna vez ha fumado tabaco	40.89	44.59	29.30
2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:	40.89	44.59	29.30
De 5 a 9 años	0.51	0.38	0.95
De 10 a 14 años	7.90	8.63	5.60
De 15 a 19 años	23.39	26.10	14.91
De 20 a 24 años	6.01	6.29	5.14
De 25 a 29 años	1.53	1.54	1.47
De 30 a 34 años	0.78	0.88	0.48
De 35 años y más	0.72	0.71	0.73
No especificado	0.05	0.07	0.01
3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:	40.89	44.59	29.30
Fumador	23.47	26.40	14.27
Ex fumador	17.42	18.19	15.03
4. Población de 12 a 65 años que fuma por: Cigarrillos fumados diariamente:	23.47	26.40	14.27
No fuma diario ^a	11.07	12.17	7.63
De 1 a 5	7.90	9.30	3.53
De 6 a 10	2.39	2.60	1.74
De 11 a 20	1.30	1.47	0.77
Más de 20	0.80	0.87	0.60
Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:	23.47	26.40	14.27
Tiene dificultad	1.33	1.40	1.10
No tiene dificultad	22.14	25.00	13.16
Cigarrillo más difícil de dejar:	23.47	26.40	14.27
El primero de la mañana	1.74	1.99	0.96
El de después de comer	3.66	4.03	2.50
Cuando está bajo tensión	3.81	4.80	0.72
El de antes de dormir	2.34	2.64	1.37
Algún otro	2.01	2.18	1.48
Todos	0.84	0.85	0.79
No fuma diario ^b	8.98	9.79	6.44
No especificado	0.09	0.12	0.00
Intentó dejar de fumar:	23.47	26.40	14.27
Intentó	9.82	10.65	7.21
No intentó	13.64	15.75	7.05

^a Incluye a la población que no fumó en los últimos treinta días.

^b Excluye a la población que dejó de fumar en un lapso menor a 30 días.

2.2 TABULADOS DE TABACO

2.2 Índice de tabulados

- 2.2.1 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.2 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.3 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y nivel de escolaridad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.4 Fumadores pasivos de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.5 Fumadores pasivos de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según sexo
- 2.2.6 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.7 Fumadores pasivos de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.8 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.9 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.10 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y nivel de instrucción, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.11 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por nivel de instrucción, según grupos de edad
- 2.2.12 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por tipo de localidad y número diario de cigarrillos fumados, según sexo
- 2.2.13 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por tipo de localidad y dependencia al hábito tabáquico, según sexo
- 2.2.14 Fumadores pasivos de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.15 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por dependencia al hábito tabáquico, según grupos de edad
- 2.2.16 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por sexo y dependencia al hábito tabáquico, según grupos de edad

Cuadro 2.2.1

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Total	69,767,067	100.00	31,393,657	100.00	38,373,410	100.00
Fumador	16,371,601	23.47	11,359,627	36.18	5,011,974	13.06
Ex Fumador	12,155,232	17.42	7,359,980	23.44	4,795,252	12.50
No Fumador	41,240,234	59.11	12,674,050	40.37	28,566,184	74.44
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	23,715,545	100.00	29,171,987	100.00
Fumador	13,963,261	26.40	9,276,517	39.12	4,686,744	16.07
Ex Fumador	9,618,107	18.19	5,453,417	23.00	4,164,690	14.28
No Fumador	29,306,164	55.41	8,985,611	37.89	20,320,553	69.66
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	7,678,112	100.00	9,201,423	100.00
Fumador	2,408,340	14.27	2,083,110	27.13	325,230	3.53
Ex Fumador	2,537,125	15.03	1,906,563	24.83	630,562	6.85
No Fumador	11,934,070	70.70	3,688,439	48.04	8,245,631	89.61

Cuadro 2.2.2

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS SEXO,		PATRÓN DE CONSUMO					
	ABSOLUTO	RELATIVO	FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	16,371,601	100.00	12,155,232	100.00	41,240,234	100.00
DE 12 A 17 AÑOS	13,685,359	19.62	1,230,758	7.52	971,634	7.99	11,482,967	27.84
DE 18 A 29 AÑOS	20,178,586	28.92	5,919,830	36.16	3,187,272	26.22	11,071,484	26.85
DE 30 A 39 AÑOS	14,038,071	20.12	3,683,776	22.50	2,815,734	23.16	7,538,561	18.28
DE 40 A 49 AÑOS	11,552,872	16.56	3,300,915	20.16	2,558,723	21.05	5,693,234	13.81
DE 50 A 65 AÑOS	10,312,179	14.78	2,236,322	13.66	2,621,869	21.57	5,453,988	13.22
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	13,963,261	100.00	9,618,107	100.00	29,306,164	100.00
DE 12 A 17 AÑOS	9,915,026	18.75	999,081	7.16	705,963	7.34	8,209,982	28.01
DE 18 A 29 AÑOS	16,021,998	30.29	5,293,142	37.91	2,685,831	27.92	8,043,025	27.44
DE 30 A 39 AÑOS	10,792,042	20.41	3,258,923	23.34	2,331,339	24.24	5,201,780	17.75
DE 40 A 49 AÑOS	8,854,363	16.74	2,764,706	19.80	2,030,845	21.11	4,058,812	13.85
DE 50 A 65 AÑOS	7,304,103	13.81	1,647,409	11.80	1,864,129	19.38	3,792,565	12.94
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	2,408,340	100.00	2,537,125	100.00	11,934,070	100.00
DE 12 A 17 AÑOS	3,770,333	22.34	231,677	9.62	265,671	10.47	3,272,985	27.43
DE 18 A 29 AÑOS	4,156,588	24.63	626,688	26.02	501,441	19.76	3,028,459	25.38
DE 30 A 39 AÑOS	3,246,029	19.23	424,853	17.64	484,395	19.09	2,336,781	19.58
DE 40 A 49 AÑOS	2,698,509	15.99	536,209	22.26	527,878	20.81	1,634,422	13.70
DE 50 A 65 AÑOS	3,008,076	17.82	588,913	24.45	757,740	29.87	1,661,423	13.92

Cuadro 2.2.3

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO

TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
	ABSOLUTO	RELATIVO	FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	16,371,601	100.00	12,155,232	100.00	41,240,234	100.00
SIN INSTRUCCIÓN	5,202,793	7.46	846,320	5.17	776,223	6.39	3,580,250	8.68
PRIMARIA	26,293,176	37.69	4,801,783	29.33	4,489,587	36.94	17,001,806	41.23
SECUNDARIA	20,467,955	29.34	4,818,437	29.43	3,311,934	27.25	12,337,584	29.92
PREPARATORIA	9,348,936	13.40	3,023,747	18.47	1,657,721	13.64	4,667,468	11.32
UNIVERSIDAD	7,932,733	11.37	2,733,155	16.69	1,705,785	14.03	3,493,793	8.47
POSGRADO	521,474	0.75	148,159	0.90	213,982	1.76	159,333	0.39
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	13,963,261	100.00	9,618,107	100.00	29,306,164	100.00
SIN INSTRUCCIÓN	2,350,882	4.45	480,541	3.44	361,960	3.76	1,508,381	5.15
PRIMARIA	17,275,559	32.66	3,524,926	25.24	3,110,599	32.34	10,640,034	36.31
SECUNDARIA	16,665,799	31.51	4,320,135	30.94	2,856,906	29.70	9,488,758	32.38
PREPARATORIA	8,563,046	16.19	2,868,270	20.54	1,470,735	15.29	4,224,041	14.41
UNIVERSIDAD	7,512,143	14.20	2,621,230	18.77	1,603,925	16.68	3,286,988	11.22
POSGRADO	520,103	0.98	148,159	1.06	213,982	2.22	157,962	0.54
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	2,408,340	100.00	2,537,125	100.00	11,934,070	100.00
SIN INSTRUCCIÓN	2,851,911	16.90	365,779	15.19	414,263	16.33	2,071,869	17.36
PRIMARIA	9,018,981	53.43	1,276,857	53.02	1,378,988	54.35	6,363,136	53.32
SECUNDARIA	3,800,792	22.52	498,302	20.69	455,028	17.93	2,847,462	23.86
PREPARATORIA	785,890	4.66	155,477	6.46	186,986	7.37	443,427	3.72
UNIVERSIDAD	420,590	2.49	111,925	4.65	101,860	4.01	206,805	1.73
POSGRADO	1,371	0.01	0	0.00	0	0.00	1,371	0.01

Cuadro 2.2.4

FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Total	17,860,537	100.00	5,265,231	100.00	12,595,306	100.00
ÁREAS URBANAS	14,070,264	78.78	4,091,890	77.72	9,978,374	79.22
ÁREAS RURALES	3,790,273	21.22	1,173,341	22.28	2,616,932	20.78

Cuadro 2.2.5

FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	17,860,537	100.00	5,265,231	29.48	12,595,306	70.52
De 12 A 17 Años	5,235,696	29.31	2,306,969	43.82	2,928,727	23.25
De 18 A 29 Años	4,954,660	27.74	1,409,212	26.76	3,545,448	28.15
De 30 A 39 Años	2,674,560	14.97	391,189	7.43	2,283,371	18.13
De 40 A 49 Años	2,643,757	14.80	565,309	10.74	2,078,448	16.50
De 50 A 65 Años	2,351,864	13.17	592,552	11.25	1,759,312	13.97
ÁREAS URBANAS	14,070,264	100.00	4,091,890	29.08	9,978,374	70.92
De 12 A 17 Años	4,108,960	29.20	1,798,444	43.95	2,310,516	23.16
De 18 A 29 Años	3,974,093	28.24	1,126,844	27.54	2,847,249	28.53
De 30 A 39 Años	2,022,682	14.38	296,625	7.25	1,726,057	17.30
De 40 A 49 Años	2,136,852	15.19	484,087	11.83	1,652,765	16.56
De 50 A 65 Años	1,827,677	12.99	385,890	9.43	1,441,787	14.45
ÁREAS RURALES	3,790,273	100.00	1,173,341	30.96	2,616,932	69.04
De 12 A 17 Años	1,126,736	29.73	508,525	43.34	618,211	23.62
De 18 A 29 Años	980,567	25.87	282,368	24.07	698,199	26.68
De 30 A 39 Años	651,878	17.20	94,564	8.06	557,314	21.30
De 40 A 49 Años	506,905	13.37	81,222	6.92	425,683	16.27
De 50 A 65 Años	524,187	13.83	206,662	17.61	317,525	12.13

Cuadro 2.2.6

POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	13,685,359	100.00	6,807,951	100.00	6,877,408	100.00
Fumador	1,230,758	8.99	970,669	14.26	260,089	3.78
Ex Fumador	971,634	7.10	561,248	8.24	410,386	5.97
No Fumador	11,482,967	83.91	5,276,034	77.50	6,206,933	90.25
ÁREAS URBANAS	9,915,026	100.00	4,915,246	100.00	4,999,780	100.00
Fumador	999,081	10.08	757,017	15.40	242,064	4.84
Ex Fumador	705,963	7.12	355,785	7.24	350,178	7.00
No Fumador	8,209,982	82.80	3,802,444	77.36	4,407,538	88.15
ÁREAS RURALES	3,770,333	100.00	1,892,705	100.00	1,877,628	100.00
Fumador	231,677	6.14	213,652	11.29	18,025	0.96
Ex Fumador	265,671	7.05	205,463	10.86	60,208	3.21
No Fumador	3,272,985	86.81	1,473,590	77.86	1,799,395	95.83

Cuadro 2.2.7

FUMADORES PASIVOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	5,235,696	100.00	2,306,969	100.00	2,928,727	100.00
ÁREAS URBANAS	4,108,960	78.48	1,798,444	77.96	2,310,516	78.89
ÁREAS RURALES	1,126,736	21.52	508,525	22.04	618,211	21.11

Cuadro 2.2.8

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	24,585,706	100.00	31,496,002	100.00
Fumador	15,140,843	27.00	10,388,958	42.26	4,751,885	15.09
Ex Fumador	11,183,598	19.94	6,798,732	27.65	4,384,866	13.92
No Fumador	29,757,267	53.06	7,398,016	30.09	22,359,251	70.99
Áreas Urbanas	42,972,506	100.00	18,800,299	100.00	24,172,207	100.00
Fumador	12,964,180	30.17	8,519,500	45.32	4,444,680	18.39
Ex Fumador	8,912,144	20.74	5,097,632	27.11	3,814,512	15.78
No Fumador	21,096,182	49.09	5,183,167	27.57	15,913,015	65.83
Áreas Rurales	13,109,202	100.00	5,785,407	100.00	7,323,795	100.00
Fumador	2,176,663	16.60	1,869,458	32.31	307,205	4.19
Ex Fumador	2,271,454	17.33	1,701,100	29.40	570,354	7.79
No Fumador	8,661,085	66.07	2,214,849	38.28	6,446,236	88.02

Cuadro 2.2.9

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	15,140,843	100.00	11,183,598	100.00	29,757,267	100.00
De 18 a 29 años	20,178,586	35.98	5,919,830	39.10	3,187,272	28.50	11,071,484	37.21
De 30 a 39 años	14,038,071	25.03	3,683,776	24.33	2,815,734	25.18	7,538,561	25.33
De 40 a 49 años	11,552,872	20.60	3,300,915	21.80	2,558,723	22.88	5,693,234	19.13
De 50 a 65 años	10,312,179	18.39	2,236,322	14.77	2,621,869	23.44	5,453,988	18.33
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	12,964,180	100.00	8,912,144	100.00	21,096,182	100.00
De 18 a 29 años	16,021,998	37.28	5,293,142	40.83	2,685,831	30.14	8,043,025	38.13
De 30 a 39 años	10,792,042	25.11	3,258,923	25.14	2,331,339	26.16	5,201,780	24.66
De 40 a 49 años	8,854,363	20.60	2,764,706	21.33	2,030,845	22.79	4,058,812	19.24
De 50 a 65 años	7,304,103	17.00	1,647,409	12.71	1,864,129	20.92	3,792,565	17.98
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	2,176,663	100.00	2,271,454	100.00	8,661,085	100.00
De 18 a 29 años	4,156,588	31.71	626,688	28.79	501,441	22.08	3,028,459	34.97
De 30 a 39 años	3,246,029	24.76	424,853	19.52	484,395	21.33	2,336,781	26.98
De 40 a 49 años	2,698,509	20.58	536,209	24.63	527,878	23.24	1,634,422	18.87
De 50 a 65 años	3,008,076	22.95	588,913	27.06	757,740	33.36	1,661,423	19.18

Cuadro 2.2.10

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO

TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	15,140,843	100.00	11,183,598	100.00	29,757,267	100.00
Sin Instrucción	5,048,672	9.00	844,630	5.58	767,549	6.86	3,436,493	11.55
Primaria	21,776,191	38.83	4,432,449	29.27	4,344,874	38.85	12,998,868	43.68
Secundaria	13,575,050	24.21	4,312,787	28.48	2,684,954	24.01	6,577,309	22.10
Preparatoria	7,253,394	12.93	2,669,663	17.63	1,473,863	13.18	3,109,868	10.45
Universidad	7,906,927	14.10	2,733,155	18.05	1,698,376	15.19	3,475,396	11.68
Posgrado	521,474	0.93	148,159	0.98	213,982	1.91	159,333	0.54
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	12,964,180	100.00	8,912,144	100.00	21,096,182	100.00
Sin Instrucción	2,272,271	5.29	478,851	3.69	361,960	4.06	1,431,460	6.79
Primaria	14,458,182	33.65	3,283,420	25.33	3,015,450	33.84	8,159,312	38.68
Secundaria	11,657,442	27.13	3,915,020	30.20	2,417,111	27.12	5,325,311	25.24
Preparatoria	6,573,211	15.30	2,517,500	19.42	1,307,125	14.67	2,748,586	13.03
Universidad	7,491,297	17.43	2,621,230	20.22	1,596,516	17.91	3,273,551	15.52
Posgrado	520,103	1.21	148,159	1.14	213,982	2.40	157,962	0.75
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	2,176,663	100.00	2,271,454	100.00	8,661,085	100.00
Sin Instrucción	2,776,401	21.18	365,779	16.80	405,589	17.86	2,005,033	23.15
Primaria	7,318,009	55.82	1,149,029	52.79	1,329,424	58.53	4,839,556	55.88
Secundaria	1,917,608	14.63	397,767	18.27	267,843	11.79	1,251,998	14.46
Preparatoria	680,183	5.19	152,163	6.99	166,738	7.34	361,282	4.17
Universidad	415,630	3.17	111,925	5.14	101,860	4.48	201,845	2.33
Posgrado	1,371	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371	0.02

Cuadro 2.2.11 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		De 30 a 39 años	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	8,190,964	100.00	2,862,448	100.00	2,090,548	100.00
Sin Instrucción	486,507	5.94	14,199	0.50	67,954	3.25
Primaria	2,303,660	28.12	461,823	16.13	512,232	24.50
Secundaria	2,317,326	28.29	1,006,544	35.16	652,141	31.19
Preparatoria	1,416,592	17.29	606,910	21.20	462,460	22.12
Universidad	1,556,169	19.00	772,260	26.98	351,360	16.81
Posgrado	110,710	1.35	712	0.02	44,401	2.12

Cuadro 2.2.11 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	1,893,286	100.00	1,344,682	100.00
SIN INSTRUCCIÓN	141,867	7.49	262,487	19.52
PRIMARIA	719,687	38.01	609,918	45.36
SECUNDARIA	444,449	23.48	214,192	15.93
PREPARATORIA	257,090	13.58	90,132	6.70
UNIVERSIDAD	275,972	14.58	156,577	11.64
POSGRADO	54,221	2.86	11,376	0.85

^a Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

Cuadro 2.2.12

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO DIARIO DE CIGARRILLOS

TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE CIGARRILLOS FUMADOS DIARIAMENTE	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	8,190,964	100.00	5,816,528	100.00	2,374,436	100.00
De 1 a 5	5,115,476	62.45	3,652,101	62.79	1,463,375	61.63
De 6 a 10	1,638,290	20.00	1,123,414	19.31	514,876	21.68
De 11 a 20	889,116	10.85	692,554	11.91	196,562	8.28
Más de 20	548,082	6.69	348,459	5.99	199,623	8.41
ÁREAS URBANAS	7,081,681	100.00	4,870,991	100.00	2,210,690	100.00
De 1 a 5	4,531,631	63.99	3,133,454	64.33	1,398,177	63.25
De 6 a 10	1,344,010	18.98	870,267	17.87	473,743	21.43
De 11 a 20	758,775	10.71	577,926	11.86	180,849	8.18
Más de 20	447,265	6.32	289,344	5.94	157,921	7.14
ÁREAS RURALES	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
De 1 a 5	583,845	52.63	518,647	54.85	65,198	39.82
De 6 a 10	294,280	26.53	253,147	26.77	41,133	25.12
De 11 a 20	130,341	11.75	114,628	12.12	15,713	9.60
Más de 20	100,817	9.09	59,115	6.25	41,702	25.47

Cuadro 2.2.13 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL						
Tiempo transcurrido después de levantarse que fuma el primer cigarrillo	8,190,964	100.00	5,816,528	100.00	2,374,436	100.00
Primeros 5 minutos	479,472	5.85	330,814	5.69	148,658	6.26
Entre 6 y 30 minutos	490,306	5.99	355,725	6.12	134,581	5.67
Entre 31 y 60 minutos	721,093	8.80	517,266	8.89	203,827	8.58
Más de 1 hora	6,500,093	79.36	4,612,723	79.30	1,887,370	79.49
Fuma más en las primeras horas del día que durante el resto ^a :	8,182,045	100.00	5,812,730	100.00	2,369,315	100.00
SÍ	1,353,025	16.54	929,660	15.99	423,365	17.87
NO	6,829,020	83.46	4,883,070	84.01	1,945,950	82.13
Sería difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido ^a :	8,182,045	100.00	5,812,730	100.00	2,369,315	100.00
SÍ	750,995	9.18	482,186	8.30	268,809	11.35
NO	7,431,050	90.82	5,330,544	91.70	2,100,506	88.65

Cuadro 2.2.13 (2a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL						
De los cigarrillos que fuma durante el día, el más difícil de dejar es ^a :	8,182,045	100.00	5,812,730	100.00	2,369,315	100.00
El primero de la mañana	1,028,017	12.56	693,458	11.93	334,559	14.12
El de después de comer	2,116,413	25.87	1,587,706	27.31	528,707	22.31
Cuando está bajo tensión	2,098,295	25.65	1,463,696	25.18	634,599	26.78
El del baño	207,044	2.53	124,607	2.14	82,437	3.48
El de antes de dormir	1,309,660	16.01	969,084	16.67	340,576	14.37
Algún otro	626,349	7.66	403,944	6.95	222,405	9.39
Todos	516,160	6.31	329,532	5.67	186,628	7.88
No sabe/no responde	280,107	3.42	240,703	4.14	39,404	1.66
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ^a :	8,182,045	100.00	5,812,730	100.00	2,369,315	100.00
Sí	797,402	9.75	472,871	8.14	324,531	13.70
No	7,379,776	90.19	5,334,992	91.78	2,044,784	86.30
No sabe/no responde	4,867	0.06	4,867	0.08	0.00	0.00
Ha intentado dejar de fumar alguna vez ^a :	8,182,045	100.00	5,812,730	100.00	2,369,315	100.00
Sí	4,299,415	52.55	2,939,728	50.57	1,359,687	57.39
No	3,877,763	47.39	2,868,135	49.34	1,009,628	42.61
No sabe/no responde	4,867	0.06	4,867	0.08	0.00	0.00

Cuadro 2.2.13 (3a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
ÁREAS URBANAS						
Tiempo transcurrido después de levantarse que fuma el primer cigarrillo	7,081,681	100.00	4,870,991	100.00	2,210,690	100.00
Primeros 5 minutos	419,617	5.93	279,148	5.73	140,469	6.35
Entre 6 y 30 minutos	423,915	5.99	304,443	6.25	119,472	5.40
Entre 31 y 60 minutos	611,773	8.64	412,603	8.47	199,170	9.01
Más de 1 hora	5,626,376	79.45	3,874,797	79.55	1,751,579	79.23
Fuma más en las primeras horas del día que durante el resto ^a :	7,072,762	100.00	4,867,193	100.00	2,205,569	100.00
Sí	1,096,118	15.50	709,715	14.58	386,403	17.52
No	5,976,644	84.50	4,157,478	85.42	1,819,166	82.48
Sería difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido ^a :	7,072,762	100.00	4,867,193	100.00	2,205,569	100.00
Sí	584,050	8.26	357,132	7.34	226,918	10.29
No	6,488,712	91.74	4,510,061	92.66	1,978,651	89.71
De los cigarrillos que fuma durante el día, el más difícil de dejar es ^a :	7,072,762	100.00	4,867,193	100.00	2,205,569	100.00
El primero de la mañana	884,599	12.51	579,264	11.90	305,335	13.84
El de después de comer	1,769,361	25.02	1,250,772	25.70	518,589	23.51
Cuando está bajo tensión	2,010,804	28.43	1,388,858	28.54	621,946	28.20
El del baño	176,951	2.50	100,685	2.07	76,266	3.46
El de antes de dormir	1,129,735	15.97	864,231	17.76	265,504	12.04
Algún otro	501,499	7.09	279,094	5.73	222,405	10.08
Todos	394,194	5.57	235,060	4.83	159,134	7.22
No sabe/no responde	205,619	2.91	169,229	3.48	36,390	1.65

Cuadro 2.2.13 (4a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
ÁREAS URBANAS	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ^a :	7,072,762	100.00	4,867,193	100.00	2,205,569	100.00
Sí	730,836	10.33	421,167	8.65	309,669	14.04
No	6,337,059	89.60	4,441,159	91.25	1,895,900	85.96
No sabe/no responde	4,867	0.07	4,867	0.10	0.00	0.00
Ha intentado dejar de fumar alguna vez ^a :	7,072,762	100.00	4,867,193	100.00	2,205,569	100.00
Sí	3,600,956	50.91	2,328,317	47.84	1,272,639	57.70
No	3,466,939	49.02	2,534,009	52.06	932,930	42.30
No sabe/no responde	4,867	0.07	4,867	0.10	0.00	0.00

Cuadro 2.2.13 (5a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
ÁREAS RURALES						
Tiempo transcurrido después de levantarse que fuma el primer cigarrillo	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
Primeros 5 minutos	59,855	5.40	51,666	5.46	8,189	5.00
Entre 6 y 30 minutos	66,391	5.99	51,282	5.42	15,109	9.23
Entre 31 y 60 minutos	109,320	9.86	104,663	11.07	4,657	2.84
Más de 1 hora	873,717	78.76	737,926	78.04	135,791	82.93
Fuma más en las primeras horas del día que durante el resto ^a :	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
Sí	256,907	23.16	219,945	23.26	36,962	22.57
No	852,376	76.84	725,592	76.74	126,784	77.43
Sería difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido ^a :	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
Sí	166,945	15.05	125,054	13.23	41,891	25.58
No	942,338	84.95	820,483	86.77	121,855	74.42
De los cigarrillos que fuma durante el día, el más difícil de dejar es ^b :	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
El primero de la mañana	143,418	12.93	114,194	12.08	29,224	17.85
El de después de comer	347,052	31.29	336,934	35.63	10,118	6.18
Cuando está bajo tensión	87,491	7.89	74,838	7.91	12,653	7.73
El del baño	30,093	2.71	23,922	2.53	6,171	3.77
El de antes de dormir	179,925	16.22	104,853	11.09	75,072	45.85
Algún otro	124,850	11.26	124,850	13.20	0	0.00
Todos	121,966	11.00	94,472	9.99	27,494	16.79
No sabe/no responde	74,488	6.71	71,474	7.56	3,014	1.84

Cuadro 2.2.13 (6a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ^a :	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
Sí	66,566	6.00	51,704	5.47	14,862	9.08
No	1,042,717	94.00	893,833	94.53	148,884	90.92
No sabe/no responde	4,867	0.07	4,867	0.10	0.00	0.00
Ha intentado dejar de fumar alguna vez ^a :	1,109,283	100.00	945,537	100.00	163,746	100.00
Sí	698,459	62.96	611,411	64.66	87,048	53.16
No	410,824	37.04	334,126	35.34	76,698	46.84
No sabe/no responde	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Cuadro 2.2.14

FUMADORES PASIVOS DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	12,624,841	100.00	2,958,262	100.00	9,666,579	100.00
ÁREAS URBANAS	9,961,304	78.90	2,293,446	77.53	7,667,858	79.32
ÁREAS RURALES	2,663,537	21.10	664,816	22.47	1,998,721	20.68

Cuadro 2.2.15 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 a 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a						
Tiempo transcurrido después de levantarse que fuma el primer cigarrillo	8,190,964	100.00	2,862,448	100.00	2,090,548	100.00
Primeros 5 minutos	479,472	5.85	67,704	2.37	140,238	6.71
Entre 6 y 30 minutos	490,306	5.99	61,032	2.13	84,718	4.05
Entre 31 y 60 minutos	721,093	8.80	171,120	5.98	254,895	12.19
Más de 1 hora	6,500,093	79.36	2,562,592	89.52	1,610,697	77.05
Fuma más en las primeras horas del día que durante el resto ^b :	8,182,045	100.00	2,857,327	100.00	2,090,067	100.00
Sí	1,353,025	16.54	293,190	10.26	308,713	14.77
No	6,829,020	83.46	2,564,137	89.74	1,781,354	85.23
Sería difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido ^b :	8,182,045	100.00	2,857,327	100.00	2,090,067	100.00
Sí	750,995	9.18	183,841	6.43	190,153	9.10
No	7,431,050	90.82	2,673,486	93.57	1,899,914	90.90

Cuadro 2.2.15 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a				
Tiempo transcurrido después de levantarse que fuma el primer cigarrillo	1,893,286	100.00	1,344,682	100.00
Primeros 5 minutos	113,991	6.02	157,539	11.72
Entre 6 y 30 minutos	206,991	10.93	137,565	10.23
Entre 31 y 60 minutos	136,558	7.21	158,520	11.79
Más de 1 hora	1,435,746	75.83	891,058	66.27
Fuma más en las Primeras horas Del día que Durante el resto ^b :	1,893,286	100.00	1,341,365	100.00
Sí	392,404	20.73	358,718	26.74
No	1,500,882	79.27	982,647	73.26
Sería difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido ^b :	1,893,286	100.00	1,341,365	100.00
Sí	165,520	8.74	211,481	15.77
No	1,727,766	91.26	1,129,884	84.23

^a Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

^b Excluye a las personas que fumaron durante los 12 meses previos, pero que mencionaron ya no fumar al momento de la entrevista.

Cuadro 2.2.16 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE ^a POR SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 a 39 AÑOS	
TOTAL ^b			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	8,182,045	100.00	2,857,327	100.00	2,090,067	100.00
Sí	797,402	9.75	297,833	10.42	164,764	7.88
No	7,379,776	90.19	2,554,627	89.41	1,925,303	92.12
No sabe/no responde	4,867	0.06	4,867	0.17	0.00	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	8,182,045	100.00	2,857,327	100.00	2,090,067	100.00
Sí	4,299,415	52.55	1,509,650	52.83	1,061,966	50.81
No	3,877,763	47.39	1,342,810	47.00	1,028,101	49.19
No sabe/no responde	4,867	0.06	4,867	0.17	0.00	0.00
HOMBRES						
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	5,812,730	100.00	1,983,308	100.00	1,550,788	100.00
Sí	472,871	8.14	149,406	7.53	67,577	4.36
No	5,334,992	91.78	1,829,035	92.22	1,483,211	95.64
No sabe/no responde	4,867	0.08	4,867	0.25	0.00	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	5,812,730	100.00	1,983,308	100.00	1,550,788	100.00
Sí	2,939,728	50.57	978,880	49.36	685,702	44.22
No	2,868,135	49.34	999,561	50.40	865,086	55.78
No sabe/no responde	4,867	0.08	4,867	0.25	0.00	0.00
MUJERES						
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	2,369,315	100.00	874,019	100.00	539,279	100.00
Sí	324,531	13.70	148,427	16.98	97,187	18.02
No	2,044,784	86.30	725,592	83.02	442,092	81.98
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	2,369,315	100.00	874,019	100.00	539,279	100.00
Sí	1,359,687	57.39	530,770	60.73	376,264	69.77
No	1,009,628	42.61	343,249	39.27	163,015	30.23
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuadro 2.2.16 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE ^a POR SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
TOTAL ^b	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	1,893,286	100.00	1,341,365	100.00
Sí	194,154	10.25	140,651	10.49
No	1,699,132	89.75	1,200,714	89.51
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	1,893,286	100.00	1,341,365	100.00
Sí	962,955	50.86	764,844	57.02
No	930,331	49.14	576,521	42.98
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00
HOMBRES				
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	1,372,140	100.00	906,494	100.00
Sí	150,778	10.99	105,110	11.60
No	1,221,362	89.01	801,384	88.40
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	1,372,140	100.00	906,494	100.00
Sí	713,815	52.02	561,331	61.92
No	658,325	47.98	345,163	38.08
No sabe/no responde	0.00	0.00	0.00	0.00
MUJERES				
Fuma cuando se enferma y tiene que permanecer en cama:	521,146	100.00	434,871	100.00
Sí	43,376	8.32	35,541	8.17
No	477,770	91.68	399,330	91.83
No sabe/no responde	0	0.00	0	0.00
¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?	521,146	100.00	434,871	100.00
Sí	249,140	47.81	203,513	46.80
No	272,006	52.19	231,358	53.20
No sabe/no responde	0	0.00	0	0.00

^a Excluye a las personas que fumaron durante los 12 meses previos, pero que mencionaron ya no fumar al momento de la entrevista.

^b Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

ANEXO 3

3.1 INDICADORES DE ALCOHOL

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (1a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	31,393,657	38,373,410
Alguna vez ha consumido alcohol	45,254,439	24,685,159	20,569,280
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	6,708,498	17,804,130
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	24,512,628	6,708,498	17,804,130
Porque no se acostumbraba en casa	2,833,360	634,323	2,199,037
Por religión	1,383,773	437,700	946,073
Por miedo a tener un problema	1,387,367	509,569	877,798
Porque no le llama la atención	17,637,493	4,704,821	12,932,672
Otro	1,270,635	422,085	848,550
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	45,254,439	24,685,159	20,569,280
Ex bebedor	12,938,679	5,507,246	7,431,433
Bebedor actual	32,315,760	19,177,913	13,137,847
4. Frecuencia de consumo:	32,315,760	19,177,913	13,137,847
Diario o casi diario	947,099	774,523	172,576
1 a 4 veces por semana	4,914,166	4,139,868	774,298
1 a 3 veces por mes	8,380,994	6,123,557	2,257,437
3 a 11 veces al año	6,715,576	3,814,532	2,901,044
1 a 2 veces al año	11,357,925	4,325,433	7,032,492
5. Consumo por tipo de bebida^o:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	2,456,257	2,048,043	408,214
Cerveza	22,735,729	15,276,487	7,459,242
Vino de mesa	7,365,433	3,411,611	3,953,822
Destilados	14,743,214	8,539,999	6,203,215
Coolers	3,863,053	2,111,962	1,751,091
6. Mayor número de copas:	32,315,760	19,177,913	13,137,847
24 y más copas en un solo día	294,898	281,117	13,781
12 a 23 copas en un solo día	1,546,515	1,517,884	28,631
8 a 11 copas en un solo día	3,770,512	3,304,603	465,909
5 a 7 copas en un solo día	5,573,720	4,633,837	939,883
3 a 4 copas en un solo día	9,092,096	5,224,721	3,867,375
1 a 2 copas en un solo día	12,032,346	4,215,751	7,816,595
No sabe	5,673	0	5,673

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (2a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	1,448,842	63,862
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	551,544	10,554
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2,343,719	2,141,429	202,290
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	3,404,351	2,793,179	611,172
Abstinencia	5,661,446	4,665,837	995,609
Incapacidad de control	7,395,283	6,214,104	1,181,179
Deseo persistente	1,645,046	1,477,356	167,690
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951,720	906,925	44,795
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1,134,180	1,069,146	65,034
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1,113,809	1,018,740	95,069
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	2,841,303	2,595,300	246,003
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	24,335,281	14,592,965	9,742,316
Casa de otras personas	18,784,077	12,008,724	6,775,353
Restaurantes	7,652,294	4,939,422	2,712,872
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8,082,228	6,097,319	1,984,909
Lugares sin licencia para expender alcohol	1,973,109	1,763,555	209,554
En la calle	4,222,555	3,933,706	288,849
En el trabajo	1,670,607	1,470,106	200,501

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (3a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	78.63	53.60
Nunca ha consumido alcohol	35.13	21.37	46.40
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	35.13	21.37	46.40
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	2.02	5.73
Por religión	1.98	1.39	2.47
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	2.29
Porque no le llama la atención	25.28	14.99	33.70
Otro	1.82	1.34	2.21
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	64.87	78.63	53.60
Ex bebedor	18.55	17.54	19.37
Bebedor actual	46.32	61.09	34.24
4. Frecuencia de consumo:	46.32	61.09	34.24
Diario o casi diario	1.36	2.47	0.45
1 a 4 veces por semana	7.04	13.19	2.02
1 a 3 veces por mes	12.01	19.51	5.88
3 a 11 veces al año	9.63	12.15	7.56
1 a 2 veces al año	16.28	13.78	18.33
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	3.52	6.52	1.06
Cerveza	32.59	48.66	19.44
Vino de mesa	10.56	10.87	10.30
Destilados	21.13	27.20	16.17
Coolers	5.54	6.73	4.56
6. Mayor número de copas:	46.32	61.09	34.24
24 y más copas en un solo día	0.42	0.90	0.04
12 a 23 copas en un solo día	2.22	4.84	0.07
8 a 11 copas en un solo día	5.40	10.53	1.21
5 a 7 copas en un solo día	7.99	14.76	2.45
3 a 4 copas en un solo día	13.03	16.64	10.08
1 a 2 copas en un solo día	17.25	13.43	20.37
No sabe	0.01	0.00	0.01

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (4a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	4.62	0.17
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	1.76	0.03
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	6.82	0.53
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	4.88	8.90	1.59
Abstinencia	8.11	14.86	2.59
Incapacidad de control	10.60	19.79	3.08
Deseo persistente	2.36	4.71	0.44
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	2.89	0.12
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	3.41	0.17
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	3.25	0.25
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	4.07	8.27	0.64
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	34.88	46.48	25.39
Casa de otras personas	26.92	38.25	17.66
Restaurantes	10.97	15.73	7.07
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	19.42	5.17
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	5.62	0.55
En la calle	6.05	12.53	0.75
En el trabajo	2.39	4.68	0.52

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (5a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	52,887,532	16,879,535
Alguna vez ha consumido alcohol	45,254,439	36,729,470	8,524,969
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	16,158,062	8,354,566
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	24,512,628	16,158,062	8,354,566
Porque no se acostumbraba en casa	2,833,360	1,718,408	1,114,952
Por religión	1,383,773	810,842	572,931
Por miedo a tener un problema	1,387,367	854,152	533,215
Porque no le llama la atención	17,637,493	11,839,812	5,797,681
Otro	1,270,635	934,848	335,787
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	45,254,439	36,729,470	8,524,969
Ex bebedor	12,938,679	9,854,808	3,083,871
Bebedor actual	32,315,760	26,874,662	5,441,098
4. Frecuencia de consumo:	32,315,760	26,874,662	5,441,098
Diario o casi diario	947,099	777,014	170,085
1 a 4 veces por semana	4,914,166	4,087,922	826,244
1 a 3 veces por mes	8,380,994	6,759,318	1,621,676
3 a 11 veces al año	6,715,576	5,544,632	1,170,944
1 a 2 veces al año	11,357,925	9,705,776	1,652,149
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	2,456,257	1,456,329	999,928
Cerveza	22,735,729	18,200,036	4,535,693
Vino de mesa	7,365,433	6,707,748	657,685
Destilados	14,743,214	13,175,437	1,567,777
Coolers	3,863,053	3,557,785	305,268
6. Mayor número de copas:	32,315,760	26,874,662	5,441,098
24 y más copas en un solo día	294,898	228,210	66,688
12 a 23 copas en un solo día	1,546,515	1,085,290	461,225
8 a 11 copas en un solo día	3,770,512	3,025,378	745,134
5 a 7 copas en un solo día	5,573,720	4,278,682	1,295,038
3 a 4 copas en un solo día	9,092,096	7,896,258	1,195,838
1 a 2 copas en un solo día	12,032,346	10,355,171	1,677,175
No sabe	5,673	5,673	0

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (6a. Parte)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	1,367,380	145,324
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	459,737	102,361
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2,343,719	1,798,295	545,424
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	3,404,351	2,650,345	754,006
Abstinencia	5,661,446	4,418,414	1,243,032
Incapacidad de control	7,395,283	5,754,843	1,640,440
Deseo persistente	1,645,046	1,219,149	425,897
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951,720	737,238	214,482
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1,134,180	875,314	258,866
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1,113,809	871,321	242,488
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	2,841,303	2,133,499	707,804
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	24,335,281	20,429,092	3,906,189
Casa de otras personas	18,784,077	15,650,217	3,133,860
Restaurantes	7,652,294	6,922,138	730,156
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8,082,228	6,997,182	1,085,046
Lugares sin licencia para expender alcohol	1,973,109	1,435,003	538,106
En la calle	4,222,555	2,871,398	1,351,157
En el trabajo	1,670,607	1,324,274	346,333

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (7a. Parte)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	69.45	50.50
Nunca ha consumido alcohol	35.13	30.55	49.50
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	35.13	30.55	49.50
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	3.25	6.61
Por religión	1.98	1.53	3.39
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	3.16
Porque no le llama la atención	25.28	22.39	34.35
Otro	1.82	1.77	1.99
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	64.87	69.45	50.50
Ex bebedor	18.55	18.63	18.27
Bebedor actual	46.32	50.81	32.23
4. Frecuencia de consumo:	46.32	50.81	32.23
Diario o casi diario	1.36	1.47	1.01
1 a 4 veces por semana	7.04	7.73	4.89
1 a 3 veces por mes	12.01	12.78	9.61
3 a 11 veces al año	9.63	10.48	6.94
1 a 2 veces al año	16.28	18.35	9.79
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	3.52	2.75	5.92
Cerveza	32.59	34.41	26.87
Vino de mesa	10.56	12.68	3.90
Destilados	21.13	24.91	9.29
Coolers	5.54	6.73	1.81
6. Mayor número de copas:	46.32	50.81	32.23
24 y más copas en un solo día	0.42	0.43	0.40
12 a 23 copas en un solo día	2.22	2.05	2.73
8 a 11 copas en un solo día	5.40	5.72	4.41
5 a 7 copas en un solo día	7.99	8.09	7.67
3 a 4 copas en un solo día	13.03	14.93	7.08
1 a 2 copas en un solo día	17.25	19.58	9.94
No sabe	0.01	0.01	0.00

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (8a. Parte y última)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	2.59	0.86
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	0.87	0.61
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	3.40	3.23
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	4.88	5.01	4.47
Abstinencia	8.11	8.35	7.36
Incapacidad de control	10.60	10.88	9.72
Deseo persistente	2.36	2.31	2.52
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	1.39	1.27
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	1.66	0.53
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	1.65	1.44
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	4.07	4.03	4.19
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	34.88	38.63	23.14
Casa de otras personas	26.92	29.59	18.57
Restaurantes	10.97	13.09	4.33
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	13.23	6.43
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	2.71	3.19
En la calle	6.05	5.43	8.00
En el trabajo	2.39	2.50	2.05

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las variables mencionadas.

^b Población que presenta 3 o más síntomas de dependencia.

3.2 TABULADOS DE ALCOHOL

Índice de tabulados

- 3.2.1 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.2 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.3 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.4 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.5 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.6 Población masculina de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.7 Población femenina de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.8 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.9 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.10 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.11 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.12 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad

- 3.2.13 Población masculina de 18 a 65 años de edad por frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.14 Población femenina de 18 a 65 años de edad por frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.15 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según sexo
- 3.2.16 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según sexo
- 3.2.17 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.18 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.19 Población masculina de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.20 Población femenina de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.21 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.22 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.23 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad

- 3.2.24 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.25 Población masculina de 18 a 65 años de edad por patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.26 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y síntomas de dependencia
- 3.2.27 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y síntomas de dependencia
- 3.2.28 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol
- 3.2.29 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol
- 3.2.30 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y problemas derivados del consumo de alcohol, según dependencia
- 3.2.31 Población masculina de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol, según dependencia
- 3.2.32 Población de 12 a 65 años de edad que nunca ha consumido alcohol por tipo de localidad y razones por las que nunca lo ha consumido, según sexo
- 3.2.33 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y número máximo de copas consumidas en un solo día, según sexo
- 3.2.34 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y número máximo de copas consumidas en un solo día, según sexo

Cuadro 3.2.1
POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y
CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	31,393,657	100.00	38,373,410	100.00
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	35.14	6,708,498	21.37	17,804,130	46.40
Ex bebedor	12,938,679	18.55	5,507,246	17.54	7,431,433	19.37
Bebedor actual	32,315,760	46.32	19,177,913	61.09	13,137,847	34.24
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	23,715,545	100.00	29,171,987	100.00
Nunca ha consumido alcohol	16,158,062	30.55	4,502,490	18.99	11,655,572	39.95
Ex bebedor	9,854,808	18.63	3,905,430	16.47	5,949,378	20.39
Bebedor actual	26,874,662	50.81	15,307,625	64.55	11,567,037	39.65
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	7,678,112	100.00	9,201,423	100.00
Nunca ha consumido alcohol	8,354,566	49.50	2,206,008	28.73	6,148,558	66.82
Ex bebedor	3,083,871	18.27	1,601,816	20.86	1,482,055	16.11
Bebedor actual	5,441,098	32.23	3,870,288	50.41	1,570,810	17.07

Cuadro 3.2.2

POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	13,685,359	100.00	6,807,951	100.00	6,877,408	100.00
Nunca ha consumido alcohol	8,813,575	64.40	3,975,142	58.39	4,838,433	70.35
Ex bebedor	1,349,357	9.86	748,516	10.99	600,841	8.74
Bebedor actual	3,522,427	25.74	2,084,293	30.62	1,438,134	20.91
ÁREAS URBANAS	9,915,026	100.00	4,915,246	100.00	4,999,780	100.00
Nunca ha consumido alcohol	5,973,866	60.25	2,671,039	54.34	3,302,827	66.06
Ex bebedor	961,930	9.70	517,689	10.53	444,241	8.89
Bebedor actual	2,979,230	30.05	1,726,518	35.13	1,252,712	25.06
ÁREAS RURALES	3,770,333	100.00	1,892,705	100.00	1,877,628	100.00
Nunca ha consumido alcohol	2,839,709	75.32	1,304,103	68.90	1,535,606	81.78
Ex bebedor	387,427	10.28	230,827	12.20	156,600	8.34
Bebedor actual	543,197	14.41	357,775	18.90	185,422	9.88

Cuadro 3.2.3
POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y
CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	24,585,706	100.00	31,496,002	100.00
Nunca ha consumido alcohol	15,699,053	27.99	2,733,356	11.12	12,965,697	41.17
Ex bebedor	11,589,322	20.67	4,758,730	19.36	6,830,592	21.69
Bebedor actual	28,793,333	51.34	17,093,620	69.53	11,699,713	37.15
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	18,800,299	100.00	24,172,207	100.00
Nunca ha consumido alcohol	10,184,196	23.70	1,831,451	9.74	8,352,745	34.56
Ex bebedor	8,892,878	20.69	3,387,741	18.02	5,505,137	22.77
Bebedor actual	23,895,432	55.61	13,581,107	72.24	10,314,325	42.67
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	5,785,407	100.00	7,323,795	100.00
Nunca ha consumido alcohol	5,514,857	42.07	901,905	15.59	4,612,952	62.99
Ex bebedor	2,696,444	20.57	1,370,989	23.70	1,325,455	18.10
Bebedor actual	4,897,901	37.36	3,512,513	60.71	1,385,388	18.92

Cuadro 3.2.4 (1a. Parte)
POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y
CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	13,685,359	100.00	20,178,586	100.00
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	35.14	8,813,575	64.40	5,792,467	28.71
Ex bebedor	12,938,679	18.55	1,349,357	9.86	3,784,469	18.75
Bebedor actual	32,315,760	46.32	3,522,427	25.74	10,601,650	52.54
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	9,915,026	100.00	16,021,998	100.00
Nunca ha consumido alcohol	16,158,062	30.55	5,973,866	60.25	3,744,558	23.37
Ex bebedor	9,854,808	18.63	961,930	9.70	3,150,238	19.66
Bebedor actual	26,874,662	50.81	2,979,230	30.05	9,127,202	56.97
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	3,770,333	100.00	4,156,588	100.00
Nunca ha consumido alcohol	8,354,566	49.50	2,839,709	75.32	2,047,909	49.27
Ex bebedor	3,083,871	18.27	387,427	10.28	634,231	15.26
Bebedor actual	5,441,098	32.23	543,197	14.41	1,474,448	35.47

Cuadro 3.2.4 (2a. parte y última)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	14,038,071	100.00	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Nunca ha consumido alcohol	3,989,347	28.42	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
Ex bebedor	2,650,256	18.88	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Bebedor actual	7,398,468	52.70	6,432,704	55.68	4,360,511	42.29
ÁREAS URBANAS	10,792,042	100.00	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Nunca ha consumido alcohol	2,628,064	24.35	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
Ex bebedor	1,967,436	18.23	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Bebedor actual	6,196,542	57.42	5,232,337	59.09	3,339,351	45.72
ÁREAS RURALES	3,246,029	100.00	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Nunca ha consumido alcohol	1,361,283	41.94	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02
Ex bebedor	682,820	21.04	445,966	16.53	933,427	31.03
Bebedor actual	1,201,926	37.03	1,200,367	44.48	1,021,160	33.95

Cuadro 3.2.5 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	20,178,586	100.00	14,038,071	100.00
Nunca ha consumido alcohol	15,699,053	27.99	5,792,467	28.71	3,989,347	28.42
Ex bebedor	11,589,322	20.67	3,784,469	18.75	2,650,256	18.88
Bebedor actual	28,793,333	51.34	10,601,650	52.54	7,398,468	52.70
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	16,021,998	100.00	10,792,042	100.00
Nunca ha consumido alcohol	10,184,196	23.70	3,744,558	23.37	2,628,064	24.35
Ex bebedor	8,892,878	20.69	3,150,238	19.66	1,967,436	18.23
Bebedor actual	23,895,432	55.61	9,127,202	56.97	6,196,542	57.42
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	4,156,588	100.00	3,246,029	100.00
Nunca ha consumido alcohol	5,514,857	42.07	2,047,909	49.27	1,361,283	41.94
Ex bebedor	2,696,444	20.57	634,231	15.26	682,820	21.04
Bebedor actual	4,897,901	37.36	1,474,448	35.47	1,201,926	37.03

Cuadro 3.2.5 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Nunca ha consumido alcohol	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
Ex bebedor	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Bebedor actual	6,432,704	55.68	4,360,511	42.29
ÁREAS URBANAS	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Nunca ha consumido alcohol	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
Ex bebedor	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Bebedor actual	5,232,337	59.09	3,339,351	45.72
ÁREAS RURALES	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Nunca ha consumido alcohol	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02
Ex bebedor	445,966	16.53	933,427	31.03
Bebedor actual	1,200,367	44.48	1,021,160	33.95

Cuadro 3.2.6 (1a. Parte)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	24,585,706	100.00	8,721,300	100.00	6,135,624	100.00
Nunca ha consumido alcohol	2,733,356	11.12	1,288,915	14.78	640,366	10.44
Ex bebedor	4,758,730	19.36	1,453,199	16.66	1,009,251	16.45
Bebedor actual	17,093,620	69.53	5,979,186	68.56	4,486,007	73.11
ÁREAS URBANAS	18,800,299	100.00	6,980,412	100.00	4,910,484	100.00
Nunca ha consumido alcohol	1,831,451	9.74	865,124	12.39	464,338	9.46
Ex bebedor	3,387,741	18.02	1,176,177	16.85	688,203	14.02
Bebedor actual	13,581,107	72.24	4,939,111	70.76	3,757,943	76.53
ÁREAS RURALES	5,785,407	100.00	1,740,888	100.00	1,225,140	100.00
Nunca ha consumido alcohol	901,905	15.59	423,791	24.34	176,028	14.37
Ex bebedor	1,370,989	23.70	277,022	15.91	321,048	26.21
Bebedor actual	3,512,513	60.71	1,040,075	59.74	728,064	59.43

Cuadro 3.2.6 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	5,004,244	100.00	4,724,538	100.00
Nunca ha consumido alcohol	331,902	6.63	472,173	9.99
Ex bebedor	817,658	16.34	1,478,622	31.30
Bebedor actual	3,854,684	77.03	2,773,743	58.71
ÁREAS URBANAS	3,847,420	100.00	3,061,983	100.00
Nunca ha consumido alcohol	248,328	6.45	253,661	8.28
Ex bebedor	613,847	15.95	909,514	29.70
Bebedor actual	2,985,245	77.59	1,898,808	62.01
ÁREAS RURALES	1,156,824	100.00	1,662,555	100.00
Nunca ha consumido alcohol	83,574	7.22	218,512	13.14
Ex bebedor	203,811	17.62	569,108	34.23
Bebedor actual	869,439	75.16	874,935	52.63

Cuadro 3.2.7 (1a. Parte)

POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	31,496,002	100.00	11,457,286	100.00	7,902,447	100.00
Nunca ha consumido alcohol	12,965,697	41.17	4,503,552	39.31	3,348,981	42.38
Ex bebedor	6,830,592	21.69	2,331,270	20.35	1,641,005	20.77
Bebedor actual	11,699,713	37.15	4,622,464	40.35	2,912,461	36.86
ÁREAS URBANAS	24,172,207	100.00	9,041,586	100.00	5,881,558	100.00
Nunca ha consumido alcohol	8,352,745	34.56	2,879,434	31.85	2,163,726	36.79
Ex bebedor	5,505,137	22.77	1,974,061	21.83	1,279,233	21.75
Bebedor actual	10,314,325	42.67	4,188,091	46.32	2,438,599	41.46
ÁREAS RURALES	7,323,795	100.00	2,415,700	100.00	2,020,889	100.00
Nunca ha consumido alcohol	4,612,952	62.99	1,624,118	67.23	1,185,255	58.65
Ex bebedor	1,325,455	18.10	357,209	14.79	361,772	17.90
Bebedor actual	1,385,388	18.92	434,373	17.98	473,862	23.45

Cuadro 3.2.7 (2a. Parte y última)**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	6,548,628	100.00	5,587,641	100.00
Nunca ha consumido alcohol	2,676,061	40.86	2,437,103	43.62
Ex bebedor	1,294,547	19.77	1,563,770	27.99
Bebedor actual	2,578,020	39.37	1,586,768	28.40
ÁREAS URBANAS	5,006,943	100.00	4,242,120	100.00
Nunca ha consumido alcohol	1,707,459	34.10	1,602,126	37.77
Ex bebedor	1,052,392	21.02	1,199,451	28.27
Bebedor actual	2,247,092	44.88	1,440,543	33.96
ÁREAS RURALES	1,541,685	100.00	1,345,521	100.00
Nunca ha consumido alcohol	968,602	62.83	834,977	62.06
Ex bebedor	242,155	15.71	364,319	27.08
Bebedor actual	330,928	21.47	146,225	10.87

Cuadro 3.2.8

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	31,393,657	100.00	38,373,410	100.00
Diario o casi diario	947,099	1.36	774,523	2.47	172,576	0.45
De 1 a 4 veces por semana	4,914,166	7.04	4,139,868	13.19	774,298	2.02
De 1 a 3 veces por mes	8,380,994	12.01	6,123,557	19.51	2,257,437	5.88
De 3 a 11 veces al año	6,715,576	9.63	3,814,532	12.15	2,901,044	7.56
De 1 a 2 veces al año	11,357,925	16.28	4,325,433	13.78	7,032,492	18.33
Abstemio: no bebió en el último año	12,938,679	18.55	5,507,246	17.54	7,431,433	19.37
Abstemio: nunca ha bebido	24,512,628	35.14	6,708,498	21.37	17,804,130	46.40
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	23,715,545	100.00	29,171,987	100.00
Diario o casi diario	777,014	1.47	624,080	2.63	152,934	0.52
De 1 a 4 veces por semana	4,087,922	7.73	3,373,108	14.22	714,814	2.45
De 1 a 3 veces por mes	6,759,318	12.78	4,781,100	20.16	1,978,218	6.78
De 3 a 11 veces al año	5,544,632	10.48	2,901,107	12.23	2,643,525	9.06
De 1 a 2 veces al año	9,705,776	18.35	3,628,230	15.30	6,077,546	20.83
Abstemio: no bebió en el último año	9,854,808	18.63	3,905,430	16.47	5,949,378	20.39
Abstemio: nunca ha bebido	16,158,062	30.55	4,502,490	18.99	11,655,572	39.95
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	7,678,112	100.00	9,201,423	100.00
Diario o casi diario	170,085	1.01	150,443	1.96	19,642	0.21
De 1 a 4 veces por semana	826,244	4.90	766,760	9.99	59,484	0.65
De 1 a 3 veces por mes	1,621,676	9.61	1,342,457	17.48	279,219	3.03
De 3 a 11 veces al año	1,170,944	6.94	913,425	11.90	257,519	2.80
De 1 a 2 veces al año	1,652,149	9.79	697,203	9.08	954,946	10.38
Abstemio: no bebió en el último año	3,083,871	18.27	1,601,816	20.86	1,482,055	16.11
Abstemio: nunca ha bebido	8,354,566	49.50	2,206,008	28.73	6,148,558	66.82

Cuadro 3.2.9

POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	13,685,359	100.00	6,807,951	100.00	6,877,408	100.00
Diario o casi diario	34,214	0.25	24,649	0.36	9,565	0.14
De 1 a 4 veces por semana	310,399	2.27	210,069	3.09	100,330	1.46
De 1 a 3 veces por mes	844,007	6.17	669,535	9.83	174,472	2.54
De 3 a 11 veces al año	525,721	3.84	242,029	3.56	283,692	4.13
De 1 a 2 veces al año	1,808,086	13.21	938,011	13.78	870,075	12.65
Abstemio: no bebió en el último año	1,349,357	9.86	748,516	10.99	600,841	8.74
Abstemio: nunca ha bebido	8,813,575	64.40	3,975,142	58.39	4,838,433	70.35
ÁREAS URBANAS	9,915,026	100.00	4,915,246	100.00	4,999,780	100.00
Diario o casi diario	25,509	0.26	15,944	0.32	9,565	0.19
De 1 a 4 veces por semana	276,805	2.79	176,475	3.59	100,330	2.01
De 1 a 3 veces por mes	714,861	7.21	546,223	11.11	168,638	3.37
De 3 a 11 veces al año	445,661	4.49	205,815	4.19	239,846	4.80
De 1 a 2 veces al año	1,516,394	15.29	782,061	15.91	734,333	14.69
Abstemio: no bebió en el último año	961,930	9.70	517,689	10.53	444,241	8.89
Abstemio: nunca ha bebido	5,973,866	60.25	2,671,039	54.34	3,302,827	66.06
ÁREAS RURALES	3,770,333	100.00	1,892,705	100.00	1,877,628	100.00
Diario o casi diario	8,705	0.23	8,705	0.46	0	0.00
De 1 a 4 veces por semana	33,594	0.89	33,594	1.78	0	0.00
De 1 a 3 veces por mes	129,146	3.43	123,312	6.52	5,834	0.31
De 3 a 11 veces al año	80,060	2.12	36,214	1.91	43,846	2.34
De 1 a 2 veces al año	291,692	7.74	155,950	8.24	135,742	7.23
Abstemio: no bebió en el último año	387,427	10.28	230,827	12.20	156,600	8.34
Abstemio: nunca ha bebido	2,839,709	75.32	1,304,103	68.90	1,535,606	81.78

Cuadro 3.2.10

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	24,585,706	100.00	31,496,002	100.00
Diario o casi diario	912,885	1.63	749,874	3.05	163,011	0.52
De 1 a 4 veces por semana	4,603,767	8.21	3,929,799	15.98	673,968	2.14
De 1 a 3 veces por mes	7,536,987	13.44	5,454,022	22.18	2,082,965	6.61
De 3 a 11 veces al año	6,189,855	11.04	3,572,503	14.53	2,617,352	8.31
De 1 a 2 veces al año	9,549,839	17.03	3,387,422	13.78	6,162,417	19.57
Abstemio: no bebió en el último año	11,589,322	20.67	4,758,730	19.36	6,830,592	21.69
Abstemio: nunca ha bebido	15,699,053	27.99	2,733,356	11.12	12,965,697	41.17
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	18,800,299	100.00	24,172,207	100.00
Diario o casi diario	751,505	1.75	608,136	3.23	143,369	0.59
De 1 a 4 veces por semana	3,811,117	8.87	3,196,633	17.00	614,484	2.54
De 1 a 3 veces por mes	6,044,457	14.07	4,234,877	22.53	1,809,580	7.49
De 3 a 11 veces al año	5,098,971	11.87	2,695,292	14.34	2,403,679	9.94
De 1 a 2 veces al año	8,189,382	19.06	2,846,169	15.14	5,343,213	22.10
Abstemio: no bebió en el último año	8,892,878	20.69	3,387,741	18.02	5,505,137	22.77
Abstemio: nunca ha bebido	10,184,196	23.70	1,831,451	9.74	8,352,745	34.56
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	5,785,407	100.00	7,323,795	100.00
Diario o casi diario	161,380	1.23	141,738	2.45	19,642	0.27
De 1 a 4 veces por semana	792,650	6.05	733,166	12.67	59,484	0.81
De 1 a 3 veces por mes	1,492,530	11.39	1,219,145	21.07	273,385	3.73
De 3 a 11 veces al año	1,090,884	8.32	877,211	15.16	213,673	2.92
De 1 a 2 veces al año	1,360,457	10.38	541,253	9.36	819,204	11.19
Abstemio: no bebió en el último año	2,696,444	20.57	1,370,989	23.70	1,325,455	18.10
Abstemio: nunca ha bebido	5,514,857	42.07	901,905	15.59	4,612,952	62.99

Cuadro 3.2.11 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	13,685,359	100.00	2,0178,586	100.00
Diario o casi diario	947,099	1.36	34,214	0.25	223,979	1.11
De 1 a 4 veces por semana	4,914,166	7.04	310,399	2.27	1,680,706	8.33
De 1 a 3 veces por mes	8,380,994	12.01	844,007	6.17	2,845,824	14.10
De 3 a 11 veces al año	6,715,576	9.63	525,721	3.84	2,396,719	11.88
De 1 a 2 veces al año	11,357,925	16.28	1,808,086	13.21	3,454,422	17.12
Abstemio: no bebió en el último año	12,938,679	18.55	1,349,357	9.86	3,784,469	18.75
Abstemio: nunca ha bebido	24,512,628	35.13	8,813,575	64.40	5,792,467	28.71
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	9,915,026	100.00	16,021,998	100.00
Diario o casi diario	777,014	1.47	25,509	0.26	190,722	1.19
De 1 a 4 veces por semana	4,087,922	7.73	276,805	2.79	1,444,861	9.02
De 1 a 3 veces por mes	6,759,318	12.78	714,861	7.21	2,435,392	15.20
De 3 a 11 veces al año	5,544,632	10.48	445,661	4.49	2,063,915	12.88
De 1 a 2 veces al año	9,705,776	18.35	1,516,394	15.29	2,992,312	18.68
Abstemio: no bebió en el último año	9,854,808	18.63	961,930	9.70	3,150,238	19.66
Abstemio: nunca ha bebido	16,158,062	30.55	5,973,866	60.25	3,744,558	23.37
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	3,770,333	100.00	4,156,588	100.00
Diario o casi diario	170,085	1.01	8,705	0.23	33,257	0.80
De 1 a 4 veces por semana	826,244	4.89	33,594	0.89	235,845	5.67
De 1 a 3 veces por mes	1,621,676	9.61	129,146	3.43	410,432	9.87
De 3 a 11 veces al año	1,170,944	6.94	80,060	2.12	332,804	8.01
De 1 a 2 veces al año	1,652,149	9.79	291,692	7.74	462,110	11.12
Abstemio: no bebió en el último año	3,083,871	18.27	387,427	10.28	634,231	15.26
Abstemio: nunca ha bebido	8,354,566	49.50	2,839,709	75.32	2,047,909	49.27

Cuadro 3.2.11 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	14,038,071	100.00	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Diario o casi diario	319,610	2.28	134,390	1.16	234,906	2.28
De 1 a 4 veces por semana	1,061,245	7.56	1,142,360	9.89	719,456	6.98
De 1 a 3 veces por mes	1,919,115	13.67	1,788,016	15.48	984,032	9.54
De 3 a 11 veces al año	1,439,977	10.26	1,398,324	12.10	954,835	9.26
De 1 a 2 veces al año	2,658,521	18.94	1,969,614	17.05	1,467,282	14.23
Abstemio: no bebió en el último año	2,650,256	18.88	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Abstemio: nunca ha bebido	3,989,347	28.42	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
ÁREAS URBANAS	10,792,042	100.00	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Diario o casi diario	288,964	2.68	110,594	1.25	161,225	2.21
De 1 a 4 veces por semana	894,882	8.29	935,482	10.57	535,892	7.34
De 1 a 3 veces por mes	1,572,731	14.57	1,372,865	15.50	663,469	9.08
De 3 a 11 veces al año	1,180,471	10.94	1,141,840	12.90	712,745	9.76
De 1 a 2 veces al año	2,259,494	20.94	1,671,556	18.88	1,266,020	17.33
Abstemio: no bebió en el último año	1,967,436	18.23	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Abstemio: nunca ha bebido	2,628,064	24.35	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
ÁREAS RURALES	3,246,029	100.00	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Diario o casi diario	30,646	0.94	23,796	0.88	73,681	2.45
De 1 a 4 veces por semana	166,363	5.13	206,878	7.67	183,564	6.10
De 1 a 3 veces por mes	346,384	10.67	415,151	15.38	320,563	10.66
De 3 a 11 veces al año	259,506	7.99	256,484	9.50	242,090	8.05
De 1 a 2 veces al año	399,027	12.29	298,058	11.05	201,262	6.69
Abstemio: no bebió en el último año	682,820	21.04	445,966	16.53	933,427	31.03
Abstemio: nunca ha bebido	1,361,283	41.94	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02

Cuadro 3.2.12 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	20,178,586	100.00	14,038,071	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	5,516,652	9.84	1,904,685	9.44	1,380,855	9.84
De 1 a 3 veces por mes	7,536,987	13.44	2,845,824	14.10	1,919,115	13.67
De 3 a 11 veces al año	6,189,855	11.04	2,396,719	11.88	1,439,977	10.26
De 1 a 2 veces al año	9,549,839	17.03	3,454,422	17.12	2,658,521	18.94
Abstemio: no bebió en el último año	11,589,322	20.67	3,784,469	18.75	2,650,256	18.88
Abstemio: nunca ha bebido	15,699,053	27.99	5,792,467	28.71	3,989,347	28.42
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	16,021,998	100.00	10,792,042	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	4,562,622	10.62	1,635,583	10.21	1,183,846	10.97
De 1 a 3 veces por mes	6,044,457	14.07	2,435,392	15.20	1,572,731	14.57
De 3 a 11 veces al año	5,098,971	11.87	2,063,915	12.88	1,180,471	10.94
De 1 a 2 veces al año	8,189,382	19.06	2,992,312	18.68	2,259,494	20.94
Abstemio: no bebió en el último año	8,892,878	20.69	3,150,238	19.66	1,967,436	18.23
Abstemio: nunca ha bebido	10,184,196	23.70	3,744,558	23.37	2,628,064	24.35
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	4,156,588	100.00	3,246,029	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	954,030	7.28	269,102	6.47	197,009	6.07
De 1 a 3 veces por mes	1,492,530	11.39	410,432	9.87	346,384	10.67
De 3 a 11 veces al año	1,090,884	8.32	332,804	8.01	259,506	7.99
De 1 a 2 veces al año	1,360,457	10.38	462,110	11.12	399,027	12.29
Abstemio: no bebió en el último año	2,696,444	20.57	634,231	15.26	682,820	21.04
Abstemio: nunca ha bebido	5,514,857	42.07	2,047,909	49.27	1,361,283	41.94

Cuadro 3.2.12 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	1,276,750	11.05	954,362	9.25
De 1 a 3 veces por mes	1,788,016	15.48	984,032	9.54
De 3 a 11 veces al año	1,398,324	12.10	954,835	9.26
De 1 a 2 veces al año	1,969,614	17.05	1,467,282	14.23
Abstemio: no bebió en el último año	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Abstemio: nunca ha bebido	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
ÁREAS URBANAS	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	1,046,076	11.81	697,117	9.54
De 1 a 3 veces por mes	1,372,865	15.51	663,469	9.08
De 3 a 11 veces al año	1,141,840	12.90	712,745	9.76
De 1 a 2 veces al año	1,671,556	18.88	1,266,020	17.33
Abstemio: no bebió en el último año	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Abstemio: nunca ha bebido	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
ÁREAS RURALES	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	230,674	8.55	257,245	8.55
De 1 a 3 veces por mes	415,151	15.38	320,563	10.66
De 3 a 11 veces al año	256,484	9.50	242,090	8.05
De 1 a 2 veces al año	298,058	11.05	201,262	6.69
Abstemio: no bebió en el último año	445,966	16.53	933,427	31.03
Abstemio: nunca ha bebido	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02

Cuadro 3.2.13 (1a. Parte)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	24,585,706	100.00	8,721,300	100.00	6,135,624	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	4,679,673	19.03	1,561,370	17.90	1,224,231	19.95
De 1 a 3 veces por mes	5,454,022	22.18	1,976,849	22.67	1,472,767	24.00
De 3 a 11 veces al año	3,572,503	14.53	1,203,994	13.81	880,914	14.36
De 1 a 2 veces al año	3,387,422	13.78	1,236,973	14.18	908,095	14.80
Abstemio: no bebió en el último año	4,758,730	19.36	1,453,199	16.66	1,009,251	16.45
Abstemio: nunca ha bebido	2,733,356	11.12	1,288,915	14.78	640,366	10.44
ÁREAS URBANAS	18,800,299	100.00	6,980,412	100.00	4,910,484	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	3,804,769	20.24	1,315,914	18.85	1,045,113	21.28
De 1 a 3 veces por mes	4,234,877	22.53	1,616,193	23.15	1,214,957	24.74
De 3 a 11 veces al año	2,695,292	14.34	913,368	13.08	696,858	14.19
De 1 a 2 veces al año	2,846,169	15.14	1,093,636	15.67	801,015	16.31
Abstemio: no bebió en el último año	3,387,741	18.02	1,176,177	16.85	688,203	14.02
Abstemio: nunca ha bebido	1,831,451	9.74	865,124	12.39	464,338	9.46

Cuadro 3.2.13 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	5,004,244	100.00	4,724,538	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	1,041,043	20.80	853,029	18.06
De 1 a 3 veces por mes	1,265,564	25.29	738,842	15.64
De 3 a 11 veces al año	892,842	17.84	594,753	12.59
De 1 a 2 veces al año	655,235	13.09	587,119	12.43
Abstemio: no bebió en el último año	817,658	16.34	1,478,622	31.30
Abstemio: nunca ha bebido	331,902	6.63	472,173	9.99
ÁREAS URBANAS	3,847,420	100.00	3,061,983	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	838,957	21.81	604,785	19.75
De 1 a 3 veces por mes	948,105	24.64	455,622	14.88
De 3 a 11 veces al año	702,750	18.27	382,316	12.49
De 1 a 2 veces al año	495,433	12.88	456,085	14.90
Abstemio: no bebió en el último año	613,847	15.95	909,514	29.70
Abstemio: nunca ha bebido	248,328	6.45	253,661	8.28

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

Cuadro 3.2.14 (1a. Parte)

POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	31,496,002	100.00	11,457,286	100.00	7,902,447	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	836,979	2.66	343,315	3.00	156,624	1.98
De 1 a 3 veces por mes	2,082,965	6.61	868,975	7.58	446,348	5.65
De 3 a 11 veces al año	2,617,352	8.31	1,192,725	10.41	559,063	7.07
De 1 a 2 veces al año	6,162,417	19.57	2,217,449	19.35	1,750,426	22.15
Abstemio: no bebió en el último año	6,830,592	21.69	2,331,270	20.35	1,641,005	20.77
Abstemio: nunca ha bebido	12,965,697	41.17	4,503,552	39.31	3,348,981	42.38
ÁREAS URBANAS	24,172,207	100.00	9,041,586	100.00	5,881,558	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	757,853	3.14	319,669	3.54	138,733	2.36
De 1 a 3 veces por mes	1,809,580	7.49	819,199	9.06	357,774	6.08
De 3 a 11 veces al año	2,403,679	9.94	1,150,547	12.73	483,613	8.22
De 1 a 2 veces al año	5,343,213	22.10	1,898,676	21.00	1,458,479	24.80
Abstemio: no bebió en el último año	5,505,137	22.77	1,974,061	21.83	1,279,233	21.75
Abstemio: nunca ha bebido	8,352,745	34.56	2,879,434	31.85	2,163,726	36.79

Cuadro 3.2.14 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL^a	6,548,628	100.00	5,587,641	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	235,707	3.60	101,333	1.81
De 1 a 3 veces por mes	522,452	7.98	245,190	4.39
De 3 a 11 veces al año	505,482	7.72	360,082	6.44
De 1 a 2 veces al año	1,314,379	20.07	880,163	15.75
Abstemio: no bebió en el último año	1,294,547	19.77	1,563,770	27.99
Abstemio: nunca ha bebido	2,676,061	40.86	2,437,103	43.62
ÁREAS URBANAS	5,006,943	100.00	4,242,120	100.00
Diario, casi diario o de 1 a 4 veces por semana	207,119	4.14	92,332	2.18
De 1 a 3 veces por mes	424,760	8.48	207,847	4.90
De 3 a 11 veces al año	439,090	8.77	330,429	7.79
De 1 a 2 veces al año	1,176,123	23.49	809,935	19.09
Abstemio: no bebió en el último año	1,052,392	21.02	1,199,451	28.27
Abstemio: nunca ha bebido	1,707,459	34.10	1,602,126	37.77

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

Cuadro 3.2.15

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL^a						
Pulque	1,115,780	1.60	873,463	2.78	242,317	0.63
Cerveza	22,735,729	32.59	15,276,487	48.66	7,459,242	19.44
Vino de mesa	7,365,433	10.56	3,411,611	10.87	3,953,822	10.30
Destilados	14,743,214	21.13	8,539,999	27.20	6,203,215	16.17
Coolers	3,863,053	5.54	2,111,962	6.73	1,751,091	4.56
Aguardiente/alcohol de 96°	1,521,384	2.18	1,303,100	4.15	218,284	0.57
ÁREAS URBANAS						
Pulque	744,920	1.41	560,586	2.36	184,334	0.63
Cerveza	18,200,036	34.41	11,827,241	49.87	6,372,795	21.85
Vino de mesa	6,707,748	12.68	3,135,991	13.22	3,571,757	12.24
Destilados	13,175,437	24.91	7,368,134	31.07	5,807,303	19.91
Coolers	3,557,785	6.73	1,865,541	7.87	1,692,244	5.80
Aguardiente/alcohol de 96°	858,440	1.62	721,848	3.04	136,592	0.47
ÁREAS RURALES						
Pulque	370,860	2.20	312,877	4.07	57,983	0.63
Cerveza	4,535,693	26.87	3,449,246	44.92	1,086,447	11.81
Vino de mesa	657,685	3.90	275,620	3.59	382,065	4.15
Destilados	1,567,777	9.29	1,171,865	15.26	395,912	4.30
Coolers	305,268	1.81	246,421	3.21	58,847	0.64
Aguardiente/alcohol de 96°	662,944	3.93	581,252	7.57	81,692	0.89

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

Cuadro 3.2.16

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a						
Pulque	1,057,155	1.89	837,000	3.40	220,155	0.70
Cerveza	20,734,397	36.97	13,899,976	56.54	6,834,421	21.70
Vino de mesa	6,230,238	11.11	2,804,074	11.41	3,426,164	10.88
Destilados	13,641,334	24.32	7,912,114	32.18	5,729,220	18.19
Coolers	3,174,201	5.66	1,712,815	6.97	1,461,386	4.64
Aguardiente/alcohol de 96°	1,400,652	2.50	1,215,614	4.94	185,038	0.59
ÁREAS URBANAS						
Pulque	702,116	1.63	539,944	2.87	162,172	0.67
Cerveza	16,598,211	38.63	10,736,418	57.11	5,861,793	24.25
Vino de mesa	5,694,271	13.25	2,586,159	13.76	3,108,112	12.86
Destilados	12,195,465	28.38	6,833,392	36.35	5,362,073	22.18
Coolers	2,923,755	6.80	1,514,462	8.06	1,409,293	5.83
Aguardiente/alcohol de 96°	757,947	1.76	654,601	3.48	103,346	0.43
ÁREAS RURALES						
Pulque	355,039	2.71	297,056	5.13	57,983	0.79
Cerveza	4,136,186	31.55	3,163,558	54.68	972,628	13.28
Vino de mesa	535,967	4.09	217,915	3.77	318,052	4.34
Destilados	1,445,869	11.03	1,078,722	18.65	367,147	5.01
Coolers	250,446	1.91	198,353	3.43	52,093	0.71
Aguardiente/alcohol de 96°	642,705	4.90	561,013	9.70	81,692	1.12

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las bebidas mencionadas.

Cuadro 3.2.17 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067		13,685,359		20,178,586	
Pulque, aguardiente						
O alcohol de 96°	2,456,257	3.52	169,091	1.24	570,184	2.83
Cerveza	22,735,729	32.59	2,001,332	14.62	8,036,402	39.83
Vino de mesa	7,365,433	10.56	1,135,195	8.30	2,238,010	11.09
Destilados	14,743,214	21.13	1,101,880	8.05	5,151,269	25.53
Coolers	3,863,053	5.54	688,852	5.03	1,619,788	8.03
ÁREAS URBANAS	52,887,532		9,915,026		16,021,998	
Pulque, aguardiente						
O alcohol de 96°	1,456,329	2.75	133,031	1.34	339,961	2.12
Cerveza	18,200,036	34.41	1,601,825	16.16	6,805,143	42.47
Vino de mesa	6,707,748	12.68	1,013,477	10.22	2,019,963	12.61
Destilados	13,175,437	24.91	979,972	9.88	4,700,295	29.34
Coolers	3,557,785	6.73	634,030	6.39	1,500,117	9.36
ÁREAS RURALES	16,879,535		3,770,333		4,156,588	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	999,928	5.92	36,060	0.96	230,223	5.54
Cerveza	4,535,693	26.87	399,507	10.60	1,231,259	29.62
Vino de mesa	657,685	3.90	121,718	3.23	218,047	5.25
Destilados	1,567,777	9.29	121,908	3.23	450,974	10.85
Coolers	305,268	1.81	54,822	1.45	119,671	2.88

Cuadro 3.2.17 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	14,038,071		11,552,872		10,312,179	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	539,347	3.84	651,763	5.64	525,872	5.10
Cerveza	5,427,730	38.66	4,302,847	37.24	2,967,418	28.78
Vino de mesa	1,660,739	11.83	1,324,536	11.47	1,006,953	9.76
Destilados	3,463,241	24.67	3,072,352	26.59	1,954,472	18.95
Coolers	657,140	4.68	610,901	5.29	286,372	2.78
ÁREAS URBANAS	10,792,042		8,854,363		7,304,103	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	327,364	3.03	367,609	4.15	288,364	3.95
Cerveza	4,424,774	41.00	3,247,814	36.68	2,120,480	29.03
Vino de mesa	1,496,106	13.86	1,220,388	13.78	957,814	13.11
Destilados	3,102,315	28.75	2,810,060	31.74	1,582,795	21.67
Coolers	634,564	5.88	537,170	6.07	251,904	3.45
ÁREAS RURALES	3,246,029		2,698,509		3,008,076	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	211,983	6.53	284,154	10.53	237,508	7.90
Cerveza	1,002,956	30.90	1,055,033	39.10	846,938	28.16
Vino de mesa	164,633	5.07	104,148	3.86	49,139	1.63
Destilados	360,926	11.12	262,292	9.72	371,677	12.36
Coolers	22,576	0.70	73,731	2.73	34,468	1.15

^a Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población de 12 a 65 años de edad, consumidora y no consumidora de alcohol.

^b Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 12 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

Cuadro 3.2.18. (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708		20,178,586		14,038,071	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	2,287,166	4.08	570,184	2.83	539,347	3.84
Cerveza	20,734,397	36.97	8,036,402	39.83	5,427,730	38.66
Vino de mesa	6,230,238	11.11	2,238,010	11.09	1,660,739	11.83
Destilados	13,641,334	24.32	5,151,269	25.53	3,463,241	24.67
Coolers	3,174,201	5.66	1,619,788	8.03	657,140	4.68
ÁREAS URBANAS	42,972,506		16,021,998		10,792,042	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	1,323,298	3.08	339,961	2.12	327,364	3.03
Cerveza	16,598,211	38.63	6,805,143	42.47	4,424,774	41.00
Vino de mesa	5,694,271	13.25	2,019,963	12.61	1,496,106	13.86
Destilados	12,195,465	28.38	4,700,295	29.34	3,102,315	28.75
Coolers	2,923,755	6.80	1,500,117	9.36	634,564	5.88
ÁREAS RURALES	13,109,202		4,156,588		3,246,029	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	963,868	7.35	230,223	5.54	211,983	6.53
Cerveza	4,136,186	31.55	1,231,259	29.62	1,002,956	30.90
Vino de mesa	535,967	4.09	218,047	5.25	164,633	5.07
Destilados	1,445,869	11.03	450,974	10.85	360,926	11.12
Coolers	250,446	1.91	119,671	2.88	22,576	0.70

Cuadro 3.2.18 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	11,552,872		10,312,179	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	651,763	5.64	525,872	5.10
Cerveza	4,302,847	37.24	2,967,418	28.78
Vino de mesa	1,324,536	11.47	1,006,953	9.76
Destilados	3,072,352	26.59	1,954,472	18.95
Coolers	610,901	5.29	286,372	2.78
ÁREAS URBANAS	8,854,363		7,304,103	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	367,609	4.15	288,364	3.95
Cerveza	3,247,814	36.68	2,120,480	29.03
Vino de mesa	1,220,388	13.78	957,814	13.11
Destilados	2,810,060	31.74	1,582,795	21.67
Coolers	537,170	6.07	251,904	3.45
ÁREAS RURALES	2,698,509		3,008,076	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	284,154	10.53	237,508	7.90
Cerveza	1,055,033	39.10	846,938	28.16
Vino de mesa	104,148	3.86	49,139	1.63
Destilados	262,292	9.72	371,677	12.36
Coolers	73,731	2.73	34,468	1.15

^a Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población de 12 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

^b Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

Cuadro 3.2.19. (1a. Parte)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGUN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	24 585 706		8 721 300		6 135 624	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	1 934 360	7.87	470 468	5.39	449 008	7.32
Cerveza	13 899 976	56.54	5 149 811	59.05	3 711 941	60.50
Vino de mesa	2 804 074	11.41	961 288	11.02	770 088	12.55
Destilados	7 912 114	32.18	2 590 536	29.70	2 140 083	34.88
Coolers	1 712 815	6.97	806 964	9.25	406 335	6.62
ÁREAS URBANAS	18 800 299		6 980 412		4 910 484	
Pulque, aguardiente O alcohol de 96°	1,094,017	5.82	262 697	3.76	291,622	5.94
Cerveza	10,736,418	57.11	4,174,201	59.80	3,032,289	61.75
Vino de mesa	2,586,159	13.76	890,849	12.76	714,802	14.56
Destilados	6,833,392	36.35	2,286,374	32.75	1,926,766	39.24
Coolers	1,514,462	8.06	719,966	10.31	394,048	8.02
ÁREAS RURALES	5 785 407		1 740 888		1 225 140	
Pulque, aguardiente O alcohol de 96°	840,343	14.53	207,771	11.93	157,386	12.85
Cerveza	3,163,558	54.68	975,610	56.04	679,652	55.48
Vino de mesa	217,915	3.77	70,439	4.05	55,286	4.51
Destilados	1,078,722	18.65	304,162	17.47	213,317	17.41
Coolers	198,353	3.43	86 998	5.00	12,287	1.00

Cuadro 3.2.19. (2a. Parte y última)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGUN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	5,004,244		4,724,538	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	553,189	11.05	461,695	9.77
Cerveza	2,864,627	57.24	2,173,597	46.01
Vino de mesa	647,819	12.95	424,879	8.99
Destilados	1,902,289	38.01	1,279,206	27.08
Coolers	328,764	6.57	170,752	3.61
ÁREAS URBANAS	3,847,420		3,061,983	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	295,814	7.69	243,884	7.96
Cerveza	2,112,402	54.90	1,417,526	46.29
Vino de mesa	585,550	15.22	394,958	12.90
Destilados	1,675,930	43.56	944,322	30.84
Coolers	264,164	6.87	136,284	4.45
ÁREAS RURALES	1,156,824		1,662,555	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	257,375	22.25	217,811	13.10
Cerveza	752,225	65.03	756,071	45.48
Vino de mesa	62,269	5.38	29,921	1.80
Destilados	226,359	19.57	334,884	20.14
Coolers	64,600	5.58	34,468	2.07

^a Las cifras presentadas en total áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población masculina de 18 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

^b Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años de edad total y por cada grupo de edad según corresponda

Cuadro 3.2.20 (1a. Parte)

POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	31,496,002		11,457,286		7,902,447	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	352,806	1.12	99,716	0.87	90,339	1.14
Cerveza	6,834,421	21.70	2,886,591	25.19	1,715,789	21.71
Vino de mesa	3,426,164	10.88	1,276,722	11.14	890,651	11.27
Destilados	5,729,220	18.19	2,560,733	22.35	1,323,158	16.74
Coolers	1,461,386	4.64	812,824	7.09	250,805	3.17
ÁREAS URBANAS	24,172,207		9,041,586		5,881,558	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	229,281	0.95	77,264	0.85	35,742	0.61
Cerveza	5,861,793	24.25	2,630,942	29.10	1,392,485	23.68
Vino de mesa	3,108,112	12.86	1,129,114	12.49	781,304	13.28
Destilados	5,362,073	22.18	2,413,921	26.70	1,175,549	19.99
Coolers	1,409,293	5.83	780,151	8.63	240,516	4.09

Cuadro 3.2.20 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD ^{a b}

BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	6,548,628		5,587,641	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	98,574	1.51	64,177	1.15
Cerveza	1,438,220	21.96	793,821	14.21
Vino de mesa	676,717	10.33	582,074	10.42
Destilados	1,170,063	17.87	675,266	12.08
Coolers	282,137	4.31	115,620	2.07
ÁREAS URBANAS	5,006,943		4,242,120	
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	71,795	1.43	44,480	1.05
Cerveza	1,135,412	22.68	702,954	16.57
Vino de mesa	634,838	12.68	562,856	13.27
Destilados	1,134,130	22.65	638,473	15.05
Coolers	273,006	5.45	115,620	2.73

^a Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población femenina de 18 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

^b Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

Cuadro 3.2.21 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	31,393,657	100.00	38,373,410	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	24,512,628	35.13	6,708,498	21.37	17,804,130	46.40
Abstemio: no bebió en el último año	12,938,679	18.55	5,507,246	17.54	7,431,433	19.37
Bebedor poco frecuente bajo	13,563,415	19.44	4,882,285	15.55	8,681,130	22.62
Bebedor poco frecuente alto	4,510,086	6.46	3,257,680	10.38	1,252,406	3.26
Bebedor moderado bajo	3,132,124	4.49	1,693,291	5.39	1,438,833	3.75
Bebedor moderado alto	5,248,870	7.52	4,430,266	14.11	818,604	2.13
Bebedor frecuente bajo	1,358,469	1.95	854,458	2.72	504,011	1.31
Bebedor frecuente alto	1,276,306	1.83	1,020,324	3.25	255,982	0.67
Bebedor consuetudinario	3,226,490	4.62	3,039,609	9.68	186,881	0.49
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	23,715,545	100.00	29,171,987	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	16,158,062	30.55	4,502,490	18.99	11,655,572	39.95
Abstemio: no bebió en el último año	9,854,808	18.63	3,905,430	16.47	5,949,378	20.39
Bebedor poco frecuente bajo	11,837,485	22.38	4,187,330	17.66	7,650,155	26.22
Bebedor poco frecuente alto	3,412,923	6.45	2,342,007	9.88	1,070,916	3.67
Bebedor moderado bajo	2,652,984	5.02	1,368,142	5.77	1,284,842	4.40
Bebedor moderado alto	4,106,334	7.76	3,412,958	14.39	693,376	2.38
Bebedor frecuente bajo	1,258,888	2.38	792,501	3.34	466,387	1.60
Bebedor frecuente alto	978,637	1.85	747,580	3.15	231,057	0.79
Bebedor consuetudinario	2,627,411	4.97	2,457,107	10.36	170,304	0.58

Cuadro 3.2.21 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	7,678,112	100.00	9,201,423	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	8,354,566	49.50	2,206,008	28.73	6,148,558	66.82
Abstemio: no bebió en el último año	3,083,871	18.27	1,601,816	20.86	1,482,055	16.11
Bebedor poco frecuente bajo	1,725,930	10.22	694,955	9.05	1,030,975	11.20
Bebedor poco frecuente alto	1,097,163	6.50	915,673	11.93	181,490	1.97
Bebedor moderado bajo	479,140	2.84	325,149	4.23	153,991	1.67
Bebedor moderado alto	1,142,536	6.77	1,017,308	13.25	125,228	1.36
Bebedor frecuente bajo	99,581	0.59	61,957	0.81	37,624	0.41
Bebedor frecuente alto	297,669	1.76	272,744	3.55	24,925	0.27
Bebedor consuetudinario	599,079	3.55	582,502	7.59	16,577	0.18

Cuadro 3.2.22 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	24,585,706	100.00	31,496,002	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	15,699,053	27.99	2,733,356	11.12	12,965,697	41.17
Abstemio: no bebió en el último año	11,589,322	20.67	4,758,730	19.36	6,830,592	21.69
Bebedor poco frecuente bajo	11,484,146	20.48	3,856,017	15.68	7,628,129	24.22
Bebedor poco frecuente alto	4,255,548	7.59	3,103,908	12.62	1,151,640	3.66
Bebedor moderado bajo	2,614,882	4.66	1,297,771	5.28	1,317,111	4.18
Bebedor moderado alto	4,922,105	8.78	4,156,251	16.91	765,854	2.43
Bebedor frecuente bajo	1,228,126	2.19	802,081	3.26	426,045	1.35
Bebedor frecuente alto	1,210,678	2.16	976,704	3.97	233,974	0.74
Bebedor consuetudinario	3,077,848	5.49	2,900,888	11.80	176,960	0.56
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	18,800,299	100.00	24,172,207	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	10,184,196	23.70	1,831,451	9.74	8,352,745	34.56
Abstemio: no bebió en el último año	8,892,878	20.69	3,387,741	18.02	5,505,137	22.77
Bebedor poco frecuente bajo	10,094,313	23.49	3,334,605	17.74	6,759,708	27.96
Bebedor poco frecuente alto	3,194,040	7.43	2,206,856	11.74	987,184	4.08
Bebedor moderado bajo	2,222,946	5.17	1,053,992	5.61	1,168,954	4.84
Bebedor moderado alto	3,821,511	8.89	3,180,885	16.92	640,626	2.65
Bebedor frecuente bajo	1,144,020	2.66	755,599	4.02	388,421	1.61
Bebedor frecuente alto	935,223	2.18	726,174	3.86	209,049	0.86
Bebedor consuetudinario	2,483,379	5.78	2,322,996	12.36	160,383	0.66

Cuadro 3.2.22 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	5,785,407	100.00	7,323,795	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	5,514,857	42.07	901,905	15.59	4,612,952	62.99
Abstemio: no bebió en el último año	2,696,444	20.57	1,370,989	23.70	1,325,455	18.10
Bebedor poco frecuente bajo	1,389,833	10.60	521,412	9.01	868,421	11.86
Bebedor poco frecuente alto	1,061,508	8.10	897,052	15.51	164,456	2.25
Bebedor moderado bajo	391,936	2.99	243,779	4.21	148,157	2.02
Bebedor moderado alto	1,100,594	8.40	975,366	16.86	125,228	1.71
Bebedor frecuente bajo	84,106	0.64	46,482	0.80	37,624	0.51
Bebedor frecuente alto	275,455	2.10	250,530	4.33	24,925	0.34
Bebedor consuetudinario	594,469	4.53	577,892	9.99	16,577	0.23

Cuadro 3.2.23 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	69,767,067	100.00	13,685,359	100.00	20,178,586	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	24,512,628	35.13	8,813,575	64.40	5,792,467	28.71
Abstemio: no bebió en el último año	12,938,679	18.55	1,349,357	9.86	3,784,469	18.75
Bebedor poco frecuente	18,073,501	25.91	2,333,807	17.05	5,851,141	29.00
Bebedor moderado	8,380,994	12.01	844,007	6.17	2,845,824	14.10
Bebedor frecuente	2,634,775	3.78	195,971	1.43	831,258	4.12
Bebedor consuetudinario	3,226,490	4.62	148,642	1.09	1,073,427	5.32
ÁREAS URBANAS	52,887,532	100.00	9,915,026	100.00	16,021,998	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	16,158,062	30.55	5,973,866	60.25	3,744,558	23.37
Abstemio: no bebió en el último año	9,854,808	18.63	961,930	9.70	3,150,238	19.66
Bebedor poco frecuente	15,250,408	28.84	1,962,055	19.79	5,056,227	31.56
Bebedor moderado	6,759,318	12.78	714,861	7.21	2,435,392	15.20
Bebedor frecuente	2,237,525	4.23	158,282	1.60	721,412	4.50
Bebedor consuetudinario	2,627,411	4.97	144,032	1.45	914,171	5.71
ÁREAS RURALES	16,879,535	100.00	3,770,333	100.00	4,156,588	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	8,354,566	49.50	2,839,709	75.32	2,047,909	49.27
Abstemio: no bebió en el último año	3,083,871	18.27	387,427	10.28	634,231	15.26
Bebedor poco frecuente	2,823,093	16.72	371,752	9.86	794,914	19.12
Bebedor moderado	1,621,676	9.61	129,146	3.43	410,432	9.87
Bebedor frecuente	397,250	2.35	37,689	1.00	109,846	2.64
Bebedor consuetudinario	599,079	3.55	4,610	0.12	159,256	3.83

Cuadro 3.2.23 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	14,038,071	100.00	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	3,989,347	28.42	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
Abstemio: no bebió en el último año	2,650,256	18.88	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Bebedor poco frecuente	4,098,498	29.20	3,367,938	29.15	2,422,117	23.49
Bebedor moderado	1,919,115	13.67	1,788,016	15.48	984,032	9.54
Bebedor frecuente	494,439	3.52	657,419	5.69	455,688	4.42
Bebedor consuetudinario	886,416	6.31	619,331	5.36	498,674	4.84
ÁREAS URBANAS	10,792,042	100.00	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	2,628,064	24.35	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
Abstemio: no bebió en el último año	1,967,436	18.23	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Bebedor poco frecuente	3,439,965	31.88	2,813,396	31.77	1,978,765	27.09
Bebedor moderado	1,572,731	14.57	1,372,865	15.50	663,469	9.08
Bebedor frecuente	428,042	3.97	579,140	6.54	350,649	4.80
Bebedor consuetudinario	755,804	7.00	466,936	5.27	346,468	4.74
ÁREAS RURALES	3,246,029	100.00	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	1,361,283	41.94	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02
Abstemio: no bebió en el último año	682,820	21.04	445,966	16.53	933,427	31.03
Bebedor poco frecuente	658,533	20.29	554,542	20.55	443,352	14.74
Bebedor moderado	346,384	10.67	415,151	15.38	320,563	10.66
Bebedor frecuente	66,397	2.05	78,279	2.90	105,039	3.49
Bebedor consuetudinario	130,612	4.02	152,395	5.65	152,206	5.06

Cuadro 3.2.24 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	56,081,708	100.00	20,178,586	100.00	14,038,071	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	15,699,053	27.99	5,792,467	28.71	3,989,347	28.42
Abstemio: no bebió en el último año	11,589,322	20.67	3,784,469	18.75	2,650,256	18.88
Bebedor poco frecuente	15,739,694	28.07	5,851,141	29.00	4,098,498	29.20
Bebedor moderado	7,536,987	13.44	2,845,824	14.10	1,919,115	13.67
Bebedor frecuente	2,438,804	4.35	831,258	4.12	494,439	3.52
Bebedor consuetudinario	3,077,848	5.49	1,073,427	5.32	886,416	6.31
ÁREAS URBANAS	42,972,506	100.00	16,021,998	100.00	10,792,042	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	10,184,196	23.70	3,744,558	23.37	2,628,064	24.35
Abstemio: no bebió en el último año	8,892,878	20.69	3,150,238	19.66	1,967,436	18.23
Bebedor poco frecuente	13,288,353	30.92	5,056,227	31.56	3,439,965	31.88
Bebedor moderado	6,044,457	14.07	2,435,392	15.20	1,572,731	14.57
Bebedor frecuente	2,079,243	4.84	721,412	4.50	428,042	3.97
Bebedor consuetudinario	2,483,379	5.78	914,171	5.71	755,804	7.00
ÁREAS RURALES	13,109,202	100.00	4,156,588	100.00	3,246,029	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	5,514,857	42.07	2,047,909	49.27	1,361,283	41.94
Abstemio: no bebió en el último año	2,696,444	20.57	634,231	15.26	682,820	21.04
Bebedor poco frecuente	2,451,341	18.70	794,914	19.12	658,533	20.29
Bebedor moderado	1,492,530	11.39	410,432	9.87	346,384	10.67
Bebedor frecuente	359,561	2.74	109,846	2.64	66,397	2.05
Bebedor consuetudinario	594,469	4.53	159,256	3.83	130,612	4.02

Cuadro 3.2.24 (2a. Parte y última)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	11,552,872	100.00	10,312,179	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	3,007,963	26.04	2,909,276	28.21
Abstemio: no bebió en el último año	2,112,205	18.28	3,042,392	29.50
Bebedor poco frecuente	3,367,938	29.15	2,422,117	23.49
Bebedor moderado	1,788,016	15.48	984,032	9.54
Bebedor frecuente	657,419	5.69	455,688	4.42
Bebedor consuetudinario	619,331	5.36	498,674	4.84
ÁREAS URBANAS	8,854,363	100.00	7,304,103	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	1,955,787	22.09	1,855,787	25.41
Abstemio: no bebió en el último año	1,666,239	18.82	2,108,965	28.87
Bebedor poco frecuente	2,813,396	31.77	1,978,765	27.09
Bebedor moderado	1,372,865	15.50	663,469	9.08
Bebedor frecuente	579,140	6.54	350,649	4.80
Bebedor consuetudinario	466,936	5.27	346,468	4.74
ÁREAS RURALES	2,698,509	100.00	3,008,076	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	1,052,176	38.99	1,053,489	35.02
Abstemio: no bebió en el último año	445,966	16.53	933,427	31.03
Bebedor poco frecuente	554,542	20.55	443,352	14.74
Bebedor moderado	415,151	15.38	320,563	10.66
Bebedor frecuente	78,279	2.90	105,039	3.49
Bebedor consuetudinario	152,395	5.65	152,206	5.06

Cuadro 3.2.25 (1a. Parte)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL^a	24,585,706	100.00	8,721,300	100.00	6,135,624	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	2,733,356	11.12	1,288,915	14.78	640,366	10.44
Abstemio: no bebió en el último año	4,758,730	19.36	1,453,199	16.66	1,009,251	16.45
Bebedor poco frecuente	6,959,925	28.31	2,440,967	27.99	1,789,009	29.16
Bebedor moderado	5,454,022	22.18	1,976,849	22.67	1,472,767	24.00
Bebedor frecuente	1,778,785	7.24	557,363	6.39	402,792	6.56
Bebedor consuetudinario	2,900,888	11.80	1,004,007	11.51	821,439	13.39
ÁREAS URBANAS	18,800,299	100.00	6,980,412	100.00	4,910,484	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	1,831,451	9.74	865,124	12.39	464,338	9.46
Abstemio: no bebió en el último año	3,387,741	18.02	1,176,177	16.85	688,203	14.01
Bebedor poco frecuente	5,541,461	29.48	2,007,004	28.75	1,497,873	30.50
Bebedor moderado	4,234,877	22.53	1,616,193	23.15	1,214,957	24.74
Bebedor frecuente	1,481,773	7.88	467,188	6.69	349,528	7.12
Bebedor consuetudinario	2,322,996	12.36	848,726	12.16	695,585	14.17

Cuadro 3.2.25. (2a. Parte y última)

POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a	5,004,244	100.00	4,724,538	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	331,902	6.63	472,173	9.99
Abstemio: no bebió en el último año	817,658	16.34	1,478,622	31.30
Bebedor poco frecuente	1,548,077	30.94	1,181,872	25.02
Bebedor moderado	1,265,564	25.29	738,842	15.64
Bebedor frecuente	438,716	8.77	379,914	8.04
Bebedor consuetudinario	602,327	12.04	473,115	10.01
ÁREAS URBANAS	3,847,420	100.00	3,061,983	100.00
Abstemio: nunca ha bebido	248,328	6.45	253,661	8.28
Abstemio: no bebió en el último año	613,847	15.95	909,514	29.70
Bebedor poco frecuente	1,198,183	31.14	838,401	27.38
Bebedor moderado	948,105	24.64	455,622	14.88
Bebedor frecuente	382,683	9.95	282,374	9.22
Bebedor consuetudinario	456,274	11.86	322,411	10.53

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

Cuadro 3.2.26 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a		
Tolerancia	3,404,351	4.88
Abstinencia	5,661,446	8.11
Incapacidad de control	7,395,283	10.60
Deseo persistente	1,645,046	2.36
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951,720	1.36
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1,134,180	1.63
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	1,113,809	1.60
Población que cumple el criterio de dependencia	2,841,303	4.07
ÁREAS URBANAS		
Tolerancia	2,650,345	5.01
Abstinencia	4,418,414	8.35
Incapacidad de control	5,754,843	10.88
Deseo persistente	1,219,149	2.31
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	737,238	1.39
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo.	875,314	1.66
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	871,321	1.65
Población que cumple el criterio de dependencia	2,133,499	4.03

Cuadro 3.2.26 (2a. Parte)

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
ÁREAS RURALES		
Tolerancia	754,006	4.47
Abstinencia	1,243,032	7.36
Incapacidad de control	1,640,440	9.72
Deseo persistente	425,897	2.52
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	214,482	1.27
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	258,866	1.53
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	242,488	1.44
Población que cumple el criterio de dependencia	707,804	4.19

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los síntomas mencionados.

Cuadro 3.2.27 (1a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a		
Tolerancia	2,986,777	5.33
Abstinencia	5,162,962	9.21
Incapacidad de control	6,693,720	11.94
Deseo persistente	1,578,661	2.81
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	917,739	1.64
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo.	1,084,187	1.93
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	1,016,040	1.81
Población que cumple el criterio de dependencia	2,559,396	4.56
ÁREAS URBANAS		
Tolerancia	2,285,083	5.32
Abstinencia	3,991,623	9.29
Incapacidad de control	5,174,820	12.04
Deseo persistente	1,186,289	2.76
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	723,496	1.68
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	838,607	1.95
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	784,993	1.83
Población que cumple el criterio de dependencia	1,928,592	4.49
ÁREAS RURALES		
Tolerancia	701,694	5.35
Abstinencia	1,171,339	8.94
Incapacidad de control	1,518,900	11.59
Deseo persistente	392,372	2.99
Emplea mucho tiempo para conseguir Alcohol o recuperarse de sus efectos	194,243	1.48

Cuadro 3.2.27 (2a. Parte)

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
ÁREAS RURALES		
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	245,580	1.87
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	231,047	1.76
Población que cumple el criterio de dependencia	630,804	4.81

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los síntomas mencionados.

Cuadro 3.2.28

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL^{a b}		
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	4.68
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	1.74
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	2,343,719	7.25
ÁREAS URBANAS		
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,367,380	5.09
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	459,737	1.71
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	1,798,295	6.69

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

^b No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

Cuadro 3.2.29

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^{a b}		
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,320,194	4.59
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	533,560	1.85
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	2,269,836	7.88
ÁREAS URBANAS		
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,185,292	4.96
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	431,199	1.80
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	1,730,974	7.24

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística

^b No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

Cuadro 3.2.30

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN DEPENDENCIA

TIPO DE LOCALIDAD Y PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL CON PROBLEMAS DERIVADOS		DEPENDENCIA			
	ABSOLUTO	RELATIVO	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^a						
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	4.68	745,956	2.31	766,748	2.37
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	1.74	330,718	1.02	231,380	0.72
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) Cuando estuvo tomando	2,343,719	7.25	1,184,940	3.67	1,158,779	3.59
ÁREAS URBANAS						
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,367,380	5.09	671,148	2.50	696,232	2.59
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	459,737	1.71	265,952	0.99	193,785	0.72
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) Cuando estuvo tomando	1,798,295	6.69	906,449	3.37	891,846	3.32
ÁREAS RURALES						
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	145,324	2.67	74,808	1.37	70,516	1.30
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	102,361	1.88	64,766	1.19	37,595	0.69
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	545,424	10.02	278,491	5.12	266,933	4.91

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

Cuadro 3.2.31

POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN DEPENDENCIA

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL CON PROBLEMAS DERIVADOS		DEPENDENCIA			
			BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL ^{a b}						
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,448,842	8.48	730,342	4.27	718,500	4.20
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	551,544	3.23	320,164	1.87	231,380	1.35
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	2,141,429	12.53	1,108,276	6.48	1,033,153	6.04
ÁREAS URBANAS						
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,304,005	37.12	656,021	18.68	647,984	18.45
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	459,737	13.09	265,952	7.57	193,785	5.52
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	1,640,280	46.70	844,514	24.04	795,766	22.66

^a No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

^b No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

Cuadro 3.2.32

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y RAZONES POR LAS QUE NUNCA LO HA CONSUMIDO, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y RAZONES POR LAS QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	24,512,628	100.00	6,708,498	100.00	17,804,130	100.00
Porque no se acostumbra en casa	2,833,360	11.56	634,323	9.46	2,199,037	12.35
Por religión	1,383,773	5.65	437,700	6.52	946,073	5.31
Por miedo a tener problemas	1,387,367	5.66	509,569	7.60	877,798	4.93
Porque no le llama la atención	17,637,493	71.95	4,704,821	70.13	12,932,672	72.64
Otro	1,270,635	5.18	422,085	6.29	848,550	4.77
ÁREAS URBANAS	16,158,062	100.00	4,502,490	100.00	11,655,572	100.00
Porque no se acostumbra en casa	1,718,408	10.63	411,323	9.14	1,307,085	11.21
Por religión	810,842	5.02	274,622	6.10	536,220	4.60
Por miedo a tener problemas	854,152	5.29	288,722	6.41	565,430	4.85
Porque no le llama la atención	11,839,812	73.27	3,244,891	72.07	8,594,921	73.74
Otro	934,848	5.79	282,932	6.28	651,916	5.59
ÁREAS RURALES	8,354,566	100.00	2,206,008	100.00	6,148,558	100.00
Porque no se acostumbra en casa	1,114,952	13.35	223,000	10.11	891,952	14.51
Por religión	572,931	6.86	163,078	7.39	409,853	6.67
Por miedo a tener problemas	533,215	6.38	220,847	10.01	312,368	5.08
Porque no le llama la atención	5,797,681	69.40	1,459,930	66.18	4,337,751	70.55
Otro	335,787	4.02	139,153	6.31	196,634	3.20

Cuadro 3.2.33

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA ^a	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	32,310,087	100.00	19,177,913	100.00	13,132,174	100.00
De 1 a 2	12,032,346	37.24	4,215,751	21.98	7,816,595	59.52
De 3 a 4	9,092,096	28.14	5,224,721	27.24	3,867,375	29.45
De 5 a 7	5,573,720	17.25	4,633,837	24.16	939,883	7.16
De 8 a 11	3,770,512	11.67	3,304,603	17.23	465,909	3.55
De 12 a 23	1,546,515	4.79	1,517,884	7.91	28,631	0.22
24 ó más	294,898	0.91	281,117	1.47	13,781	0.10
ÁREAS URBANAS	26,868,989	100.00	15,307,625	100.00	11,561,364	100.00
De 1 a 2	10,355,171	38.54	3,496,477	22.84	6,858,694	59.32
De 3 a 4	7,896,258	29.39	4,416,408	28.85	3,479,850	30.10
De 5 a 7	4,278,682	15.92	3,504,496	22.89	774,186	6.70
De 8 a 11	3,025,378	11.26	2,608,180	17.04	417,198	3.61
De 12 a 23	1,085,290	4.04	1,067,635	6.97	17,655	0.15
24 ó más	228,210	0.85	214,429	1.40	13,781	0.12
ÁREAS RURALES	5,441,098	100.00	3,870,288	100.00	1,570,810	100.00
De 1 a 2	1,677,175	30.82	719,274	18.58	957,901	60.98
De 3 a 4	1,195,838	21.98	808,313	20.89	387,525	24.67
De 5 a 7	1,295,038	23.80	1,129,341	29.18	165,697	10.55
De 8 a 11	745,134	13.69	696,423	17.99	48,711	3.10
De 12 a 23	461,225	8.48	450,249	11.63	10,976	0.70
24 ó más	66,688	1.23	66,688	1.72	0	0.00

^a Excluye el no especificado.

Cuadro 3.2.34

POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA ^a	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	28,791,380	100.00	17,093,620	100.00	11,697,760	100.00
DE 1 A 2	9,718,508	33.76	2,959,381	17.31	6,759,127	57.78
DE 3 A 4	8,400,808	29.18	4,850,806	28.38	3,550,002	30.35
DE 5 A 7	5,227,649	18.16	4,343,447	25.41	884,202	7.56
DE 8 A 11	3,648,633	12.67	3,186,616	18.64	462,017	3.95
DE 12 A 23	1,500,884	5.21	1,472,253	8.61	28,631	0.24
24 ó MÁS	294,898	1.02	281,117	1.64	13,781	0.12
ÁREAS URBANAS	23,893,479	100.00	13,581,107	100.00	10,312,372	100.00
DE 1 A 2	8,392,315	35.12	2,432,598	17.91	5,959,717	57.79
DE 3 A 4	7,323,598	30.65	4,141,032	30.49	3,182,566	30.86
DE 5 A 7	3,981,079	16.66	3,255,732	23.97	725,347	7.03
DE 8 A 11	2,920,211	12.22	2,506,905	18.46	413,306	4.01
DE 12 A 23	1,048,066	4.39	1,030,411	7.59	17,655	0.17
24 ó MÁS	228,210	0.96	214,429	1.58	13,781	0.13
ÁREAS RURALES	4,897,901	100.00	3,512,513	100.00	1,385,388	100.00
DE 1 A 2	1,326,193	27.08	526,783	15.00	799,410	57.70
DE 3 A 4	1,077,210	21.99	709,774	20.21	367,436	26.52
DE 5 A 7	1,246,570	25.45	1,087,715	30.97	158,855	11.47
DE 8 A 11	728,422	14.87	679,711	19.35	48,711	3.52
DE 12 A 23	452,818	9.25	441,842	12.58	10,976	0.79
24 ó MÁS	66,688	1.36	66,688	1.90	0	0.00

^a Excluye el no especificado.

ANEXO 4

4.1 INDICADORES DE DROGAS

4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (1a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	31,393,657	38,373,410
Nunca ha consumido drogas	66,258,426	28,695,687	37,562,739
Alguna vez ha consumido drogas	3,508,641	2,697,970	810,671
2. Población que ha consumido drogas por tipo^a:			
Drogas médicas	845,561	399,847	445,714
Mariguana	2,430,285	2,152,991	277,294
Cocaína ^b	857,766	700,033	157,733
Inhalables	314,760	291,447	23,313
Otras drogas	330,243	281,462	48,781
3. Lugar o fuente de obtención^a:			
En la calle	1,045,546	949,029	96,517
Con un amigo	1,957,846	1,638,795	319,051
Otras fuentes	765,810	425,617	340,193
4. Número de veces que ha utilizado drogas:	3,508,641	2,697,970	810,671
De 1 a 2 veces	1,668,729	1,258,124	410,605
De 3 a 5 veces	606,791	466,400	140,391
De 6 a 10 veces	349,167	304,543	44,624
De 11 a 49 veces	335,806	253,803	82,003
50 veces o más	497,372	382,446	114,926
No especificado	50,776	32,654	18,122
5. Última vez que usó drogas:	3,508,641	2,697,970	810,671
Último mes	569,903	410,745	159,158
Último año	343,462	293,403	50,059
Más de un año	2,432,765	1,893,689	539,076
No sabe	162,511	100,133	62,378
6. Edad de inicio por tipo de droga:	20.77	19.96	23.63
Drogas médicas	28.43	29.71	27.30
Mariguana	18.50	18.41	19.32
Cocaína ^b	22.24	22.51	21.03
Inhalables	17.79	18.11	13.85
Otras drogas	22.83	23.84	17.79
7. Condición de solicitud de ayuda:	3,508,641	2,697,970	810,671
No ha solicitado ayuda	3,337,348	2,544,127	793,221
Ha solicitado ayuda	171,293	153,843	17,450
8. Experiencias vividas por el uso de drogas^a:			
Discusiones con su familia o amigos	528,264	430,259	98,005
Peleas por consumir drogas	341,858	298,960	42,898
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	302,610	290,885	11,725
Problemas económicos	270,017	252,029	17,988

4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (2a. Parte)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Nunca ha consumido drogas	94.97	91.41	97.89
Alguna vez ha consumido drogas	5.03	8.59	2.11
2. Población que ha consumido drogas por tipo^a:			
Drogas médicas	1.21	1.27	1.16
Mariguana	3.48	6.86	0.72
Cocaína ^b	1.23	2.23	0.41
Inhalables	0.45	0.93	0.06
Otras drogas	0.47	0.90	0.13
3. Lugar o fuente de obtención^a:			
En la calle	29.80	35.18	11.91
Con un amigo	55.80	60.74	39.36
Otras fuentes	21.83	15.78	41.96
4. Número de veces que ha utilizado drogas:	100.00	100.00	100.00
De 1 a 2 veces	47.56	46.63	50.65
De 3 a 5 veces	17.29	17.29	17.32
De 6 a 10 veces	9.95	11.29	5.50
De 11 a 49 veces	9.57	9.41	10.12
50 veces o más	14.18	14.18	14.18
No especificado	1.45	1.21	2.24
5. Última vez que usó drogas:	100.00	100.00	100.00
Último mes	16.24	15.22	19.63
Último año	9.79	10.87	6.18
Más de un año	69.34	70.19	66.50
No sabe	4.63	3.71	7.69
6. Edad de inicio por tipo de droga:	20.77	19.96	23.63
Drogas médicas	28.43	29.71	27.30
Mariguana	18.50	18.41	19.32
Cocaína ^b	22.24	22.51	21.03
Inhalables	17.79	18.11	13.85
Otras drogas	22.83	23.84	17.79
7. Condición de solicitud de ayuda:	100.00	100.00	100.00
No ha solicitado ayuda	95.12	94.30	97.85
Ha solicitado ayuda	4.88	5.70	2.15
8. Experiencias vividas por el uso de drogas^a:			
Discusiones con su familia o amigos	15.06	15.95	12.09
Peleas por consumir drogas	9.74	11.08	5.29
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	8.62	10.78	1.45
Problemas económicos	7.70	9.34	2.22

4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (3a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	52,887,532	16,879,535
Nunca ha consumido drogas	66,258,426	49,942,133	16,316,293
Alguna vez ha consumido drogas	3,508,641	2,945,399	563,242
2. Población que ha consumido drogas por tipo^a:			
Drogas médicas	845,561	732,373	113,188
Mariguana	2,430,285	2,045,071	385,214
Cocaína ^b	857,766	761,287	96,479
Inhalables	314,760	281,030	33,730
Otras drogas	330,243	304,070	26,173
3. Lugar o fuente de obtención^a:			
En la calle	1,045,546	856,354	189,192
Con un amigo	1,957,846	1,684,607	273,239
Otras fuentes	765,810	640,253	125,557
4. Número de veces que ha utilizado drogas:	3,508,641	2,945,399	563,242
De 1 a 2 veces	1,668,729	1,373,047	295,682
De 3 a 5 veces	606,791	509,461	97,330
De 6 a 10 veces	349,167	296,423	52,744
De 11 a 49 veces	335,806	271,364	64,442
50 veces o más	497,372	445,240	52,132
No especificado	50,776	49,864	912
5. Última vez que usó drogas:	3,508,641	2,945,399	563,242
Último mes	569,903	462,540	107,363
Último año	343,462	295,598	47,864
Más de un año	2,432,765	2,054,890	377,875
No sabe	162,511	132,371	30,140
6. Edad de inicio por tipo de droga:	20.77	20.51	22.14
Drogas médicas	28.43	28.45	28.32
Mariguana	18.50	18.30	19.59
Cocaína ^b	22.24	20.85	33.23
Inhalables	17.79	17.65	19.02
Otras drogas	22.83	20.89	39.05
7. Condición de solicitud de ayuda:	3,508,641	2,945,399	563,242
No ha solicitado ayuda	3,337,348	2,792,982	544,366
Ha solicitado ayuda	171,293	152,417	18,876
8. Experiencias vividas por el uso de drogas^a:			
Discusiones con su familia o amigos	528,264	490,678	37,586
Pelea por consumir drogas	341,858	332,787	9,071
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	302,610	289,689	12,921
Problemas económicos	270,017	261,998	8,019

4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (4a. Parte y última)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Nunca ha consumido drogas	94.97	94.43	96.66
Alguna vez ha consumido drogas	5.03	5.57	3.34
2. Población que ha consumido drogas por tipo^a:			
Drogas médicas	1.21	1.38	0.67
Mariguana	3.48	3.87	2.28
Cocaína ^b	1.23	1.44	0.57
Inhalables	0.45	0.53	0.20
Otras drogas	0.47	0.58	0.16
3. Lugar o fuente de obtención^a:			
En la calle	29.80	29.07	33.59
Con un amigo	55.80	57.19	48.51
Otras fuentes	21.83	21.74	22.29
4. Número de veces que ha utilizado drogas:	100.00	100.00	100.00
De 1 a 2 veces	47.56	46.62	52.50
De 3 a 5 veces	17.29	17.30	17.28
De 6 a 10 veces	9.95	10.06	9.36
De 11 a 49 veces	9.57	9.21	11.44
50 veces o más	14.18	15.12	9.26
No especificado	1.45	1.69	0.16
5. Última vez que usó drogas:	100.00	100.00	100.00
Último mes	16.24	15.70	19.06
Último año	9.79	10.04	8.50
Más de un año	69.34	69.77	67.09
No sabe	4.63	4.49	5.35
6. Edad de inicio por tipo de droga:	21.48	21.10	23.50
Drogas médicas	28.80	28.85	28.52
Mariguana	18.50	18.30	19.59
Cocaína ^b	22.32	20.94	33.26
Inhalables	17.79	17.65	19.02
Otras drogas	22.03	20.29	39.05
7. Condición de solicitud de ayuda:	100.00	100.00	100.00
No ha solicitado ayuda	95.12	94.83	96.65
Ha solicitado ayuda	4.88	5.17	3.35
8. Experiencias vividas por el uso de drogas^a:			
Discusiones con su familia o amigos	15.06	16.66	6.67
Peleas por consumir drogas	9.74	11.30	1.61
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	8.62	9.84	2.29
Problemas económicos	7.70	8.90	1.42

^a No presentan totales ya que es posible la incidencia en más de una de las variables mencionadas.

^b Incluye cocaína, pasta de cocaína y crack.

4.2 Tabulados de Drogas

4.2 Índice de tabulados

- 4.2.1 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas alguna vez en su vida por tipo de localidad y grupos de edad, según sexo
- 4.2.2 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas por lo menos una vez en el último año por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.3 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas médicas alguna vez en su vida por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.4 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas ilegales alguna vez en su vida por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.5 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas por tipo de localidad, según número de veces que ha usado drogas en su vida

Cuadro 4.2.1

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	3,508,641	5.03	2,697,970	8.59	810,671	2.11
De 12 a 34 años	2,010,595	2.88	1,516,460	4.83	494,135	1.29
De 35 a 65 años	1,498,046	2.15	1,181,510	3.76	316,536	0.82
ÁREAS URBANAS	2,945,399	5.57	2,233,937	9.42	711,462	2.44
De 12 a 34 años	1,733,922	3.28	1,289,630	5.44	444,292	1.52
De 35 a 65 años	1,211,477	2.29	944,307	3.98	267,170	0.92
ÁREAS RURALES	563,242	3.34	464,033	6.04	99,209	1.08
De 12 a 34 años	276,673	1.64	226,830	2.95	49,843	0.54
De 35 a 65 años	286,569	1.70	237,203	3.09	49,366	0.54

Cuadro 4.2.2

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS POR LO MENOS UNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	913,365	1.31	704,148	2.24	209,217	0.55
ÁREAS URBANAS	758,138	1.43	579,927	2.45	178,211	0.61
ÁREAS RURALES	155,227	0.92	124,221	1.62	31,006	0.34

Cuadro 4.2.3

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS MÉDICAS ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS MÉDICAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	845,561	1.21	399,847	1.27	445,714	1.16
ÁREAS URBANAS	732,373	1.38	342,711	1.45	389,662	1.34
ÁREAS RURALES	113,188	0.67	57,136	0.74	56,052	0.61

Cuadro 4.2.4

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS ILEGALES ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS ILEGALES		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	2,893,374	4.15	2,511,203	8.00	382,171	1.00
ÁREAS URBANAS	2,440,021	4.61	2,101,007	8.86	339,014	1.16
ÁREAS RURALES	453,353	2.69	410,196	5.34	43,157	0.47

Cuadro 4.2.5

POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE HA USADO DROGAS EN SU VIDA

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		NÚMERO DE VECES QUE HA USADO DROGAS					
			De 1 a 5 veces		6 Veces o más		No especificado	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	3,508,641	5.03	2,275,520	3.26	1,182,345	1.69	50,776	0.07
ÁREAS URBANAS	2,945,399	5.57	1,882,508	3.56	1,013,027	1.92	49,864	0.09
ÁREAS RURALES	563,242	3.34	393,012	2.33	169,318	1.00	912	0.01

ANEXO 5

TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA

Esta encuesta está autorizada por la ley de información estadística y geográfica, capítulo V, artículo 38. Toda información se mantendrá con carácter estrictamente CONFIDENCIAL

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES
TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES
(T.R.H. Forma ENA-01)

a) Entidad _____
b) Municipio _____
c) Estrato _____

d) Dirección de la vivienda (calle, camino, carretera, núm. exterior e interior y colonia o fraccionamiento)

Núm.de Renglón del Listado de Viv. _____

Verifique en el registro de listado de viviendas, si se encuentra en la vivienda seleccionada.

TRANSCRIBA DEL LISTADO DE VIVIENDAS

e) AGEB _____ f) SECTOR _____ g) ÁREA DE LISTADO _____ h) MANZANA _____ i) CONTROL _____ j) NÚMERO VIV. SEL. _____ k) HOGAR _____

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA	TAMAÑO DE LA VIVIENDA	MATERIAL PREDOMINANTE DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS	TIPO DE HOGAR
1. Identifique y marque la opción correspondiente 1. <input type="checkbox"/> Casa sola 2. <input type="checkbox"/> Departamento en edificio 3. <input type="checkbox"/> Departamento en vecindad 4. <input type="checkbox"/> Cuarto de azotea 5. <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____	3. ¿Tiene esta vivienda un cuarto exclusivo para cocinar? (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> SI 2. <input type="checkbox"/> NO	4. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda? (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Tabique, ladrillo, block, piedra o concreto 2. <input type="checkbox"/> Madera 3. <input type="checkbox"/> Adobe 4. <input type="checkbox"/> Lámina de asbesto o metálica 5. <input type="checkbox"/> Lámina de cartón 6. <input type="checkbox"/> Otra _____ especifique _____	5. Esta vivienda cuenta con servicios de: (Lea todas las opciones y marque las indicadas) Si = 1 No = 2 1. <input type="checkbox"/> Energía eléctrica 2. <input type="checkbox"/> Agua entubada 3. <input type="checkbox"/> Drenaje 4. <input type="checkbox"/> Otro _____ 9. <input type="checkbox"/> No respuesta especifique _____	7. Codifique el tipo de hogar de acuerdo al parentesco 1. <input type="checkbox"/> Hogar nuclear (Jefe, esposa e hijos.) 2. <input type="checkbox"/> Hogar ampliado (Jefe, esposa, hijos, sobrinos, cuñados, primos, amigos, huéspedes.) 3. <input type="checkbox"/> Hogar extenso (Jefe, esposa, hijos, padres, abuelos, nietos, nueras, yernos, hermanos solteros.) 4. <input type="checkbox"/> Hogar extenso mixto (Jefe, esposa, hijos, tíos, sobrinos, cuñados, concuños, primos, hermanos, suegros, amigos, huéspedes.) 5. <input type="checkbox"/> Hogar de otros parientes (Jefe, primos, sobrinos, tíos, cuñado.) 6. <input type="checkbox"/> Hogar de corresidentes no parientes entre sí (Jefe, amigos, huéspedes.) 7. <input type="checkbox"/> Hogar de otros parientes y no parientes (Jefe, primos, sobrinos, cuñado, concuños, tíos, compadres, ahijados, amigos, huéspedes.) 8. <input type="checkbox"/> Hogar unipersonal (Persona sola) 9. <input type="checkbox"/> Hogar reconstruido (Hogar con hijos de uniones anteriores)
2. ¿Esta vivienda es? (Lea las opciones y marque la indicada) 1. <input type="checkbox"/> La está pagando 2. <input type="checkbox"/> Propia y totalmente pagada 3. <input type="checkbox"/> Rentada o alquilada 4. <input type="checkbox"/> Prestada o cedida sin pago 5. <input type="checkbox"/> No sabe 6. <input type="checkbox"/> Otra _____ especifique _____	3.1 ¿Cuánta la vivienda con cuarto de baño? (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> SI _____ 2. <input type="checkbox"/> NO _____ 1. <input type="checkbox"/> Exclusivo de los miembros del hogar 2. <input type="checkbox"/> De uso colectivo	4.1 ¿De qué material es la mayor parte de los techos de la vivienda? (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Losa de concreto, tabique o ladrillo 2. <input type="checkbox"/> Palma, tejamanil o madera 3. <input type="checkbox"/> Lámina de asbesto 4. <input type="checkbox"/> Lámina de cartón 5. <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____	6. Bienes de la vivienda (Lea todas las opciones y marque las indicadas) Si = 1 No = 2 1. <input type="checkbox"/> Radiograbadora 2. <input type="checkbox"/> Televisión 3. <input type="checkbox"/> Estéreo o modular 4. <input type="checkbox"/> Videocasetera 5. <input type="checkbox"/> Teléfono 6. <input type="checkbox"/> Refrigerador 7. <input type="checkbox"/> Lavadora 8. <input type="checkbox"/> Calentador de Agua (boiler) 9. <input type="checkbox"/> Automóvil o camioneta 10. <input type="checkbox"/> Computadora 11. <input type="checkbox"/> Ninguno 12. <input type="checkbox"/> No respuesta	
2.1 ¿A nombre de quién está el contrato o, a quién le prestaron esta vivienda (casa, departamento, cuarto)? (Lea las opciones y marque la indicada) 1. <input type="checkbox"/> Jefa o jefe 2. <input type="checkbox"/> Esposa o esposo, cónyuge del jefe 3. <input type="checkbox"/> Hija(s) o hijo(s) 4. <input type="checkbox"/> Otra (o) residente pariente 5. <input type="checkbox"/> Otra (o) residente no pariente 6. <input type="checkbox"/> Otra (o) no residente 9. <input type="checkbox"/> No respuesta	3.2 ¿Cuántos cuartos se usan exclusivamente para dormir en esta vivienda? _____ cuartos para dormir	4.2 ¿De qué material es la mayor parte de los pisos de la vivienda? (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Madera, mosaico u otros recubrimientos 2. <input type="checkbox"/> Concreto o firme 3. <input type="checkbox"/> Tierra	BIENES DE LA VIVIENDA	

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA	Adicional para el área rural	RESULTADO FINAL DE LA ENTREVISTA	OBSERVACIONES:
8. Escriba 1, 2, 3 ó 4 según corresponda a cada característica 1 Nula 3 Media 2 Baja 4 Alta 1.- Pavimentación de calles y banquetas _____ 2.- Alcantarillado _____ 3.- Alumbrado _____ 4.- Limpieza en calles _____ 5.- Presencia de contenedores _____ 6.- Cableado de teléfono _____ 7.- Presencia de jardines hornamentales _____ 8.- Presencia de unidades habitacionales _____ 9.- Presencia cercana de avenidas _____ 10.- Presencia cercana de carreteras _____ 11.- Presencia de casas individuales pequeñas muy juntas _____ 12.- Circulación de transporte público motorizado _____ 13.- Circulación de transporte público de tracción animal _____ 14.- Presencia cercana de escuelas públicas _____ 15.- Presencia cercana de escuelas privadas _____	16.- Tipo de actividad económica predominante observada _____ _____ Suministro de agua 1 Sí 2 No Consumo humano 17.- Pipas _____ 18.- Pozo _____ 19.- Río _____ 20.- Otro _____ especifique _____ Zona agrícola o ganadera 21.- Riego _____ 22.- Temporal _____ 23.- Otro _____ especifique _____	Tipo A 01 <input type="checkbox"/> Entrevista completa 02 <input type="checkbox"/> Nadie en el momento de la entrevista 03 <input type="checkbox"/> Ausente temporalmente 04 <input type="checkbox"/> Se negó a dar información de la TRH y CB 05 <input type="checkbox"/> Otro (vivienda ocupada) _____ especifique _____ B 06 <input type="checkbox"/> Desocupada adecuada para habitarse 07 <input type="checkbox"/> Desocupada inadecuada para habitarse 08 <input type="checkbox"/> Desocupada en construcción 09 <input type="checkbox"/> Desocupada, usada temporalmente para negocio o almacenaje C 10 <input type="checkbox"/> Demolida 11 <input type="checkbox"/> Tienda de campaña, trailer, casa móvil cambiada de sitio 12 <input type="checkbox"/> Negocio o almacén permanente 13 <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____ D 14 <input type="checkbox"/> No se encontró a la persona elegida 15 <input type="checkbox"/> El elegido se negó a dar información 16 <input type="checkbox"/> Elegido incapacitado para dar información	Nombre del entrevistador: _____ Nombre del supervisor: _____ Nombre del crítico-codificador: _____ OBSERVACIONES: _____ _____ _____

ANEXO 6

CUESTIONARIO DE ADICCIONES

D.R. © 2002 Cuestionario. Encuesta Nacional de Adicciones 2002 (ENA 2002)
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"
Calzada México-Xochimilco Núm. 101,
Colonia San Lorenzo Huipulco, 14370,
Deleg. Tlalpan, México, D.F.

Impreso en México

MIGRACIÓN

A1. ¿Habla usted algún otro idioma que no sea español?

- ① Si → Pase a preg. A2
- ② No → Pase a preg. A4

A2. ¿Cuál(es)?

- ① Indígena _____ Especifique
- ② Inglés _____
- ③ Francés _____
- ④ Otro _____ Especifique

A3. Cuando usted habla con alguien de su familia (esposo(a), hijo(a), mamá, papá, ¿Qué idioma utiliza?

- ① Usualmente en otro idioma
- ② Usualmente en español
- ③ Ambos con misma frecuencia

A4. ¿En qué país nació usted?

- ① México → Salte a preg. A6
- ② Otro _____ → Pase a preg. A5
Especifique

A5. ¿Cuántos años tenía cuando vino a establecerse en este país?

- _____ AÑOS } Salte a preg. A8
- ⑨ No sabe }

A6. ¿Nació usted en esta ciudad o localidad?

- ① Si → Salte a preg. A8
- ② No → Pase a preg. A7

A7. ¿Cuántos años tenía cuando vino a vivir a esta ciudad o localidad?

- _____ AÑOS } Pase a preg. A8
- ⑨ No sabe }

A8. ¿Sus papás nacieron en este país?

- ① Si, ambos
- ② Si, sólo mi papá
- ③ Si, sólo mi mamá
- ④ Ninguno de los dos
- ⑨ No sabe

A9. ¿Usted ha ido alguna vez a Estados Unidos?

- ① Si → Pase a preg. A10
- ② No → Pase a preg. A12

A10. ¿Cuál ha sido el motivo principal de sus viajes?

- ① Trabajo
- ② Estudios
- ③ Vacaciones
- ④ Otro _____ Especifique

A11. En total (sin contar vacaciones o viajes rápidos): ¿Cuánto tiempo ha permanecido en los Estados Unidos?

- ① Menos de un año
- ② Entre uno y tres años
- ③ Más de tres años
- ④ No sabe

A12. ¿Cómo considera su situación económica?

- ① Muy mala
- ② Mala
- ③ Regular
- ④ Buena
- ⑤ Muy buena

A13. ¿Hasta qué edad vivió con sus padres biológicos?

- ① Padre _____ años
- ② Madre _____ años
- ③ Aún vive con ambos
- ④ Nunca vivió con ellos

TABACO	
1. ¿Ha fumado tabaco alguna vez en su vida? ① Si → Pase a preg. 2 ② No → Salte a preg. 15	□
2. ¿Cuántos años tenía cuando fumó tabaco o cigarrillos por primera vez? ↓ Edad _____	□ □
3. En toda su vida ¿Ha fumado más de 100 cigarros, es decir, 5 cajetillas? ↓ ① Si ↓ ② No	□
4. En los últimos 12 meses, ¿Ha fumado tabaco? ① Si → Pase a preg. 5 ② No → Salte a preg. 14	□
5. En los últimos 30 días, ¿Ha fumado tabaco? ① Si → Pase a preg. 6 ② No → Salte a preg. 8	□
6. Aproximadamente, ¿Cuántos cigarrillos ha fumado diariamente en los últimos 30 días? ↓ ① No fuma diario ↓ ② De 1 a 5 ↓ ③ De 6 a 10 ↓ ④ De 11 a 20 ↓ ⑤ Más de 20	□
7. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su primer cigarro? (Marque solo una opción) ↓ ① Los primeros 5 minutos ↓ ② Entre 5 y 30 minutos ↓ ③ Entre 31 y 60 minutos ↓ ④ Más de 1 hora	□
8. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a fumar tabaco diariamente? ↓ ① Si Edad _____ ↓ ② No Nunca ha fumado a diario	□ □

9. ¿Fuma usted más durante las primeras horas del día que durante el resto del día? ① Si ② No ③ Ya no fuma → Salte a preg. 14 <div style="margin-left: 100px;">] Pase a preg. 10 </div>	□
10. Sería difícil para usted abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? (Iglesias, bibliotecas, cines, secciones de no fumar en restaurantes u oficinas) ↓ ① Si ↓ ② No	□
11. De los cigarros que fuma durante el día ¿Cuál sería el más difícil de dejar para usted? (Marque una sola opción) ↓ ① El primero de la mañana ↓ ② El de después de comer ↓ ③ Cuando está bajo tensión ↓ ④ El del baño ↓ ⑤ El de antes de dormir ↓ ⑥ Algún otro ↓ ⑦ Todos	□
12. Cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ¿Usted fuma? ↓ ① Si ↓ ② No	□
13. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar? ① Si ② No <div style="margin-left: 100px;">] Salte a preg. 15 </div>	□
14. ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar? ↓ _____ Meses años	□ □ □ □
15. De las personas que viven con usted, ¿Cuántos de ellos fuman? (Dé su mejor aproximación) ↓ _____ Núm. de personas	□ □ □

ALCOHOL

"Ahora le haré algunas preguntas relacionadas con las bebidas alcohólicas"

16. ¿Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol?

- ① Si → Salte a pregunta 18
- ② No → Pase a pregunta 17

17. ¿Por qué razón nunca ha consumido bebidas que contengan alcohol?
(Marque una sola opción)

- ① Porque no se acostumbra en casa
- ② Por religión
- ③ Por miedo a tener un problema
- ④ Porque no le llama la atención
- ⑤ Otro _____ Especifique
- Salte a preg. 42

18. ¿En los últimos 12 meses tomó alguna bebida que contenga alcohol? (cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, coolers, presidencola, etc.)

- ① Si → Salte a pregunta 18b
- ② No → Pase a pregunta 18a

18a. ¿Dejó de tomar por haber tenido algún problema con su forma de beber?

- ① Si
- ② No
- Salte a pregunta 42

18b. ¿Con que frecuencia tomó alguna bebida que contenga alcohol en los últimos 12 meses?

- 01 A diario
- 02 Casi diario (5 a 6 veces por semana)
- 03 3-4 veces a la semana
- 04 1-2 veces a la semana
- 05 2-3 veces al mes
- 06 Una vez al mes
- 07 7-11 veces al año
- 08 3-6 veces al año
- 09 2 veces al año
- 10 Una vez al año
- 11 Menos de una vez al año

19. Cuando toma bebidas alcohólicas como vino, cerveza, destilados, coolers, etc., generalmente, ¿Cuántas copas toma usted en cada ocasión o por día?

↓ _____

Anote Núm. de Copas

20. Durante el año pasado ¿Con qué frecuencia tomó?:

1) Vino de mesa? 2) Cooler, Q-bitas, etc? 3) Cerveza? 4) Brandy tequila, ron? 5) Pulque? 6) Alcohol puro, aguardiente?

A) 5 ó más copas de...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B) 3 ó 4 copas de...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C) 1 a 2 copas de...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A diario 01 | 1 ó 2 veces a la semana 04 | De 7 a 11 veces al año 07 | Una vez al año 10 |
| Casi a diario (5 a 6 veces por semana).....02 | 2 a 3 veces al mes 05 | De 3 a 6 veces al año 08 | Menos de una vez al año 11 |
| 3 a 4 veces a la semana 03 | Una vez al mes 06 | 2 veces al año 09 | Nunca 12 |
| | | | NS,NR 99 |

Piense en todas las diferentes clases de bebidas alcohólicas mezcladas, es decir, cualquier combinación de latas, botellas o vasos de cerveza, vino o bebidas conteniendo licor, de cualquier clase

21. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES ¿Cuál es el mayor número de copas que usted ha bebido en un solo día?

- ① 24 ó más copas en un solo día
- ② 12 a 23 copas en un solo día
- ③ 8 a 11 copas en un solo día
- ④ 5,6 ó 7 copas en un solo día
- ⑤ 3 ó 4 copas en un solo día
- ⑥ 1 ó 2 copas en un solo día
- ⑦ No sabe
- Pase a 22A
- Salte a 22B
- Salte a 22C
- Salte a 22D
- Salte a 22E
- Pase a 22A

22. ¿Con qué frecuencia ha tomado...

	PREGUNTA				
	22A 12 ó + copas	22B 8 a 11 copas	22C 5 a 7 copas	22D 3 a 4 copas	22E 1 a 2 copas
A. A diario?	1	1	1	1	1
B. Casi a diario (5 ó 6 veces por semana)?	2	2	2	2	2
C. De tres a cuatro veces a la semana?	3	3	3	3	3
D. De una o dos veces a la semana?	4	4	4	4	4
E. De dos a tres veces al mes?	5	5	5	5	5
F. Una vez al mes?	6	6	6	6	6
G. De siete a once veces al año?	7	7	7	7	7
H. De tres a seis veces al año?	8	8	8	8	8
I. Dos veces en el año?	9	9	9	9	9
J. Una sola vez en el año?	10	10	10	10	10
K. Menos de una vez al año?	11	11	11	11	11
L. Nunca en el año pasado?	12	12	12	12	12

A continuación se mencionan algunas de las experiencias que muchas personas han reportado en relación con el consumo de alcohol. ¿Puede hacer el favor de decirme si ha tenido esta(s) experiencia(s) cuando ha tomado alcohol? En los últimos 12 meses:

23. ¿Descubrió que la misma cantidad de bebidas alcohólicas tenían mucho menos efecto que antes?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
23a. ¿Descubrió que necesitaba una copa para no tener temblores o para no enfermarse?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
23b. ¿Se enfermó o vomitó después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
23c. ¿Estaba deprimido(a), irritable o nervioso(a) después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
23d. ¿Vió, sintió, o escuchó cosas que en realidad no se encontraban ahí cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
23e. ¿Tuvo ataques o convulsiones cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
24. ¿Algunas veces su deseo por una copa es muy fuerte?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	

24a. ¿Se mantuvo tomando bebidas alcohólicas aunque sabía que tenía un problema de salud causado o empeorado por andar bebiendo?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
24b. ¿Se mantuvo tomando bebidas alcohólicas a pesar de que sentía que el beber le estaba causando problemas psicológicos o emocionales?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
25. ¿Ha tenido que dejar o reducir trabajo importante o actividades sociales debido a su gusto por las bebidas alcohólicas?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
25a. ¿Ha tenido que dejar o rechazar placeres o intereses por favorecer el tomar bebidas alcohólicas?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
26. ¿Empezó a tomar y fue difícil parar antes de sentirse completamente embriagado(a)?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
27. ¿Algunas veces ha continuado tomando a pesar de haberse prometido a sí mismo (a) no hacerlo?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
28. ¿Ha tratado de reducir el número de copas y/ o las veces que bebe pero no ha podido?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
29. ¿Alguna vez comenzó a tomar bebidas alcohólicas a pesar de que no tenía la intención de hacerlo?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	
30. ¿Una y otra vez ha querido disminuir o dejar de tomar bebidas alcohólicas?	<input type="checkbox"/>
↓ ① Si ↓ ② No	

<p>31. ¿Ha pasado mucho de su tiempo tomando bebidas alcohólicas o reponiéndose de los efectos de la bebida o haciendo cosas para obtener alcohol?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>32. ¿Ha tenido una enfermedad del hígado o hepatitis?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>33. ¿Ha tenido una enfermedad del estómago o sangre al vomitar?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>34. ¿Ha tenido hormigueo o entumecimiento en los pies?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>35. ¿Ha tenido problemas de memoria aun cuando no estaba bebiendo?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>36. ¿Ha tenido pancreatitis?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>37. ¿Tuvo problemas con las autoridades mientras consumía bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo?</p> <p>① Si → Pase a la preg. 37a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a la preg. 38 <input type="checkbox"/></p>
<p>37a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>38. ¿Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas?</p> <p>① Si → Pase a la preg. 38a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a la preg. 39 <input type="checkbox"/></p>
<p>38a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p><i>Si no trabaja o nunca ha trabajado salte a la preg. 40</i></p>

<p>39. Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida?</p> <p>① Si → Pase a preg. 39a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 40 <input type="checkbox"/></p>
<p>39a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si el entrevistado no tiene pareja Salte a pregunta 41</i></p>
<p>40. ¿Comenzó una discusión o pelea con su esposo (a) compañero (a) cuando estuvo tomando?</p> <p>① Si → Pase a preg. 40a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 41 <input type="checkbox"/></p>
<p>40a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓ ① Si <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② No <input type="checkbox"/></p>
<p>41. En los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia consumió bebidas alcohólicas en alguno de los siguientes lugares?</p> <p>41a. Casa (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② Al menos una vez al mes <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ③ Al menos una vez en el último año <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ④ Nunca en el último año <input type="checkbox"/></p> <p>41b. Casa de otras personas (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② Al menos una vez al mes <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ③ Al menos una vez en el último año <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ④ Nunca en el último año <input type="checkbox"/></p> <p>41c. Restaurantes (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ② Al menos una vez al mes <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ③ Al menos una vez en el último año <input type="checkbox"/></p> <p>↓ ④ Nunca en el último año <input type="checkbox"/></p>

<p>41d. Bares/Antros con licencia para expender alcohol (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p>41e. Lugares sin licencia para expender alcohol (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p>41f. En la calle (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p>41g. En el trabajo (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
OPIÁCEOS	
<i>Ahora quisiera platicar con usted sobre el consumo de algunas otras sustancias.</i>	
<p>42. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...</p> <p>OPIÁCEOS: Para aliviar dolores fuertes, para evitar la tos, o para controlar la diarrea como la morfina, nubaín, darvon, demerol, roxanol, codeína, talwin, láudano, etc.?</p> <p>↓ ① Si → Pase a preg. 42a ② No ③ No sabe] Salte a preg. 43</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>42a. Dígame el nombre de los opiáceos que ha tomado, probado o usado</p> <p>↓ _____ _____ _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>42b. ¿Alguno de estos opiáceos se los recetó un doctor?</p> <p>① Si → Pase a preg. 42c ② No → Salte a preg. 42e</p>	<input type="checkbox"/>
<p>42c. ¿Tomó los opiáceos en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>42c1. ¿Tomó los opiáceos por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>42c2. ¿Tomó los opiáceos por una razón diferente a la que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Entrevistador: Si en cualquiera de las preguntas 42c, 42c1, 42c2, la persona seleccionada contestó sí, pase a la pregunta 42d; si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 43</i></p>	

42d. ¿Cuál fue la razón por la que tomó los opiáceos en mayor cantidad o por más tiempo de lo que le indicó el doctor?
(Marque una sola opción)

1 Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar

2 Porque al tomarla se sentía "muy bien"

3 No sabe cual fué la razón

42e. ¿Qué edad tenía cuando usó opiáceos por primera vez?

↓ Edad _____

42f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado los opiáceos?
(Marque una sola opción)

1 1-2 veces

2 3-5 veces

3 6-10 veces

4 11-49 veces

5 50 o más

42g. ¿Cuándo fué la última vez que usó los opiáceos?
(Marque una sola opción)

1 Hoy Pase a preg. 42h

2 En el último mes

3 En el último año

4 Hace más de un año Salte a preg. 42i

5 No sabe

42h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado opiáceos?

↓ _____ días

42i. ¿Cómo obtuvo ese(os) opiáceo(s), sustancia(s) o producto(s) que consumió?
(Marque una sola opción)

1 De un médico

2 En la calle

3 En la casa

4 De un amigo

5 Otro _____
Especifique

TRANQUILIZANTES

43. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...

TRANQUILIZANTES: Que se utilizan para calmar a las personas, calmar los nervios o relajar sus músculos como Librium, Valium, Diazepam, Ativan, Rohypnol, etc.?

1 Si → Pase a preg. 43a

2 No

3 No sabe Salte a preg. 44

43a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado

↓ _____

43b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se los recetó un doctor?

1 Si → Pase a preg. 43c

2 No → Salte a preg. 43e

<p>43c. ¿Tomó los tranquilizantes en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ↓ ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43c1. ¿Tomó los tranquilizantes por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ↓ ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43c2. ¿Tomó los tranquilizantes por una razón diferente a la que le indicó el doctor?</p> <p>↓ ① Si ↓ ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Entrevistador: Si en cualquiera de las preguntas 43c, 43c1, 43c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 43d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 44</p>	
<p>43d. ¿Cuál fue la razón por la que lo(s) tomó en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor? (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar ↓ ② Porque al tomarlos se sentía "muy bien" ↓ ③ No sabe cual fue la razón</p>	<input type="checkbox"/>

<p>43e. ¿Qué edad tenía cuando usó los tranquilizantes por primera vez?</p> <p>↓ Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado tranquilizantes? (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① 1-2 veces ↓ ② 3-5 veces ↓ ③ 6-10 veces ↓ ④ 11-49 veces ↓ ⑤ 50 o más</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43g. ¿Cuándo fué la última vez que usó tranquilizantes? (Marque una sola opción)</p> <p>① Hoy ② En el último mes ③ En el último año ④ Hace más de un año ⑤ No sabe</p> <p style="text-align: right;">] Pase a preg. 43h] Salte a preg. 43i</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado tranquilizantes?</p> <p>↓ _____ Días</p>	<input type="checkbox"/>
<p>43i. ¿Cómo obtuvo ese(os) tranquilizantes, sustancia(s) o producto(s) que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓ ① De un médico ↓ ② En la calle ↓ ③ En la casa ↓ ④ De un amigo ↓ ⑤ Otro _____ especifique</p>	<input type="checkbox"/>

SEDANTES Y BARBITÚRICOS

44. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...

SEDANTES Y BARBITÚRICOS: Para ayudar a las personas a dormir o a relajarse como los barbitúricos, equanil, mandrax, sevenal, sopor, etc.?

① Si → Pase a preg. 44a

② No }
③ No sabe } Salte a preg. 45

44a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado

↓ _____

↓ _____

↓ _____

44b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se las recetó un doctor?

① Si → Pase a pregunta 44c

② No → Salte a pregunta 44e

44c. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?

↓ ① Si
② No

44c1. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos por más tiempo de lo que le indicó el doctor?

↓ ① Si
② No

44c2. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos por una razón diferente a la que le indicó el doctor?

↓ ① Si
② No

Entrevistador: Si en cualquiera de las preguntas 44c, 44c1, 44c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 44d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 45

44d. ¿Cuál fue la razón por la que tomó los sedantes y barbitúricos en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor?

(Marque una sola opción)

↓ ① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar
② Porque al tomarlos se sentía "muy bien"
③ No sabe cual fue la razón

44e. ¿Qué edad tenía cuando usó los sedantes y barbitúricos por primera vez?

↓ Edad _____

44f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado los sedantes y barbitúricos?

(Marque una sola opción)

↓ ① 1-2 veces
② 3-5 veces
③ 6-10 veces
④ 11-49 veces
⑤ 50 ó más

44g. ¿Cuándo fue la última vez que usó los sedantes y barbitúricos?
(Marque una sola opción)

1 Hoy
 2 En el último mes
 3 En el último año
 4 Hace más de un año
 9 No sabe

Pase a preg. 44h
 Salte a preg. 44i

[]

44h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado sedantes y barbitúricos?

↓ _____ Días

[] []

44i. ¿Cómo obtuvo ese(os) sedantes y barbitúricos que consumió?
(Marque una sola opción)

1 De un médico
 2 En la calle
 3 En la casa
 4 De un amigo
 5 Otro _____
 Especifique

[]

ANFETAMINAS

45. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...

ANFETAMINAS O ESTIMULANTES: Para ayudar a perder peso o dar a la gente más energía como Benzedrina, Aktedron, Esbelcaps, etc.?

1 Si → Pase a preg. 45a
 2 No
 9 No sabe → Salte a preg. 46

[]

45a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado

↓ _____

↓ _____

↓ _____

[] [] []
[] [] []
[] [] []

45b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se los recetó un doctor?

1 Si → Pase a pregunta 45c
 2 No → Salte a pregunta 45e

[]

45c. ¿Tomó las anfetaminas en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?

1 Si
 2 No

[]

45c1. ¿Tomó las anfetaminas por más tiempo de lo que le indicó el doctor?

1 Si
 2 No

[]

45c2. ¿Tomó las anfetaminas por una razón diferente a la que le indicó el doctor?

1 Si
 2 No

[]

Entrevistador: Si en cualquiera de las preguntas 45c, 45c1, 45c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 45d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 46

<p>45d. ¿Cuál fue la razón por la que tomó anfetaminas en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor?</p> <p> <input type="radio"/> 1 Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar <input type="radio"/> 2 Porque al tomarlos se sentía "muy bien" <input type="radio"/> 3 No sabe cual fue la razón </p>	<input type="checkbox"/>
<p>45e. ¿Qué edad tenía cuando usó las anfetaminas por primera vez?</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>45f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado anfetaminas?</p> <p> <input type="radio"/> 1 1-2 veces <input type="radio"/> 2 3-5 veces <input type="radio"/> 3 6-10 veces <input type="radio"/> 4 11-49 veces <input type="radio"/> 5 50 o más </p>	<input type="checkbox"/>
<p>45g. ¿Cuándo fue la última vez que usó anfetaminas?</p> <p> <input type="radio"/> 1 Hoy <input type="radio"/> 2 En el último mes <input type="radio"/> 3 En el último año <input type="radio"/> 4 Hace más de un año <input type="radio"/> 9 No sabe </p> <p style="margin-left: 150px;"> Pase a preg.45h Salte a preg.45i </p>	<input type="checkbox"/>
<p>45h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado anfetaminas?</p> <p>_____ días</p>	<input type="checkbox"/>

<p>45i. ¿Cómo obtuvo las anfetaminas, que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p> <input type="radio"/> 1 De un médico <input type="radio"/> 2 En la calle <input type="radio"/> 3 En la casa <input type="radio"/> 4 De un amigo <input type="radio"/> 5 Otro _____ Especifique </p>	<input type="checkbox"/>
MARIGUANA	
<p>46. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado o probado...</p> <p>MARIGUANA, HASHISH: También llamada "mota", "churro", etc.?</p> <p> <input type="radio"/> 1 Sí → Pase a preg. 46a <input type="radio"/> 2 No <input type="radio"/> 9 No sabe </p> <p style="margin-left: 150px;">Salte a preg. 47</p>	<input type="checkbox"/>
<p>46a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>46b. ¿Cómo la ha usado? (Marque las opciones indicadas)</p> <p> <input type="radio"/> 1 Fumada <input type="radio"/> 2 Inhalada <input type="radio"/> 3 Inyectada <input type="radio"/> 4 Tomada, tragada <input type="radio"/> 5 Untada u otra forma NO como droga <input type="radio"/> 9 No sabe </p> <p style="margin-left: 150px;"> Pase a preg. 46c Salte a preg. 47 Pase a preg. 46c </p>	<input type="checkbox"/>

<p>46c. ¿Qué edad tenía cuando la(los) usó por primera vez?</p> <p>↓ Edad _____</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>46d. ¿Cuántas veces en su vida la(los) ha usado? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="text"/>
<p>46e. ¿Cómo obtuvo esa(s) sustancia(s) o producto(s) que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle</p> <p>② En la casa</p> <p>③ De un amigo</p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>	<input type="text"/>
<p>46f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esas sustancias? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez</p> <p>② Diario</p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana</p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes</p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año</p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>	<input type="text"/>
<p>46g. ¿Cuándo fue la última vez que la (los) usó?</p> <p>① Hoy <input type="checkbox"/> Pase a preg. 46h</p> <p>② En el último mes <input type="checkbox"/></p> <p>③ En el último año <input type="checkbox"/></p> <p>④ Hace más de un año <input type="checkbox"/> Salte a preg. 47</p> <p>⑤ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="text"/>

<p>46h. En el último mes ¿Cuántos días la (los) ha consumido, tomado o usado?</p> <p>↓ _____ días</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
COCAÍNA	
<p>47. ¿Me podría decir si alguna vez ha tomado, usado, probado...</p> <p>COCAÍNA EN POLVO : También llamada "perico", "nieve", "grapa", etc.?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/> Pase a preg. 47a</p> <p>② No <input type="checkbox"/> Salte a preg. 48</p> <p>③ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="text"/>
<p>47a. ¿Cómo la ha usado? (Marque las opciones indicadas)</p> <p>↓</p> <p>① Fumada</p> <p>② Inhalada</p> <p>③ Inyectada</p> <p>④ Tomada, tragada</p> <p>⑤ Otra _____ Especifique</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>47b. ¿Qué edad tenía cuando probó por primera vez la cocaína?</p> <p>↓ _____ Edad</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>47c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado cocaína?</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="text"/>

<p>47d. ¿Cómo obtuvo esa cocaína que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle</p> <p>② En la casa</p> <p>③ De un amigo</p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>47e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido la cocaína? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez</p> <p>② Diario</p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana</p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes</p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año</p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>47f. ¿Cuándo fue la última vez que usó cocaína?</p> <p>① Hoy <input type="checkbox"/> Pase a preg. 47g</p> <p>② En el último mes <input type="checkbox"/></p> <p>③ En el último año <input type="checkbox"/></p> <p>④ Hace más de un año <input type="checkbox"/> Salte a preg. 48</p> <p>⑤ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>
<p>47g. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado cocaína en polvo?</p> <p>↓ _____ días</p>	<input type="checkbox"/>

PASTA DE COCAÍNA	
<p>48. ¿Me podría decir si alguna vez ha tomado, usado, probado...</p> <p>PASTA DE COCAÍNA ?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/> Pase a preg. 48a</p> <p>② No <input type="checkbox"/> Salte a preg. 49</p> <p>③ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>
<p>48a. ¿Cómo la ha usado? (Marque las opciones indicadas)</p> <p>↓</p> <p>① Fumada</p> <p>② Inhalada</p> <p>③ Inyectada</p> <p>④ Tomada, tragada</p> <p>⑤ Otra _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>48b. ¿Qué edad tenía cuando usó por primera vez la pasta de cocaína?</p> <p>↓ Edad _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>48c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado la pasta de cocaína? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 ó más</p>	<input type="checkbox"/>

<p>48d. ¿Cómo obtuvo esa pasta de cocaína que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle ② En la casa ③ De un amigo ④ Otro _____ Especifíque</p>	<input type="checkbox"/>
<p>48e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido pasta de cocaína? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez ② Diario ③ Por lo menos 1 vez a la semana ④ Por lo menos 1 vez al mes ⑤ Por lo menos 1 vez al año ⑥ Otro _____ Especifíque</p>	<input type="checkbox"/>
<p>48f. ¿Cuándo fue la última vez que usó pasta de cocaína?</p> <p>① Hoy <input type="checkbox"/> Pase a preg. 48g ② En el último mes <input type="checkbox"/> ③ En el último año <input type="checkbox"/> ④ Hace más de un año <input type="checkbox"/> Salte a preg. 49 ⑤ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>
<p>48g. El último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado pasta de cocaína?</p> <p>↓ _____ días</p>	<input type="checkbox"/>

CRACK	
<p>49. ¿Me podría decir si alguna vez ha tomado, usado, probado...</p> <p>CRACK ?</p> <p>① Si <input type="checkbox"/> → Pase a preg. 49a ② No <input type="checkbox"/> Salte a preg. 50 ③ No sabe <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>
<p>49a. ¿Cómo lo ha usado? (Marque las opciones indicadas)</p> <p>↓</p> <p>① Fumado ② Inhalado ③ Inyectado ④ Tomado, tragado ⑤ Otra _____ Especifíque</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>49b. ¿Qué edad tenía cuando usó crack por primera vez?</p> <p>↓ Edad _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>49c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado crack? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces ② 3-5 veces ③ 6-10 veces ④ 11-49 veces ⑤ 50 ó más</p>	<input type="checkbox"/>

49d. ¿Cómo obtuvo ese crack que consumió?
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle
② En la casa
③ De un amigo
④ Otro _____
Especifique

49e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido el crack?
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez
② Diario
③ Por lo menos 1 vez a la semana
④ Por lo menos 1 vez al mes
⑤ Por lo menos 1 vez al año
⑥ Otro _____
Especifique

49f. ¿Cuándo fue la última vez que usó crack?
(Marque una sola opción)

① Hoy } Pase a preg. 49g
② En el último mes }
③ En el último año }
④ Hace más de un año } Salte a preg. 50
⑤ No sabe }

49g. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado crack?

↓ _____ días

ALUCINÓGENOS

50. ¿Me podría decir si usted ha tomado, usado, probado...

ALUCINÓGENOS : Como hongos, peyote, mezcalina, LSD, PCP, etc. También llamados "ácidos", "champiñones", etc.?

① Si → Pase a preg. 50a
② No } Salte a preg. 51
③ No sabe }

50a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado

↓ _____

50b. ¿Cómo los ha usado?
(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumados
② Inhalados
③ Inyectados
④ Tomados, tragados
⑤ Otra _____
Especifique

50c. ¿Qué edad tenía cuando usó alucinógenos por primera vez?

↓ _____ edad

<p>50d. ¿Cuántas veces en su vida ha usado alucinógenos? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="checkbox"/>
<p>50e. ¿Cómo obtuvo eso(s) alucinógenos que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle</p> <p>② En la casa</p> <p>③ De un amigo</p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>50f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esta(s) sustancia(s)? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez</p> <p>② Diario</p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana</p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes</p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año</p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>50g. ¿Cuándo fue la última vez que usó alucinógenos? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑤ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">} Pase a preg. 50h</p> <p style="margin-left: 150px;">} Salte a preg. 51</p>	<input type="checkbox"/>
<p>50h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado alucinógenos? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="checkbox"/>

INHALABLES	
<p>51. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...</p> <p>INHALABLES: Como thinner, pegamento, pintura, gasolina, activo, sprays, etc. Llamados "chemos", "memos", para "elevarse"?</p> <p>↓</p> <p>① Si → Pase a preg. 51a</p> <p>② No</p> <p>③ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">} Salte a preg. 52</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>51b. ¿Cómo los ha usado?</p> <p>↓</p> <p>① Inhalados</p> <p>② Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51c. ¿Qué edad tenía cuando lo(s) usó por primera vez?</p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51d. ¿Cuántas veces en su vida lo(s) ha usado? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 ó más</p>	<input type="checkbox"/>

<p>51e. ¿Cómo obtuvo los inhalables que consumió? (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle</p> <p>② En la casa</p> <p>③ De un amigo</p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51f. ¿Con qué frecuencia ha probado usado o consumido inhalables (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez</p> <p>② Diario</p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana</p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes</p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año</p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51g. ¿Cuándo fue la última vez que usó inhalables (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑤ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">] Pase a preg. 51h</p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 52</p>	<input type="checkbox"/>
<p>51h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado inhalables?</p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="checkbox"/>

HEROÍNA	
<p>52. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...</p> <p>HEROÍNA, OPIO: También llamada "arpón", "ficción", la "H"?</p> <p>↓</p> <p>① Si → Pase a preg. 52a</p> <p>② No</p> <p>③ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 53</p>	<input type="checkbox"/>
<p>52a. Dígame el nombre del(os) producto(s) o sustancia(s) que ha tomado, probado o usado</p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>52b. ¿Cómo los ha usado? (Marque las opciones indicadas)</p> <p>↓</p> <p>① Fumado</p> <p>② Inhalado</p> <p>③ Inyectado</p> <p>④ Tomado, tragado</p> <p>⑤ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>52c. ¿Qué edad tenía cuando lo(s) usó por primera vez?</p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p>52d. ¿Cuántas veces en su vida lo(s) ha usado?</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 ó más</p>	<input type="checkbox"/>

52e. ¿Cómo obtuvo esa(s) sustancia(s) o producto(s) que consumió?
(Marque una sola opción)

1 En la calle
 2 En la casa
 3 De un amigo
 4 Otro _____
Especifique

52f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esa(s) sustancia(s)?
(Marque una sola opción)

1 Una sola vez
 2 Diario
 3 Por lo menos 1 vez a la semana
 4 Por lo menos 1 vez al mes
 5 Por lo menos 1 vez al año
 6 Otro _____
Especifique

52g. ¿Cuándo fue la última vez que lo(s) usó?

1 Hoy } Pase a preg. 52h
 2 En el último mes }
 3 En el último año } Salte a preg. 53
 4 Hace más de un año }
 9 No sabe }

52h. En el último mes ¿Cuántos días lo(s) ha consumido, tomado o usado?

_____ días

METANFETAMINAS:

53. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...

METANFETAMINAS: Como las tachas, el éxtasis o el cristal?

1 Si → Pase a preg. 53a
 2 No } Salte a preg. 54
 9 No sabe }

53a. Dígame el nombre de el (los) producto(s) o sustancia(s) que ha tomado, probado o usado

53b. ¿Cómo las ha usado?
(Marque las opciones indicadas)

1 Fumada
 2 Inhalada
 3 Inyectada
 4 Tomada
 5 Otra _____
Especifique

53c. ¿Qué edad tenía cuando usó metanfetaminas por primera vez?

Edad _____

53d. ¿Cuántas veces en su vida ha usado metanfetaminas?
(Marque una sola opción)

1 1-2 veces
 2 3-5 veces
 3 6-10 veces
 4 11-49 veces
 5 50 ó más

<p>53e. ¿Cómo obtuvo esas metanfetaminas que consumió?</p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle <input type="checkbox"/></p> <p>② En la casa <input type="checkbox"/></p> <p>③ De un amigo <input type="checkbox"/></p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>	
<p>53f. ¿Con qué frecuencia ha probado usado o consumido metanfetaminas?</p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez <input type="checkbox"/></p> <p>② Diario <input type="checkbox"/></p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana <input type="checkbox"/></p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes <input type="checkbox"/></p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año <input type="checkbox"/></p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>	
<p>53g. ¿Cuándo fue la última vez que usó metanfetaminas?</p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>① Hoy <input type="checkbox"/></p> <p>② En el último mes <input type="checkbox"/></p> <p>③ En el último año <input type="checkbox"/></p> <p>④ Hace más de un año <input type="checkbox"/></p> <p>⑤ No sabe <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 200px;">} Pase a preg. 53h</p> <p style="margin-left: 200px;">} Salte a preg. 54</p>	
<p>53h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado metanfetaminas?</p> <p>↓</p> <p>_____ días <input type="text"/></p>	
<p>54. ¿Ha consumido otro tipo de drogas?</p> <p>(Especifique cuales)</p> <p>↓</p> <p>① Si _____ <input type="checkbox"/></p> <p>② No _____ <input type="checkbox"/></p>	

<p>Entrevistador: Si el informante indicó haber consumido al menos un medicamento (sin prescripción médica), sustancia o producto de los mencionados anteriormente pase a la pregunta 55. Si nunca ha consumido salte a pregunta 72</p> <p>A continuación le mencionaré algunas de las experiencias que muchas personas han reportado en relación con el uso de drogas. Conforme yo lea cada una, ¿Puede hacer el favor de indicarme si ha tenido esta(s) experiencia(s) cuando ha usado drogas o medicamentos sin receta?</p>	
<p>55. ¿Ha tenido discusiones con su familia o amigos por consumir drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 55a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 56 <input type="checkbox"/></p>	
<p>55a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/></p> <p>② No <input type="checkbox"/></p>	
<p>56. ¿Ha tenido peleas por consumir drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 56a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 57 <input type="checkbox"/></p>	
<p>56a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/></p> <p>② No <input type="checkbox"/></p>	
<p>57. ¿Lo han arrestado o ha sido reprendido por la policía debido al uso de drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 57a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 58 <input type="checkbox"/></p>	
<p>57a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/></p> <p>② No <input type="checkbox"/></p>	
<p>58. ¿Ha tenido problemas en la escuela y/o en el trabajo por consumir drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 58a <input type="checkbox"/></p> <p>② No → Salte a preg. 59 <input type="checkbox"/></p>	
<p>58a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si <input type="checkbox"/></p> <p>② No <input type="checkbox"/></p>	

<p>59. ¿Ha tenido problemas económicos por el uso de drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 59a</p> <p>② No → Salte a preg. 60</p>	<input type="checkbox"/>
<p>59a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>60. ¿Ha usado alguna droga en tal forma que sintió que la necesitaba o dependía de ella?</p> <p>① Si → Pase a preg. 60a</p> <p>② No → Salte a preg. 61</p>	<input type="checkbox"/>
<p>60a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>61. ¿Alguna vez ha tratado de reducir el uso de alguna droga pero no ha podido?</p> <p>① Si → Pase a preg. 61a</p> <p>② No → Salte a preg. 62</p>	<input type="checkbox"/>
<p>61a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>62. ¿Alguna vez sintió que necesitaba mayor cantidad de droga para que le hiciera efecto?</p> <p>① Si → Pase a preg. 62a</p> <p>② No → Salte a preg. 63</p>	<input type="checkbox"/>
<p>62a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>63. ¿Alguna vez se ha sentido enfermo al disminuir o reducir el uso de cualquiera de éstas drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 63a</p> <p>② No → Salte a preg. 64</p>	<input type="checkbox"/>
<p>63a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>

<p>64. ¿Ha tenido malestar general, dolores abdominales o calambres al suspender el uso de alguna droga?</p> <p>① Si → Pase a preg. 64a</p> <p>② No → Salte a preg. 65</p>	<input type="checkbox"/>
<p>64a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>65. ¿Ha tenido problemas de salud como dolores de cabeza persistentes, convulsiones o infecciones como resultado del uso de drogas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 65a</p> <p>② No → Salte a preg. 66</p>	<input type="checkbox"/>
<p>65a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>66. ¿Ha sentido que su memoria o concentración son deficientes o que no puede pensar claramente?</p> <p>① Si → Pase a preg. 66a</p> <p>② No → Salte a preg. 67</p>	<input type="checkbox"/>
<p>66a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>67. ¿Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas?</p> <p>① Si → Pase a preg. 67a</p> <p>② No → Salte a preg. 68</p>	<input type="checkbox"/>
<p>67a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</p> <p>↓</p> <p>① Si</p> <p>② No</p>	<input type="checkbox"/>

68. ¿Se ha sentido muy nervioso o ansioso? ① Si → Pase a preg. 68a ② No → Salte a preg. 69	<input type="checkbox"/>
68a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
69. ¿Se ha sentido irritable o molesto? ① Si → Pase a preg. 69a ② No → Salte a preg. 70	<input type="checkbox"/>
69a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
70. ¿Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente? ① Si → Pase a preg. 70a ② No → Salte a preg. 71	<input type="checkbox"/>
70a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
71. ¿Ha necesitado ayuda médica de urgencia? ① Si → Pase a preg. 71a ② No → Salte a preg. 71b	<input type="checkbox"/>
71a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
71b. ¿Alguna vez deseó consumir droga tan desesperadamente que no podía pensar en nada más? ① Si → Pase a preg. 71c ② No → Salte a preg. 71d	<input type="checkbox"/>
71c. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
71d. ¿Continuó usando drogas aún después de saber que le causaba problemas emocionales? ① Si → Pase a preg. 71e ② No → Salte a preg. 72	<input type="checkbox"/>
71e. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses? ① Si ② No	<input type="checkbox"/>

72. En los últimos 12 meses, ¿Ha solicitado ayuda a alguna institución o persona, para consultar sobre problemas relacionados con su... ? 72a. Consumo de Tabaco ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido tabaco] Pase a preg. 72b a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Otros (parches, chicles, etc.)	<input type="checkbox"/>
72b. Consumo de Drogas ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido tabaco] Pase a preg. 72c a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Otros _____ Especifique	<input type="checkbox"/>
72c. Consumo de Bebidas Alcohólicas ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido tabaco] Pase a preg. 73 a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Grupo Alcohólicos Anónimos g Otros _____ Especifique	<input type="checkbox"/>
73. En su opinión ¿Qué tan grave es el uso de las siguientes drogas? 73a. Fumar cigarrillos (Marque una sola opción) ① Nada grave ② Poco grave ③ Bastante grave ④ Muy grave ⑤ No sabe	<input type="checkbox"/>

73b. Tomar bebidas alcohólicas frecuentemente (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73c. Embriagarse con bebidas alcohólicas (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73d. Tomar tranquilizantes/estimulantes alguna vez (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73e. Tomar tranquilizantes/estimulantes frecuentemente (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73f. Inhalar solventes alguna vez (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73g. Inhalar solventes frecuentemente (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73h. Fumar marihuana alguna vez (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73i. Fumar marihuana frecuentemente (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73j. Consumir cocaína alguna vez (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

73k. Consumir cocaína frecuentemente (Marque una sola opción)

1 Nada grave

2 Poco grave

3 Bastante grave

4 Muy grave

9 No sabe

74. ¿Se siente lo suficientemente informado sobre las consecuencias de las drogas (tabaco, alcohol, marihuana, pasta base, cocaína, etc.)? (Marque una sola opción)

1 Poco informado

2 Bien informado

3 Muy informado

75. ¿De dónde provienen principalmente sus conocimientos sobre las drogas?

(Marque una sola opción)

- ① Amigos
- ② Padres, familiares
- ③ Profesores
- ④ Profesionales
- ⑤ Periódicos
- ⑥ Televisión
- ⑦ Folletos
- ⑧ Experiencia propia

76. ¿Ha recibido cursos de prevención del consumo de drogas?

- ① No → Termine
 - ② Una vez
 - ③ Varias veces
-] Pase a
preg. 77

77. ¿Cómo calificaría estos cursos de prevención que recibió?

(Marque una sola opción)

- ① Muy útil
- ② Útil
- ③ Poco útil
- ④ Nada útil
- ⑤ No sabe

78. ¿Han cambiado estos cursos su actitud personal respecto a las drogas?

(Marque una sola opción)

- ① Me siento igualmente atraído(a) por las drogas
- ② Me siento menos atraído(a) por las drogas
- ③ Me siento igual, sin deseo de consumir drogas
- ④ Me siento fortalecido(a) en mi decisión

TERMINE

ANEXO 7

DEFINICIONES OPERACIONALES DE LA ENCUESTA

7.1. CONSUMO DE TABACO

Para fines de recopilación y análisis de información, en esta encuesta se considera al cigarrillo como la forma preferida de consumir tabaco para la mayoría de los fumadores del país.

Fumador

Individuo que al momento de la entrevista reporta fumar.

Exfumador

Individuo que al momento de la entrevista reporta no haber fumado en el último año, pero si antes con cualquier patrón de consumo.

No fumador

Individuo que nunca en su vida ha consumido cigarros.

Patrón de consumo

Fumador leve

Persona que consume una cantidad no superior a cinco cigarrillos en promedio por día.

Fumador moderado

Individuo que consume una cantidad de 6 a 15 cigarrillos en promedio por día.

Fumador severo o dependiente

Persona que consume una cantidad igual o mayor a 16 cigarrillos por día.

Fumador pasivo

Individuo no fumador expuesto involuntariamente al humo de tabaco. Se considera población no fumadora a la suma de individuos nunca fumadores y exfumadores.

Dependencia al consumo de tabaco

Se considera para su evaluación la escala propuesta por Fagerström. Sin embargo en estos resultados sólo se señalan a los indicadores principales para hablar de dependencia a la nicotina que son el de encender el primer cigarrillo del día dentro de los primeros cinco minutos después de levantarse y la cantidad de cigarrillos fumados por día.

7.2. CONSUMO DE ALCOHOL

Bebedor

Persona que ha tomado alcohol por lo menos en el último año.

Exbebedor

Persona que ha tomado alguna vez alcohol, pero que no lo ha vuelto a hacer en el último año.

Abstemio

Persona que nunca ha tomado alcohol o no lo hizo en el último año.

Frecuencia de consumo

Diario o casi diario

El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.

De 1 a 4 veces por semana

El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.

De 1 a 3 veces por mes
El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.

De 3 a 11 veces al año
El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.

De 1 a 2 veces al año
El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.

Abstemio: no bebió en el último año
Ver patrón de consumo en este mismo capítulo.

Abstemio: nunca ha bebido
Ver patrón de consumo en este mismo capítulo.

Consumo de bebidas

Pulque
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida por lo menos una copa de la bebida.

Cerveza
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Vino de mesa
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Destilados
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Coolers
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Aguardiente
El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Equivalencia de bebidas

Un trago o copa es igual a:

- 1 Lata o botella mediana de cerveza (330 ml)
- 1 Jarro o jícara de pulque de 500 ml
- 1 Vaso de 120 ml de vino de mesa
- Destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra
- 1 Vaso o copa de bebida con licor (30 ml)
- 1 Botella de coolers de vino (330 ml)
- 1 Copa "farolazo" (30ml)

Patrón de consumo

Abstemio
Nunca ha consumido alguna copa completa de alcohol.

No bebió en el último año
Ha consumido alcohol, pero no lo ha hecho en el último año.

Bebedor poco frecuente bajo
Consumió alcohol en el último año y nunca tomó 5 copas o más en una sola ocasión.

Bebedor poco frecuente alto

Consumió alcohol en el último año (sin incluir el último mes), bebiendo por lo menos cinco copas o más en una ocasión.

Bebedor moderado bajo

Consumió alcohol en el último mes y nunca tomó cinco copas o más en una sola ocasión.

Bebedor moderado alto

Consumió alcohol en el último mes o en el último año (sin incluir la última semana) bebiendo por lo menos cinco copas o más en una sola ocasión.

Bebedor frecuente de bajo nivel

Toma de una a cuatro copas por lo menos una vez a la semana, nunca toma cinco copas o más en una sola ocasión.

Bebedor frecuente de alto nivel

Toma alcohol por lo menos una vez a la semana y cuando toma de cinco copas o más por ocasión lo hace cuando mucho de una a tres veces por mes.

Consuetudinario

Toma diariamente y por lo menos una vez a la semana se toma cinco copas o o más copas en una sola ocasión.

Abuso/Dependencia al consumo de alcohol

Síntoma 1. Tolerancia

- Descubrió que la misma cantidad de bebidas alcohólicas tenían mucho menos efecto que antes.

Síntoma 2. Abstinencia

- Descubrió que necesitaba una copa para no tener temblores o para no enfermarse.
- Se enfermó o vomitó después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente.
- Estaba deprimido, irritable o nervioso después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente.
- Vio, sintió o escuchó cosas que en realidad no se encontraban ahí cuando los efectos del alcohol comenzaron a desaparecer.
- Tuvo ataques o convulsiones cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer.

Síntoma 3. Uso por más tiempo o en mayor cantidad

- Empezó a tomar y fue difícil parar antes de sentirse completamente embriagado.
- Algunas veces ha continuado tomando a pesar de haberse prometido a sí mismo no hacerlo.
- Ha tratado de reducir el número de copas y/o las veces que bebe pero no ha podido.
- Alguna vez comenzó a tomar bebidas alcohólicas a pesar de que no tenía la intención de hacerlo.
- Una y otra vez ha querido disminuir o dejar de tomar bebidas alcohólicas.

Síntoma 4. Deseo persistente/incapacidad de control

- Algunas veces su deseo por una copa es muy fuerte.

Síntoma 5. Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos.

- Ha pasado mucho de su tiempo tomando bebidas alcohólicas o reponiéndose de los efectos de la bebida o haciendo cosas para obtener alcohol.

Síntoma 6. Reducción de actividades sociales para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos

- Ha tenido que dejar o reducir trabajo importante o actividades sociales debido a su gusto por las bebidas alcohólicas.
- Ha tenido que dejar o rechazar placeres o intereses por favorecer el tomar bebidas alcohólicas.

Síntoma 7. Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos.

- Ha tenido una enfermedad del hígado o hepatitis.
- Ha tenido una enfermedad del estómago o sangre al vomitar.
- Ha tenido hormigueo o entumecimiento en los pies.
- Ha tenido problemas de memoria aún cuando no estaba bebiendo.
- Ha tenido pancreatitis.
- Continuó tomando bebidas alcohólicas aunque sabía que tenía un problema de salud causado o empeorado por beber.
- Continuó tomando bebidas alcohólicas a pesar de que sentía que el beber le estaba causando problemas psicológicos o emocionales.

En todos los casos, el síntoma debe estar presente en el último año. Para considerar a una persona como dependiente al consumo de alcohol, debe presentar por lo menos tres síntomas de los que se mencionan anteriormente.

Razones para no beber

Se encuentra definida por las opciones:

- Porque no se acostumbra en casa.
- Por religión.
- Por miedo a tener un problema.
- Porque no le llama la atención.
- Otra.

7.3. CONSUMO DE DROGAS

El sujeto debe señalar que consume cualquiera de las sustancias indicadas en el cuestionario. En el caso de las drogas médicas, el consumo debe ser fuera de prescripción, o en mayor medida o por más tiempo a lo señalado por el médico.

Drogas médicas

El sujeto debe señalar que ha consumido uno o más de los siguientes tipos de drogas: opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Ese consumo debió de realizarse fuera de prescripción, es decir: en mayor medida de la indicada, por más tiempo del prescrito o una razón diferente por la que fue recetado.

Drogas ilegales

El sujeto debe señalar que ha consumido alguna de las siguientes drogas: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o metanfetaminas.

Centro de Orientación Telefónica
01 800 911 2000
www.conadic.gob.mx

