



Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados por entidad federativa

SALUD

Distrito Federal



Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados por entidad federativa, Distrito Federal

Encuesta Nacional
de **Adicciones**
2008

Resultados por entidad federativa

Distrito Federal

Encuesta Nacional de Adicciones 2008, **Resultados por entidad federativa, Distrito Federal**

Primera edición, 2009

D.R. © Instituto Nacional de Salud Pública
Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatlán
62508 Cuernavaca, Morelos, México

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

ISBN: 978-607-7530-29-9

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 es un esfuerzo de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, en el cual participaron el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue responsable del operativo de campo y del diseño conceptual e interpretación de los datos de tabaco, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que tuvo a su cargo el diseño del cuestionario, la capacitación de los encuestadores, la supervisión de campo, el diseño conceptual y el análisis de las secciones de drogas y alcohol.

La encuesta se realizó con apoyo financiero de la Secretaría de Salud, así como con financiamiento adicional de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Embajada de los Estados Unidos para la supervisión de campo y análisis de datos.

Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Coordinación general

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

Coordinación técnica

Jorge A. Villatoro Velázquez
María Elena Medina-Mora Icaza
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Coordinación logística

Martha María Téllez-Rojo
Claudia Díaz Olavarrieta
Laura Mendoza Alvarado
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño conceptual

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

María Elena Medina-Mora Icaza
Jorge A. Villatoro Velázquez
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Diseño conceptual sección de tabaco

Eduardo Lazcano
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño logístico

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño y control muestral

Oswaldo Palma Coca
Isaac Sidhartha Salcedo Campos
Alaín López Condado
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación general drogas y alcohol

Clara Fleiz Bautista
Jorge A. Villatoro Velázquez
Francisco Juárez García
María Elena Medina-Mora Icaza
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Supervisión de práctica de capacitación

Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Michelle Bretón Cirett
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Vianney Sánchez Pineda
Elsa Nancy Magaña Méndez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Miguel Ángel López Brambila
María Estela Rojas Guiot
Lianed Gaytán López
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Levantamiento de campo

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Supervisión de trabajo de campo

Clara Fleiz Bautista
Vianney Sánchez Pineda
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Elsa Nancy Magaña Méndez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Miguel Ángel López Brambila
Michelle Bretón Cirett
Midiam Moreno López
María Estela Rojas Guiot
Lianed Gaytán López
Jorge A. Villatoro Velázquez
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Desarrollo de sistemas y bases de datos

Oswaldo Palma Coca
Alaín López Condado
Daniel Acosta Vargas
Francisco Javier Carlos Rivera
Isaac Sidhartha Salcedo Campos
Claudia Irene Larracilla Camacho
Instituto Nacional de Salud Pública

Análisis estadístico de drogas y alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Jerónimo Blanco Jaimés
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Elaboración del reporte de drogas y alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
María Elena Medina-Mora Icaza
Clara Fleiz Bautista
Patricia Cravioto
Ma. de Lourdes Gutiérrez López
Midiam Moreno López
Nieves Quiroz del Valle
Mario Cortés
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Carlos Rodríguez Ajenjo
Consejo Nacional contra las Adicciones

Elaboración del reporte de tabaco

Eduardo Lazcano
Instituto Nacional de Salud Pública

Reporte metodológico

Martha María Téllez-Rojo
Claudia Díaz Olavarrieta
Juan Pablo Gutiérrez
Oswaldo Palma Coca
Instituto Nacional de Salud Pública

Clasificación de sustancias psicoactivas

Mario Gómez
Arturo Ortiz
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Consejo asesor

Guilherme Borges Guimaraes
Guillermina Natera Rey
Patricia Cravioto
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Rafael Lozano
Patricia Nilda Soliz
Dirección General de Información en Salud

Víctor Guiza
Ricardo Sánchez Huesca
Centros de Integración Juvenil

Carlos Magis
CENSIDA

Contenido

Prólogo	11
Presentación	13
Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en el Distrito Federal	15
Método	17
Tabaco	23
Principales resultados	24
Conclusiones	30
Drogas	31
Principales resultados	32
Conclusiones	34
Alcohol	35
Principales resultados	36
Conclusiones	37
Referencias	40
Glosario	41
Anexos	45
A. Drogas	46
Resultados del estado	46
Intervalos de confianza	59
B. Alcohol	63
Resultados estatales	63
Intervalos de confianza	69
C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas	70

La información confiable y oportuna es una de las herramientas más valiosas para la toma de decisiones, el diseño de programas y políticas públicas de atención y prevención y de apoyo en la definición de la normativa en materia de salud. En ella se apoya de manera sustantiva la gestión estratégica que busca atender de manera efectiva los problemas de salud de los mexicanos.

En la actualidad las adicciones son una prioridad a nivel global y nacional, que por su magnitud y consecuencias nos requiere estar bien informados para poder dirigir de manera precisa y contundente nuestros recursos y esfuerzos.

Las encuestas nacionales son una metodología muy útil a este fin y México tiene amplia experiencia en su realización, un ejemplo son las encuestas nacionales de adicciones (ENA) que se vienen realizando desde 1988, de las cuales la quinta y más reciente, la ENA 2008, se realizó entre los años 2007 y 2008. En ella destaca su diseño probabilístico polietápico, que ha permitido la representatividad nacional, urbano-rural, regional y ahora por entidad federativa. Luego de presentar el reporte de la ENA 2008 con los datos nacionales, establecimos el compromiso de difundir en breve las estadísticas estatales, que por primera ocasión permitirán conocer en forma específica para cada estado el comportamiento de las adicciones.

Con las ENA hemos podido conocer más acerca de la magnitud y distribución de las adicciones; identificar algunas variables a las cuales se asocian más frecuentemente; generar hipótesis de investigación; contribuir en el conocimiento de su historia natural, así como evaluar medidas de control y detectar cambios en las prácticas médicas y de salud.

Estoy plenamente convencido de que el esfuerzo quedaría inacabado si la información generada en la Encuesta no llega a las manos de los gestores a nivel local y de los ciudadanos en general, en donde se vive de manera inmediata esta problemática. Tenemos la obligación de difundirla de manera que sirva para construir nuevos conocimientos que deban utilizarse no sólo para comprender y predecir, sino para modificar políticas, estrategias, programas y comportamientos, y como mecanismo para la movilización social de voluntades, recursos y la generación de compromisos. Ante la evidencia confiable, no existe duda.

A nivel nacional, la ENA 2008 muestra que el problema más importante en adicciones en México está en el abuso del consumo de

bebidas alcohólicas, con las graves consecuencias familiares, sociales y comunitarias, y en el uso de tabaco, arraigados ambos en muchas poblaciones, tanto rurales como urbanas, y que está cobrando víctimas en los jóvenes que se inician en su consumo a edades cada vez más tempranas.

En el caso de las drogas ilegales, en México se ha generado un mercado de consumidores similar al de algunos países europeos y de otros como Perú o Colombia, originando un daño cada vez mayor, tanto a la salud como a la armonía social y a la gobernabilidad. Las cifras muestran que cada vez existe mayor exposición al consumo y es mayor la facilidad con la que se consiguen las drogas entre los jóvenes.

Los resultados que presentamos para las 32 entidades federativas muestran que las adicciones son un problema generalizado, con sus especificidades dependiendo de variables como tipo de droga, intensidad, edad, sexo, residencia, etc., y que se deben tener presentes.

En general se destaca, en cuanto al consumo de tabaco, que 20.4% de la población urbana entre los 12 y los 65 años de edad son fumadores activos, en tanto que en las localidades rurales la proporción es de 11.3 por ciento. Para el caso del consumo de alcohol, fueron los estados del centro-occidente los de alto consumo, donde se ubican Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

Para el consumo de drogas ilegales y médicas, los datos de la medición mostraron que dos estados fronterizos tienen el mayor consumo, Quintana Roo en el sur y Tamaulipas en el norte, con una incidencia de 11.2 y 11.1 por ciento. Junto con ellos se ubican 12 entidades federativas más que registraron una incidencia acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre los 12 y los 65 años de edad, por arriba de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional.

De esta manera ponemos a disposición de la sociedad en general la información estatal de la ENA 2008, la cual es parte del esfuerzo sistematizado que la administración federal, a cargo del C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, está realizando, en coordinación con los gobiernos estatales, para enfrentar el problema de quienes consumen, abusan o ya dependen de las drogas, y disminuir sus graves consecuencias a través de la aplicación de políticas públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integran en una acción sinérgica todos los recursos disponibles de las institu-

ciones y están siendo una gran oportunidad para una responsabilidad social compartida, entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos.

La realización de la ENA 2008, coordinada por la Secretaría de Salud, fue posible gracias a la participación y compromiso de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Consejo Nacional contra las Adicciones, y a la colaboración de otras instancias como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Reconozco de la misma manera el destacado apoyo recibido por parte de las entidades federativas, organizaciones y personas que

hicieron posible la realización de la Encuesta, a los que han contribuido a su financiamiento y a los que difunden los resultados derivados de ella.

Las bases de datos estarán también disponibles para la sociedad en general, los tomadores de decisiones, los académicos, los investigadores, etc., esperando que el dato se convierta en conocimiento transformador, como lo expresara Sócrates hace ya muchos años: "Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores".

Dr. José Ángel Córdova Villalobos.
Secretario de Salud.

Presentación

En nuestro actual entorno social, el consumo de drogas juega un papel muy importante. Debido a ello, los esfuerzos de prevención deben enfocarse a fortalecer a los adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo con el desarrollo de habilidades (comunicación, resolución de conflictos, etc.). El Programa Nacional de Salud 2007-2012, en su búsqueda por mejorar las condiciones de salud de la población, tiene entre sus principales objetivos disminuir los niveles de consumo de drogas en la población, en donde los adolescentes y jóvenes tienen prioridad. Para el cumplimiento de esta tarea, se tiene el Programa contra las Adicciones, que integrado a las acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Atención de las Enfermedades, constituye una respuesta sin precedentes para revertir los crecientes índices de prevalencia de problemas de adicción.

El fenómeno del consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas legales o ilegales muestra una preocupante evolución. Sus principales indicadores revelan un incremento de las prevalencias de consumo, así como una disminución en las edades de inicio, principalmente para las drogas introductorias como el tabaco y el alcohol. Una de las metodologías más útiles para observar la evolución de este fenómeno es la realización de estudios transversales con encuestas de hogares que se realizan con periodicidad fijada de manera convencional en muestras representativas nacionales. Esto se ha venido desarrollando a través de la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones en sus versiones anteriores.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008) se realizó en hogares y, además de los valiosos resultados sobre el consumo y las actitudes de la población ante los diversos tipos de drogas, permite tener datos comparativos de dos ciclos de 10 años cada uno (1988-1998-2008), es decir, cuatro lustros de estudio del problema en los que se realizaron cinco encuestas mediante las que es posible observar con mejor precisión las modificaciones en las prevalencias nacionales. Por lo tanto, la ENA 2008 nos brinda información esencial para observar cómo evoluciona el proceso, para saber qué sustancias son las más utilizadas y por quién, a fin de planificar adecuadamente los programas y las acciones que en materia de adicciones debe realizar el gobierno en tanto autoridad rectora en la materia. Hay que resaltar que, debido al tipo de información que recoge, el desarrollo de esta Encuesta se topó con una serie de dificultades para su levantamiento, finalmente resueltas para poder alcanzar los resultados en el ámbito estatal que aquí se engloban.

En lo relacionado con el consumo de drogas, la ENA 2008 presenta un escenario de salud pública donde en los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la

oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50 por ciento. Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta los 18 y 20 años, respectivamente, para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo. La Encuesta ha logrado identificar las seis principales sustancias adictivas de mayor consumo en la población y que la oferta de sustancias que ha invadido al país se ha elevado considerablemente. El principal beneficio que los tomadores de decisiones obtienen con los datos que proporciona la ENA 2008 es que, en el escenario de la política de salud, la prevención, la detección oportuna y las intervenciones breves son las acciones que han demostrado ser más costo-efectivas para enfrentar el complejo problema de las adicciones.

La principal diferencia entre las encuestas anteriores y esta quinta consiste en la representatividad estatal, lo que permitirá a los estados iniciar un proceso de medición; es decir, un seguimiento de la prevalencia del consumo en la población al interior de cada entidad con base en un conteo metodológico bien estructurado.

La serie de resultados estatales de la ENA 2008 abre una nueva perspectiva en la salud pública y la epidemiología de las adicciones en cada una de las 32 entidades federativas del país. Además de que hoy se cuenta con información que permite supervisar y tomar decisiones en el ámbito estatal, se cubre un vacío de información que era necesaria para la instrumentación de acciones de intervención, prevención y promoción de ambientes saludables. De igual modo, la información que se incluye constituye una referencia básica para el desarrollo de programas de intervención adecuados a las necesidades de cada entidad federativa.

Contar con este tipo de herramientas metodológicas plantea también un reto a los sistemas de salud estatales, ya que éstas se convierten en el observatorio que mide, si bien transversalmente, los éxitos en la lucha contra el consumo de drogas. Igualmente se constituyen en el elemento básico para el tomador de decisiones en el proceso de evaluación. Los resultados por entidad federativa de la ENA 2008 son una contribución más al conocimiento en salud y se convierten en parte de la rendición de cuentas que hoy es compromiso fundamental del trabajo en salud pública, especialmente en lo referente al combate contra el abuso de las drogas.

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Secretaría de Salud

Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en el Distrito Federal

Nuestro país cuenta con una amplia experiencia acumulada en la investigación, de corte epidemiológica y psicosocial, sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco. Estas investigaciones se han llevado a cabo continuamente desde la década de los setentas con una misma metodología utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes para cada tipo de población estudiada, lo cual ha permitido conocer el panorama global que guarda dicho fenómeno en distintos escenarios, entre los cuales se encuentran los hogares, las escuelas y los centros de tratamiento. Asimismo, a través de estos esfuerzos en investigación se han identificado, en estos escenarios, los patrones de consumo, los grupos más vulnerables, las tendencias a lo largo del tiempo, las características sociodemográficas más importantes que predicen o protegen de dicho consumo, entre otros aspectos relevantes relacionados con el ámbito social de las adicciones (anexo C).

En este contexto, a continuación se muestran los resultados arrojados por estos estudios realizados en el país, como preámbulo y referencia de los resultados encontrados en esta entidad en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Es importante destacar que con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, por primera vez se cuenta con un informe para cada estado de la República, además de un reporte nacional para población rural y urbana de 12 a 65 años. En las encuestas nacionales previas (ENA 1988, 1993, 1998, 2002),¹⁻⁴ se obtuvieron datos regionales y nacionales; en las encuestas de 1988, 1993 y 1998 se obtuvieron datos con población urbana, y con la encuesta del 2002 se tuvieron datos para población rural y urbana.

En el caso específico del Distrito Federal, se tienen diferentes antecedentes en las encuestas nacionales de adicciones y sobre todo se ha hecho un seguimiento desde la década de los setenta en comunidad escolar. Hasta el momento se sabe que el Distrito Federal es una de las ciudades con mayor consumo de drogas en el país, principalmente de marihuana, a diferencia de la región norte del país, matizada por consumo de metanfetaminas al occidente, de heroína al centro y de crack al oriente.

Por lo que respecta a centros de tratamiento, se cuenta con amplia información derivada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA*) y de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Encuestas en estudiantes

El Distrito Federal cuenta con estudios en esta población desde 1976 y se realizan en forma trianual. Los resultados de la encuesta realizada en 2006 indicaron que la prevalencia total de consumo de drogas fue del 17.8%, porcentaje estadísticamente mayor al del 2003 en un 2.6%. Por sexo, los hombres son el subgrupo más afectado por el consumo actual (5.9%), en comparación con las mujeres (4.3%). Asimismo, el consumo de cualquier droga, alguna vez en la vida, es mayor para los hombres (19.1%). Por tipo de sustancia, la marihuana (8.8%) ocupa el primer lugar de preferencia por los/as adolescentes y le sigue el consumo de inhalables (6.7%), el de tranquilizantes (4.9%) y el de cocaína (3.3%).⁵

Es importante mencionar que las drogas médicas (tranquilizantes y anfetaminas), las consumen más las mujeres (8.2%) que los hombres (6.7%); en tanto que las drogas ilegales (marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína) las consumen más los hombres (16.2%) que las mujeres (11.7%).

* Para la recolección de información el SISVEA se basa en el "reporte de eventos" de aquellas personas que han acudido a distintas instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales a solicitar tratamiento por consumo de drogas. Da cuenta sobre los casos o pacientes (eventos) que acuden a tratamiento a los diferentes centros de atención (gubernamentales y no gubernamentales) en un estado y esa información se refiere únicamente a la demanda real (efectiva) de atención. También registra las muertes asociadas al consumo. Es importante señalar que el número total de estos eventos puede exceder al de los individuos en contacto con las instituciones que los reportan en un tiempo determinado, toda vez que el mismo individuo puede ser contactado por más de una institución, con lo que puede ser cuantificado en diversos reportes de evento.

Por nivel educativo, el consumo de sustancias es casi del doble para los/as adolescentes de escuelas de bachillerato (23%) y los de bachillerato técnico (24.1%), en comparación con los/as de secundaria (13.3%).

En el Distrito Federal se encontró que el 68.8% de los/as adolescentes ha usado alcohol alguna vez en su vida. Al analizar este consumo según el sexo, se observa que tanto la población masculina (68.2%), como la femenina (69.4%), resultan igualmente afectadas.

Las delegaciones políticas más afectadas por el abuso de bebidas alcohólicas son Cuajimalpa (33.7%), Benito Juárez (30.6%), Magdalena Contreras (30.2%), Azcapotzalco (27.9%), Cuauhtémoc (27.4%) y Tlalpan (27.3%). Los resultados globales para el Distrito Federal, indican que 52.2% de los/as estudiantes consumen 5 copas o más por ocasión de consumo, al menos una vez al mes, porcentaje mayor al reportado en la encuesta realizada en 2003 que fue de 23.8%. Un indicador importante del consumo en esta población es que el consumo de tabaco y alcohol es casi idéntico entre hombres y mujeres; en tanto, el consumo de drogas, si bien es menor en las mujeres, las tendencias de crecimiento son mayores en ellas.

SISVEA

Mediciones realizadas en los centros de tratamientos no gubernamentales

De acuerdo con los datos registrados por este sistema, en el Distrito Federal la búsqueda de tratamiento ha ido en aumento de 1994 al 2007. Por ejemplo, en 1994 se registraron 1,122 personas, mientras que en 2007, la demanda de tratamiento ascendió a 1,884 casos. En total en el periodo comprendido se registraron 13,341 personas.⁶

Por otra parte, el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en este periodo, indica que la mayoría son hombres (87.4%). Por grupos de edad, destaca la población adulta de 35 años o más (23.9%). Por nivel educativo la mayoría tienen secundaria (39%). En cuanto al estado civil, más de la mitad de esta población es soltera (55.6%) y casi una tercera parte está casada (27.4%). Respecto a su situación laboral menos de la mitad de la población cuenta con un trabajo fijo (37.4%). Casi la mayoría de los usuarios asiste en forma voluntaria a buscar ayuda (47.9%).

Asimismo, entre 2006 y 2007, las drogas ilegales más consumidas entre la población que acudió a estos centros fueron la cocaína (63.1%), la marihuana (51.5%) y el crack (37.3%).

Respecto a las drogas de inicio, los datos del 2007, registraron que el alcohol (57.7% hombres y 56% mujeres) y el tabaco (18% hombres y 16.9% mujeres) fueron las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a las drogas de impacto* que motivó la búsqueda de ayuda, en los hombres y en las mujeres fue la cocaína (49% y 38.6%, respectivamente).

²Droga de impacto definida ésta como la que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (de salud, familiares, laborales, etc.) y que lo motiva a solicitar atención médica.

Mediciones realizadas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información obtenida en los CIJ sobre el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en el 2007, muestra coincidencias importantes con lo registrado por SISVEA en instituciones no gubernamentales. De tal forma que, la mayor parte de la población que acudió a esta institución en el Distrito Federal, fue del sexo masculino (4,347 varones y 1,520 mujeres). En cuanto a la edad, la mayoría fueron adultos de 35 años o más (n=1,558) y jóvenes entre los 15 y 19 años (n=1,556). En cuanto al estado civil y la escolaridad, la mayoría eran solteros (n=3,307) y habían estudiado hasta la secundaria (n=2,567). En lo que respecta a la ocupación, la mayor parte contaba con un trabajo estable (n=1,621) y otro grupo importante eran estudiantes (n=1,336). El nivel socioeconómico de la mayoría fue medio bajo (n=3,576) y bajo (n=1,006).⁷

El tabaco (53.5% hombres y 63.2% mujeres) y el alcohol (31.3% hombres y 27% mujeres) son las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a la droga de impacto, en los hombres fue la cocaína (32.6%) y en las mujeres el alcohol (21%).

Mediciones realizadas en los consejos tutelares de menores

Los datos obtenidos por los consejos tutelares de menores indican que del grupo de menores infractores usuarios de drogas, casi el 96% es población masculina. En cuanto al nivel educativo, el 58.3% contaba con escolaridad máxima de secundaria. En lo que respecta al uso de drogas, la mayoría consume tabaco, alcohol e inhalables. La infracción que cometió el 89.5% de esta población fue el robo.⁸

Mediciones realizadas en el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones

En el Distrito Federal el número de defunciones debido al consumo de alcohol es de 942 habitantes, cifra que corresponde al 6.5% del total de muertes registradas en el país. Asimismo, las defunciones ocasionadas por la enfermedad alcohólica del hígado y por el uso de tabaco fueron 566 y 168, respectivamente, que equivalen al 7% y 6.6% del total de muertes.⁹

La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, así como del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (ST-CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008). Sus objetivos incluyen generar información confiable y caracterizar la prevalencia del uso de tabaco, alcohol y drogas en la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 años. La encuesta busca también conocer los factores asociados a la utilización de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el abuso de las mismas.

Objetivos

Los objetivos que se plantearon para la ENA 2008 son:

- Evaluar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas (consumidas fuera de prescripción) como no médicas, alcohol y tabaco en los ámbitos nacional y estatal
- Evaluar las tendencias en el consumo de sustancias en una muestra representativa de las poblaciones urbana y rural del país

La ENA 2008 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y estatal, en la que se encuentran representadas poblaciones rurales –aquellas con un número de habitantes menor o igual a 2 500– y urbanas –aquellas con más de 2 500 habitantes–. La selección de las unidades muestrales se realizó en múltiples etapas: áreas geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas o segmentos, viviendas y, finalmente, personas dentro de los hogares. La selección de viviendas se hizo a partir de los croquis y listados elaborados en campo usando una técnica de muestreo aleatorio sistemático.

En cada hogar, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó un adulto de entre 18 y 65 años de edad y un adolescente de entre 12 y 17 años. La selección se llevó a cabo

mediante una técnica de muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos por la ENA 2008 permiten:

- Identificar los estados de mayor riesgo en relación con el problema de consumo de drogas
- Evaluar la relación de los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, el uso habitual y el uso problemático de drogas, alcohol y tabaco
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con el fin de incidir en la creación e implementación de programas de prevención
- Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con el fin de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco
- Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y sintomatología depresiva

Es importante considerar que a pesar de que se eligieron muestras con el mismo diseño y que se mantuvieron estables la mayor parte de las condiciones de las encuestas 2002-2008, hay importantes diferencias; por ejemplo, la encuesta de 2008 se realizó mediante computadora en tanto que la de 2002 se efectuó en una versión lápiz y papel. Adicionalmente, cambiaron las definiciones de consumo alto para las mujeres, ya que internacionalmente se considera para ellas el que hayan consumido 4 copas o más, a diferencia de las 5 copas consideradas en las encuestas anteriores.

Unidades de análisis

Las unidades de análisis definidas para la ENA 2008 son las siguientes:

- Hogar es el conjunto de personas, relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros
- Adolescentes son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 12 y 17 años
- Adultos son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 18 y 65 años

Cobertura geográfica y de unidades

La información obtenida a través de la ENA 2008 permitirá el cálculo de indicadores estatales con representatividad de las áreas urbanas y rurales de cada entidad federativa. Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas tales como instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles, asilos, etcétera.

Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalan la existencia de importantes diferencias para los indicadores de interés según el tamaño de la localidad, para el diseño de la ENA 2008 se decidió estratificar por el tamaño de la localidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

Estrato	Descripción
I. Ciudad o área metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudades y áreas metropolitanas • Ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado
II. Complemento urbano	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades de 2 500 a 99 999 habitantes
III. Rural	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades con menos de 2 500 habitantes

La asignación del tamaño de muestra para cada estrato se hizo de manera proporcional al número de habitantes dentro del estrato.

Tamaño de la muestra

Para cumplir con los objetivos de la ENA 2008, se consideró que el tamaño de la muestra seleccionado debería permitir estimar proporciones estatales de aproximadamente 12.2%. Además, contemplando que la encuesta debería permitir obtener estimaciones estatales con error y confianza idénticos a los utilizados para el diseño

de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, se consideró un error relativo máximo de 15%, una confianza de 90%, una tasa de 15% de no respuesta, un efecto de diseño de 2.183 y un promedio de 1.4 individuos entrevistados por vivienda. Se determinó un tamaño de muestra estatal de aproximadamente 1 584 viviendas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1-p) \cdot deff}{r^2 \cdot p \cdot TR \cdot h}$$

donde

n	Tamaño de muestra
p	Proporción a estimar
$z_{\alpha/2}$	Cuantil de una distribución normal asociado con un nivel de confianza deseado $1-\alpha$
r	Error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar
$deff$	Efecto de diseño, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia derivada del uso de un diseño complejo para la ENA 2008
TR	Tasa de respuesta esperada
h	Promedio de entrevistas por vivienda

El tamaño de la muestra en el ámbito nacional fue de 50 688 viviendas, a partir del cual se podrán estimar proporciones mayores o iguales a 0.43% en el ámbito nacional con la misma precisión y confianza que en las estimaciones estatales.

Esquema de selección

El diseño muestral de la ENA 2008 es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados; para el proceso de selección, se utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda de 2000. Ya que en los estratos I y II las localidades incluyen AGEB y en el estrato III las AGEB incluyen localidades, el esquema de selección depende del estrato que se esté observando. Así, los esquemas de selección para los estratos I y II son idénticos, mientras que el esquema para el estrato III es diferente; ambos esquemas se describen a continuación:

Estratos I y II

- En la primera etapa se seleccionaron k AGEB con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), definido por el número de viviendas particulares habitadas en el AGEB
- Para cada una de las AGEB seleccionadas, se seleccionaron seis manzanas con probabilidad proporcional a su número de viviendas
- Posteriormente, en cada una de las manzanas seleccionadas, se realizó una selección de seis viviendas, utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio
- En cada una de las viviendas seleccionadas y siempre que la composición del hogar lo permitió, es decir, que en el hogar existieran individuos en el rango de edad, se seleccionaron

un adulto y un adolescente, según las definiciones descritas anteriormente, mediante el uso de muestreo aleatorio simple.

La encuesta se aplicó en todos los hogares de la vivienda

- A cada uno de los individuos seleccionados se le aplicó la entrevista siguiendo el cuestionario correspondiente

La constante k será proporcional al tamaño de muestra asignado al estrato.

Estrato III

El esquema de selección en el caso de las localidades que conforman el estrato III se describe a continuación:

- Las unidades primarias de muestreo fueron AGEB rurales, que contienen las localidades que conforman el estrato III. La probabilidad de seleccionar un AGEB fue proporcional al número de viviendas particulares habitadas en ella. Se seleccionaron tantas AGEB como viviendas particulares habitadas en el estrato
- La unidad secundaria de muestreo (USM) estuvo constituida por las localidades o grupos de localidades adyacentes, que agruparon un mínimo de 120 viviendas. Estas USM se seleccionaron con probabilidad proporcional al número de viviendas particulares habitadas que existían
- Para cada localidad o grupo de localidades seleccionadas se extrajo una muestra aleatoria sistemática de tres grupos de doce viviendas consecutivas cada uno, llamados segmentos
- En cada una de las viviendas que conformaron los segmentos seleccionados, se aplicó la encuesta en todos los hogares de la vivienda. Siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionaron un adulto y un adolescente. Esta selección se realizó utilizando muestreo aleatorio simple

Logística en campo

La ENA 2008 se realizó en dos fases:

- En la primera fase (tamizaje), se elaboraron los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y se identificó a los residentes habituales (nombre, edad y sexo) de las viviendas seleccionadas. El primer paso consistió en aplicar el cuestionario de hogar y posteriormente se llevó a cabo la selección aleatoria de los adultos y adolescentes. En esta fase también se completó la prueba piloto
- En la segunda fase se recabó información en campo mediante la aplicación de la encuesta a los residentes previamente seleccionados

Prueba piloto

La prueba piloto tuvo como objetivo general evaluar la metodología, los procedimientos, los instrumentos y la logística de la ENA 2008 a pequeña escala. Con el fin de contar con instrumentos revisados, afinados e implementados en campo, la ENA 2008 incluyó una fase piloto que se llevó a cabo en la localidad de Texcoco, en el Estado de México del 10 al 14 de diciembre de 2007. Se seleccionaron ocho AGEB; al interior de cada una de ellas se seleccionaron dos manzanas, y ahí, se aplicó un total de cinco entrevistas por manzana, lo cual da un total de 80 viviendas seleccionadas. Se utilizaron dos equipos integrados por un jefe de grupo, cuatro entrevistadores y una persona de apoyo informático. Los resultados de la prueba piloto permitieron identificar y corregir errores en el cuestionario e implementar mejoras en el equipo de campo.

Cuestionarios de recolección de información

El cuestionario se diseñó y programó para aplicarse en computadoras *laptop*. El cuestionario incluyó dos grandes rubros de información: a) información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales y b) información sobre los individuos seleccionados en cada uno de los grupos de edad. El primero se administró en los hogares de la muestra en el ámbito nivel nacional.

El informante adecuado para la sección del hogar fue el jefe de hogar, el ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más sin impedimentos para poder responder y con conocimientos de las características de la vivienda y sus residentes habituales.

Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador, por informante, a fin de asentar el código de resultado definitivo en el plano individual
- Características y nivel socioeconómico del hogar. Se registró información referente al total de cuartos, el tipo de material del piso, el tipo de material de construcción de la vivienda, la disponibilidad de agua entubada, el calentador de agua, la posesión de automóvil, así como al ingreso promedio mensual familiar
- Características de los miembros del hogar. Se identificó el número de miembros del hogar y para cada uno se recabó la siguiente información: nombre (listado de personas), edad, fecha de nacimiento, sexo, parentesco con el jefe de familia, nivel de escolaridad, estado civil y ocupación

Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo previamente seleccionado por el equipo de investigación encargado del diseño muestral de la ENA 2008. Se administró un solo cuestionario individual en cada hogar visitado donde hubiera por lo menos un informante elegible, esto es, una persona entre 12 y 65 años de edad cumplidos al momento de la visita. También se incluyó una sobremuestra de adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

El cuestionario individual recabó información con respecto a los siguientes temas:

- Datos sociodemográficos del informante: sexo, edad, estado civil, escolaridad, datos sobre la familia, ocupación e ingreso familiar
- Consumo de tabaco
- Consumo de drogas
- Consumo de alcohol
- Dependencia y abuso al consumo de drogas
- Dependencia y abuso al consumo de alcohol
- Exposición al uso de drogas
- Consumo de drogas en el entorno familiar y social
- Percepción acerca de las drogas y de los usuarios
- Exposición a la prevención de drogas
- Tratamiento por consumo de drogas

El instrumento incluyó otras secciones que evaluaron aspectos de la salud mental como la sintomatología depresiva, el intento suicida y, del contexto social, la violencia de género, la conducta antisocial y la migración, además de los conocimientos y creencias sobre algunas enfermedades como el VIH/SIDA, la hepatitis y su relación con el consumo de drogas y el comportamiento sexual.

La parte principal del instrumento se aplicó al 100% de los entrevistados, y consistió hasta la sección de tratamiento y uso de servicios. Aproximadamente el 40% de los entrevistados, seleccionados aleatoriamente, contestaron las secciones adicionales que se indicaron en el párrafo anterior. Esta situación conlleva que para el análisis de estas secciones, se usa un ponderador específico, distinto del de la sección principal, para obtener resultados expandidos a nivel nacional. Esta situación refleja que al usar uno u otro ponderador, las expansiones de los grupos, sea por sexo, edad u otra variable, varíen ligeramente.

Levantamiento de la ENA 2008

La fase inicial de campo de la ENA 2008 se llevó a cabo entre abril y junio de 2008. Antes de esta fase, se llevó a cabo una capacitación en la Ciudad de México del 24 de marzo al 4 de abril, en la cual se incluyeron dos días de prueba de campo, con la participación de los casi 300 encuestadores reclutados para el proyecto.

El periodo operativo de la ENA 2008 se implementó de forma simultánea en las 32 entidades federativas, con equipos integrados por un coordinador estatal, un supervisor y un grupo de

encuestadores. Para cada vivienda seleccionada, se programaron hasta cuatro visitas, incluyendo horarios especiales (antes de las 8 am o después de las 8 pm) y fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes. La encuesta se aplicó con captura simultánea de datos, es decir, que se utilizaron una aplicación informática y computadoras portátiles en campo para las entrevistas. El cuestionario básico de hogar considera las características demográficas y socioeconómicas, lo que permite contar con información tanto sobre el contexto en el que ocurre el consumo de sustancias, como sobre el perfil de los consumidores y los no consumidores.

El diseño consideró la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 años por hogar y de un adolescente de entre 12 y 17 años por hogar. La aplicación informática de la encuesta se programó para realizar una selección aleatoria del individuo o de los individuos a entrevistar a partir del listado de integrantes obtenido en el cuestionario básico de hogar. Debido a factores externos a la encuesta –relacionados con el contexto nacional y con problemas de inseguridad y climatológicos–, la tasa de respuesta de la encuesta fue menor a la esperada, lo que se tradujo en un número menor del necesario de entrevistas individuales completas para las estimaciones deseadas.

Debido a ello, posterior al término del periodo operativo inicial, se llevó a cabo uno especial de recuperación de entrevistas individuales en un conjunto de 11 entidades; éste se implementó entre julio y agosto de 2008. Adicionalmente, se tomó la decisión de elaborar una muestra más para 21 estados, de forma que se pudiera contar con observaciones suficientes para los análisis propuestos para la ENA 2008. El componente operativo para esta muestra adicional se implementó entre septiembre y octubre de 2008. Ambos operativos adicionales siguieron los procedimientos y estructura utilizados para el original.

El Distrito Federal fue una de las entidades cuya muestra se cubrió en dos etapas. En la primera se visitaron 1 534 hogares y se entrevistó a 1 056 individuos, mientras que en la segunda fueron 318 los hogares y 233 los individuos encuestados. Las tasas de respuesta en la primera y segunda etapas fueron de 70.9% y 86.8%, respectivamente. La tasa global fue de 73.6 por ciento.

Supervisión del periodo operativo

La estructura de campo se integró con un coordinador nacional, un subcoordinador nacional, 32 coordinadores estatales, 32 supervisores y siete entrevistadores por estado. Los coordinadores estatales y los supervisores fueron los encargados de la supervisión directa de las entrevistas y de la correcta ubicación de las viviendas.

El trabajo de supervisión se diseñó con base en las dos fases siguientes:

- Planeación y organización. En esta etapa, el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador a su cargo.
- Supervisión en campo. En esta etapa, el supervisor controló el levantamiento de la información, retroalimentó a los

entrevistadores con respecto a las dudas o problemas surgidos durante el levantamiento, así como respecto a los lineamientos de la capacitación. También verificó que los individuos y los hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente una de cada cuatro entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó 100% de los códigos de no respuesta.

Adicionalmente, la coordinación nacional de la encuesta en el INSP monitorizó regularmente las actividades en cada estado y, a partir de los informes recibidos –tanto internos como de las supervisiones del personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz– envió precisiones sobre la aplicación de los instrumentos o actividades del operativo. Se requirió que los coordinadores estatales informaran sobre el desempeño de cada uno de los encuestadores y verificaran las causales de no entrevista de las viviendas. Adicionalmente, el área responsable en el INSP envió supervisión con personal independiente del operativo para recontactar viviendas visitadas por entrevistadores con baja detección de casos de consumo y verificar la realización de las re-entrevistas.

Supervisión externa ENA 2008

Para garantizar la calidad en los procesos de recopilación de la información en campo y la validez de la propia información, el INSP contrató una empresa para realizar una supervisión externa (SE) a sus procesos de recopilación de información en campo durante el periodo operativo de la encuesta. Los objetivos de la SE fue medir la calidad de información en una submuestra de aproximadamente 10% del universo de viviendas de la ENA. El interés del equipo de investigadores de la ENA 2008 fue generar informes sobre

procesos de recolección de información por parte de los entrevistadores en campo y contar con los parámetros que permitieran determinar la validez y la confiabilidad de la información recolectada en campo. El INSP, en colaboración con el INPRFM, diseñó un cuestionario *ad hoc*; el formato de aplicación fue cara a cara y la duración de las entrevistas, fue de aproximadamente 15 minutos. El número estimado de entrevistas fue de 156 por entidad, de las cuales aproximadamente 70% se recabó en zonas urbanas y 30%, en zonas rurales.

La empresa ganadora llevó a cabo un proceso de capacitación en el cual participaron miembros del equipo de investigación del INSP con el fin de resolver dudas sobre temas conceptuales; además, se discutieron los objetivos de la ENA 2008 (mediante el uso de manuales y cuestionarios) y la importancia de contar con una supervisión externa. Durante el proceso de levantamiento en campo de la SE, se entregaron al INSP informes semanales de las incidencias detectadas y se registraron incidentes o situaciones que dificultaban el trabajo en campo. El informe final de la supervisión externa constituye un documento que registra el proceso de recolección de información de la ENA 2008 en la submuestra seleccionada.

Consideraciones éticas

Todos los participantes leyeron (o les fue leída, en caso necesario) una carta de consentimiento informado. Se recabó información solamente de quienes aceptaron participar y firmaron la carta correspondiente.

En el caso de los menores de edad, los padres o tutores firmaron una carta de asentimiento previo a que el menor proporcionara la información requerida por la encuesta. Se hizo énfasis en el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.

tabaco

Principales resultados

¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tiene como objetivo estimar la prevalencia de vida (lifetime prevalence) del consumo de tabaco en la población. Bajo esta definición, se encontró que 53.5% de la población del Distrito Federal entre 18 y 65 años, cerca de 3 millones personas habían probado alguna vez en su vida el cigarrillo. El 68.2% de los hombres y el 40.7% de las mujeres respondieron afirmativamente a esta pregunta (cuadro 1).

Edad de consumo de tabaco por primera vez

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en la población de 18 a 65 años del Distrito Federal es de 17.1 años (IC95% 16.6-17.6).

Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 56.2% de los fumadores (56% de los hombres y 56.6% de las mujeres) iniciaron el consumo de tabaco por curiosidad, mientras que 35.4% y 33.1% de los hombres y mujeres que fuman comenzaron a hacerlo por convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores (cuadro 2).

¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida?

La pregunta ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida? tiene como objetivo estimar la prevalencia de consumo de tabaco en la población. Por muchos años esta fue la pregunta utilizada para la estimación de la prevalencia, en concordancia con la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al usar esta definición, se encontró que 30.1% de la población en el rango en estudio, cerca

de un millón 686 mil residentes del Distrito Federal, había fumado más de 100 cigarrillos en su vida (cuadro 3). Desde el punto de vista epidemiológico (estimación de prevalencias de fumadores, ex fumadores y nunca fumadores), esta definición sobreestima el consumo de tabaco en los adultos. Por esta razón y debido que la epidemia de tabaquismo es un problema de salud pública global y cambiante, que requiere de indicadores válidos y precisos para la vigilancia epidemiológica y la evaluación del cumplimiento de políticas y estrategias de control del tabaco, esta definición dejó de ser utilizada.

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado

Para caracterizar la población mexicana respecto al consumo de tabaco, se utilizaron las siguientes definiciones:

- Fumador activo: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber fumado durante el último año
- Ex fumador: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber dejado de fumar hace más de un año
- Nunca ha fumado: persona que contestó no haber fumado en la vida

Mediante el uso de estas definiciones se encontró que, entre los pobladores de 18 a 65 años del Distrito Federal, 28.4% eran fumadores activos, lo que representa cerca de 1 millón 588 mil fumadores en la entidad. La comparación de la prevalencia de consumo de tabaco a nivel estatal con el promedio nacional (20.6%) se puede observar en la figura 1. El 25.2% de los encuestados refirieron ser ex fumadores y el 46.5% no había fumado. El consumo de tabaco en los hombres fue de 39% y de 19.1% en las mujeres (cuadro 4).

Fumadores activos

Edad de inicio del consumo diario de cigarrillos

En el Distrito Federal, los fumadores activos de 18 a 65 años inician el consumo diario de cigarrillos, en promedio, a los 16.7 años (IC95% 15.9-17.4). Los hombres a los 15.7 años y las mujeres a los 18.5 años.

Cuadro 1

Respuesta a la pregunta ¿Ha fumado alguna vez en su vida?, según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Distrito Federal, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
No	N*	829.1	1773.9	2603.0	
	IC95 %	L. Inferior	688.6	1547.0	2352.0
		L. Superior	969.6	2000.9	2854.1
		%	31.8	59.3	46.5
	IC95 %	L. Inferior	27.7	54.1	42.6
		L. Superior	36.1	64.4	50.4
Sí	N*	1781.4	1215.3	2996.7	
	IC95 %	L. Inferior	1597.3	1043.6	2726.7
		L. Superior	1965.4	1387.0	3266.6
		%	68.2	40.7	53.5
	IC95 %	L. Inferior	63.9	35.6	49.6
		L. Superior	72.3	45.9	57.4
Total	N*	2610.5	2989.2	5599.7	

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 2

Razón por la que empezó a fumar según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Distrito Federal, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Porque su familia, amigos o compañeros fumaban	N*	631.0	402.5	1033.5	
	IC95%	L. Inferior	508.0	304.6	850.7
		L. Superior	754.0	500.4	1216.3
		%	35.4	33.1	34.5
	IC95%	L. Inferior	29.5	26.1	29.6
		L. Superior	41.8	41.0	39.7
Por curiosidad	N*	996.7	688.2	1684.9	
	IC95%	L. Inferior	841.2	519.3	1447.4
		L. Superior	1152.2	857.2	1922.4
		%	56.0	56.6	56.2
	IC95%	L. Inferior	49.5	46.8	50.1
		L. Superior	62.2	66.0	62.2
Otra razón	N*	152.9	124.5	277.4	
	IC95%	L. Inferior	91.1	64.2	188.8
		L. Superior	214.8	184.9	366.0
		%	8.6	10.2	9.3
	IC95%	L. Inferior	5.8	6.2	6.7
		L. Superior	12.5	16.4	12.6
Total	N*	1780.6	1215.3	2995.9	

*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 3

¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida?, según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Distrito Federal, México, 2008


		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
No	N*	1417.8	2495.5	3913.3	
	IC95%				
	L. Inferior	1217.4	2264.4	3657.5	
	L. Superior	1618.3	2726.5	4169.1	
	%	54.3	83.5	69.9	
IC95%	L. Inferior	49.6	79.1	66.2	
	L. Superior	59.0	87.1	73.3	
	Si	N*	1192.7	493.8	1686.4
	IC95%				
L. Inferior	1053.4	366.3	1456.6		
L. Superior	1331.9	621.2	1916.2		
	%	45.7	16.5	30.1	
IC95%	L. Inferior	41.0	12.9	26.7	
L. Superior	50.4	20.9	33.8		
Total	N*	2610.5	2989.2	5599.7	

*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 1

Prevalencia de fumador activo.
Adultos de 18-65 años.
Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Consumo diario de cigarrillos (cantidad y duración)

Los fumadores activos entre 18 y 65 años en el Distrito Federal fuman, en promedio, 5.9 cigarrillos al día (IC95% 5.2-6.7), con un tiempo promedio de fumar diariamente de 12.2 años (IC95% 10.6-13.7). El 90.8% de los fumadores activos consume menos de 16 cigarrillos al día, 7.2% de 16 a 25 cigarrillos y 1.9% más de 26 cigarrillos.

Adicción

Algunas de las características de los fumadores activos (aquellos que fumaron cigarrillos durante el último año) en la población entre 18 y 65 años residente en el Distrito Federal, son las siguientes: 90.5% le dan el golpe al cigarro algunas veces o siempre; 6.1% fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse; el periodo en el que fuman con mayor frecuencia, en 96.1% de los casos, es en el transcurso de la tarde y la noche.

Estrategias para dejar de fumar

A los fumadores activos entre 18 y 65 años se les solicitó información sobre el dejar de fumar. Sobre esto 10.3% contestaron que les sería difícil abstenerse de fumar en lugares públicos, y 48.4% que han intentado dejar de fumar alguna vez. Las principales formas en que lo hicieron fueron: dejar de fumar súbitamente (60.7%); disminuir gradualmente el número de cigarrillos (1.7%); dejar de comprar cigarrillos (8.2%), y sustituir fumar por otra actividad (2.3%). Únicamente 3% se ha sometido a algún tratamiento para dejar de fumar.

Cuadro 4

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Distrito Federal, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Nunca ha Fumado	N*	829.1	1773.9	2603.0	
	IC95%	L. Inferior	688.6	1547.0	2352.0
		L. Superior	969.6	2000.9	2854.1
	%	31.8	59.3	46.5	
	IC95%	L. Inferior	27.7	54.1	42.6
L. Superior		36.1	64.4	50.4	
Fumador actual***	N*	1016.8	570.7	1587.6	
	IC95%	L. Inferior	888.0	452.9	1404.3
		L. Superior	1145.7	688.6	1770.9
	%	39.0	19.1	28.4	
	IC95%	L. Inferior	34.6	15.6	25.4
L. Superior		43.5	23.2	31.5	
Exfumador	N*	764.5	644.5	1409.1	
	IC95%	L. Inferior	631.8	524.8	1219.5
		L. Superior	897.3	764.3	1598.7
	%	29.3	21.6	25.2	
	IC95%	L. Inferior	25.5	18.1	22.3
L. Superior		33.4	25.5	28.3	
Total	N*	2610.5	2989.2	5599.7	

*N en miles

** Fumó en el último año

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

El 81.5% de los fumadores activos entre 18 y 65 años ha escuchado hablar sobre algún medicamento que ayuda a dejar de fumar. De ellos, 38.7% están de acuerdo en que si decidieran dejar de fumar, las medicinas (chicles y parches con nicotina o bupropión) les ayudarían a hacerlo; 29.8% opinaron que dichas medicinas son muy caras; 25.4% contestaron que estas medicinas pueden dañar su salud; 6.5% respondieron que esas medicinas son muy difíciles de conseguir. Finalmente, 74.2% mencionó que si decidieran dejar de fumar, podrían hacerlo sin la ayuda de las mencionadas medicinas (cuadro 5).

Ex fumadores

En el Distrito Federal, 12.8% de la población entre 18 y 65 años, cerca de 196 mil personas, refirieron ser ex fumadores. La edad promedio en la que los adultos que, habiendo fumado alguna vez en su vida, y que al momento de la encuesta se consideraban ex fumadores, dejaron de fumar, fue a los 31.4 años; a los 32.6 años para el caso de los hombres y a los 29.3 para las mujeres. Estos ex fumadores fumaban, en promedio, 12.1 cigarrillos al día: 12.5 y 10.8 los hombres y las mujeres, respectivamente. Las principales razones por las que los ex fumadores dejaron de fumar fueron: por conciencia del daño a la salud (46.7%) y porque se hartaron de fumar (22.8%). Semejantes proporciones fueron obtenidas al estratificar por sexo.

Nunca han fumado

El 73.9% de la población (62.6% de los hombres y 84.7% de las mujeres) entre 18 y 65 años del Distrito Federal refirió no haber fumado.

Exposición al humo de tabaco ambiental (HTA)

El 37.3% de los encuestados que nunca han fumado, representativos de cerca de 1 millón 212 mil residentes del Distrito Federal, reportaron estar expuestos al HTA; así lo expresaron 42% de los hombres y 34.7% de las mujeres en esta categoría, mientras que 42.3% de los adolescentes, equivalente a cerca de 274 mil adolescentes en el estado, reportaron estar expuestos al HTA (cuadro 6).

Percepción de las políticas de control del tabaco

En cuanto a la opinión que los participantes de esta encuesta expresaron sobre las medidas de protección a la salud relativas al establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos, estuvieron completa o medianamente a favor de que fueran establecidas: en restauran-

Cuadro 5

Opinión de los fumadores activos sobre los medicamentos para dejar de fumar. Adultos de 18 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%	
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior
Si decidiera fumar, estas medicinas le ayudarían a hacerlo						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	500.6	366.9	634.3	38.7	31.5	46.5
Complemento	792.6	676.7	908.6	61.3	53.5	68.5
Las medicinas para dejar de fumar son carísimas						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	385.2	288.1	482.3	29.8	23.8	36.6
Complemento	908.0	763.6	1052.4	70.2	63.4	76.2
Las medicinas para dejar de fumar pueden dañar su salud						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	327.9	240.9	414.9	25.4	19.3	32.5
Complemento	965.3	799.6	1131.1	74.6	67.5	80.7
Si decidiera dejar de fumar, podría hacerlo sin estas medicinas						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	959.8	802.1	1117.5	74.2	68.4	79.3
Complemento	333.4	260.2	406.6	25.8	20.7	31.6
Las medicinas para dejar de fumar son muy difíciles de conseguir						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	84.6	39.7	129.4	6.5	3.9	10.8
Complemento	1208.7	1046.6	1370.7	93.5	89.2	96.1
Total	1293.2	1125.9	1460.6	100.0		

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro 6

Exposición a humo de tabaco ambiental según sexo y grupos de edad. Distrito Federal, México, 2008

		Sexo		Grupos de edad		Total	
		Hombre	Mujer	Adolescentes	Adultos		
No	N*	661.9	1376.8	373.3	1665.4	2038.8	
	IC95 %	L. Inferior	534.0	1161.0	284.2	1447.4	1779.6
		L. Superior	789.8	1592.6	462.5	1883.5	2297.9
	%	58.0	65.3	57.7	64.0	62.7	
IC95 %	L. Inferior	50.1	59.5	49.8	58.4	57.8	
	L. Superior	65.5	70.7	65.2	69.2	67.4	
Sí	N*	479.3	732.1	273.8	937.6	1211.5	
	IC95 %	L. Inferior	361.6	594.8	222.8	771.5	1032.6
		L. Superior	597.0	869.5	324.9	1103.7	1390.3
	%	42.0	34.7	42.3	36.0	37.3	
IC95 %	L. Inferior	34.5	29.3	34.8	30.8	32.6	
	L. Superior	49.9	40.5	50.2	41.6	42.2	
Total	N*	1141.3	2108.9	647.2	2603.0	3250.2	

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

tes y otros lugares en donde se expenden alimentos, 90%; en cines y otros lugares de espectáculos, 90.7%; en bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol, 65.5%; en hospitales y otros centros de atención a la salud, 94.7%; en lugares de trabajo, 89%; en el transporte

público, 93.2%. El 88.1% estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado. Proporciones semejantes se obtienen al estratificar por edad, es decir, entre los adolescentes y los adultos (cuadro 7).

Cuadro 7

Percepción sobre medidas de protección a la salud en lugares públicos según grupos de edad. Distrito Federal, México, 2008

	N*	IC 95%		%	IC 95%		
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior	
Adolescentes							
En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos							
Completamente a favor/medianamente a favor	831.8	722.5	941.2	93.8	89.8	96.3	
Complemento	55.1	25.4	84.7	6.2	3.7	10.2	
En cines y otros lugares de espectáculos							
Completamente a favor/medianamente a favor	817.8	708.7	927.0	92.2	88.1	95.0	
Complemento	69.1	37.1	101.0	7.8	5.0	11.9	
En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol							
Completamente a favor/medianamente a favor	565.0	466.9	663.0	63.7	56.4	70.4	
Complemento	321.9	247.3	396.5	36.3	29.6	43.6	
En hospitales y otros centros de atención a la salud							
Completamente a favor/medianamente a favor	830.3	726.3	934.4	93.6	88.9	96.4	
Complemento	56.5	21.7	91.3	6.4	3.6	11.1	
En lugares de trabajo							
Completamente a favor/medianamente a favor	811.2	706.8	915.6	91.5	87.2	94.4	
Complemento	75.7	41.2	110.2	8.5	5.6	12.8	
En el transporte público							
Completamente a favor/medianamente a favor	821.5	711.7	931.3	92.6	87.9	95.6	
Complemento	65.4	30.7	100.1	7.4	4.4	12.1	
Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado							
Completamente a favor/medianamente a favor	786.4	685.7	887.0	88.7	83.4	92.4	
Complemento	100.5	55.8	145.2	11.3	7.6	16.6	
Total	886.9	770.9	1002.9	100.0			
Adultos							
En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos							
Completamente a favor/medianamente a favor	5003.6	4723.3	5283.9	89.4	86.9	91.4	
Complemento	596.1	469.1	723.0	10.6	8.6	13.1	
En cines y otros lugares de espectáculos							
Completamente a favor/medianamente a favor	5065.1	4773.2	5356.9	90.5	88.0	92.5	
Complemento	534.6	410.1	659.2	9.5	7.5	12.0	
En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol							
Completamente a favor/medianamente a favor	3685.3	3413.3	3957.4	65.8	62.2	69.3	
Complemento	1914.4	1694.2	2134.5	34.2	30.7	37.8	
En hospitales y otros centros de atención a la salud							
Completamente a favor/medianamente a favor	5309.5	5024.2	5594.7	94.8	92.5	96.4	
Complemento	290.2	182.1	398.3	5.2	3.6	7.5	
En lugares de trabajo							
Completamente a favor/medianamente a favor	4962.2	4680.1	5244.4	88.6	85.8	90.9	
Complemento	637.5	489.7	785.3	11.4	9.1	14.2	
En el transporte público							
Completamente a favor/medianamente a favor	5224.8	4951.1	5498.5	93.3	91.3	94.9	
Complemento	374.9	274.3	475.4	6.7	5.1	8.7	
Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado							
Completamente a favor/medianamente a favor	4930.6	4636.6	5224.6	88.1	85.6	90.1	
Complemento	669.1	543.8	794.4	11.9	9.9	14.4	
Total	5599.7	5321.2	5878.2	100.0			

*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Conclusiones

En el ámbito nacional en la población de 18 a 65 años se encontró que 20.6% de la población era fumadora activa (31.3% de los hombres y 10.9% de las mujeres); 19.6% eran ex fumadores (24.3% de los hombres y 15.3% de las mujeres), y 59.8% nunca habían fumado (44.4% de los hombres y 73.9% de las mujeres).

En el Distrito Federal se encontró que los fumadores activos constituían 28.4% de la población (cerca de un millón 588 mil personas), lo que hace que la prevalencia de consumo de tabaco del Distrito Federal sea la segunda más alta en la República mexicana. Los fumadores activos iniciaron el consumo diario de cigarrillos a los 16.7 años, fuman en promedio 5.9 cigarrillos diarios y 6.1% de ellos fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse.

El 25.2% de la población en el rango estudiado, poco más de 1 millón 409 mil, son ex fumadores y la razón más importante por la

que dejaron de fumar fue la conciencia por los daños a la salud que provoca el consumo de tabaco.

El 46.5% de este sector poblacional, cerca de 2 millones 603 mil personas refirió nunca haber fumado. Sin embargo, de este grupo 36% de los adultos, cerca de 938 mil, y 42.3% de los adolescentes, cerca de 274 mil, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental.

La opinión de los habitantes del Distrito Federal acerca del establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos es de apoyo, pues más de 88.1% de los adultos y adolescentes estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado.

drogas

Principales resultados

Los resultados en el Distrito Federal muestran que la exposición al consumo de drogas (que les hayan regalado o intentado vender drogas) está por arriba del promedio nacional. Al comparar la exposición del Distrito Federal con la nacional, al interior de cada sexo, la razón es de 1.2 hombres por cada 1 en el ámbito nacional y para las mujeres la razón es de 1.6 por cada 1.

Al igual que los resultados nacionales, más hombres (36.1%) que mujeres (12.9%) están expuestos.

Esto se refleja en las prevalencias del consumo global de drogas (sin incluir tabaco ni alcohol), en donde se observa que el consumo de drogas es también mayor al promedio nacional, tanto en hombres (12.6%) como en mujeres (4.9%) (figura 1).

Una situación similar ocurre para las drogas ilegales, en donde el consumo en el Distrito Federal es mayor al promedio nacional, en un 3.4% en el caso de los hombres y un 2.0% en las mujeres (figura 2).

Lo mismo es para las drogas médicas, donde se observa mayor consumo, en especial en el caso de los hombres.

Para algunas drogas específicas ocurre igual. Así, el consumo de marihuana y cocaína es mayor en ambos sexos en comparación con el promedio nacional, especialmente la marihuana. En el caso de las metanfetaminas, en los hombres el consumo es mayor al promedio y en las mujeres el consumo es igual al porcentaje nacional (figura 3).


Adicional a lo señalado anteriormente, en todos los casos, el consumo de estas drogas es mayor en los hombres en comparación con las mujeres.

Los datos de la encuesta permiten aproximarnos a la demanda de necesidades de atención de la población total, de manera que en lo alto de la pirámide de atención, se observa que el 0.5% de ella presenta dependencia, que corresponde a poco más de 33,500 personas en la capital del país.

Al analizar otros aspectos sobre el consumo de drogas, más de tres cuartas partes de los hombres y las mujeres, señalan que el número de usuarios se ha incrementado en los últimos cinco años, en el país.

Figura 1


Exposición y consumo de drogas según sexo. Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 2


Consumo de drogas médicas e ilegales según sexo. Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 3

Consumo de marihuana, cocaína y metanfetaminas según sexo. Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

De la misma forma, prevalece la creencia de que el adicto a las drogas es alguien que necesita ayuda (58.4%) y es una persona enferma (52.9%); en tanto, una muy baja proporción considera que es alguien egoísta (6.2%) o que es independiente (5.5%).

En cuanto a qué hacer para rehabilitar a las personas adictas a las drogas, casi la mitad de la gente señala que deben ser enviadas a granjas especiales fuera de la ciudad (45.5%).

Con relación a la percepción de qué tan adictivas son las drogas, la marihuana (84.4%), la cocaína (83.8%) y el alcohol (75.9%), son las que señalan en el Distrito Federal como las de mayor potencial adictivo.

Al analizar algunas de las características de quienes usan drogas, especialmente en la población de 12 a 25 años, se observa que en su mayoría son personas que ya no están estudiando y que sólo viven con su papá, además de que en el entorno social en que se mueven hay personas que consumen drogas.

Conclusiones

Los resultados muestran que en el Distrito Federal, el consumo de drogas médicas e ilegales en general es mayor que el promedio nacional, especialmente la marihuana. El porcentaje de personas dependientes al consumo de drogas es de 0.5%, que es similar al promedio nacional de 0.6%.

También se muestra que hay una mayor exposición a la oportunidad de consumo en el Distrito Federal, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la proporción con relación a los datos nacionales, es más elevada en mujeres que en hombres.

De la misma forma, la población más joven, quienes ya no estudian o que viven sólo con su papá, son quienes están más expuestos y consumen drogas en mayor proporción. Lo cual refuerza el valor protector no solo de la asistencia a la escuela, sino de la importancia de dotar de estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar. En el ámbito familiar, es importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas.

Estos datos son concordantes con los señalados por las fuentes descritas en la introducción de este documento, que señala un incremento en el consumo de sustancias en el Distrito Federal, de manera especial la cocaína y la marihuana.

alcohol

Principales resultados

En cuanto al consumo diario de alcohol, tanto en los hombres (0.6%) como en las mujeres (0.1%) está por debajo del promedio nacional.


Respecto al consumo alto, los hombres y las mujeres se encuentran por arriba de la media nacional (42.0% y 23.5% respectivamente) (figura 1).

Para el consumo consuetudinario, en los hombres (6.9%) se observa un consumo menor al nacional y ocurre lo contrario en el caso de las mujeres (2.3%), ya que su consumo es mayor al promedio (figura 2).

Finalmente, en relación con el abuso/dependencia, se encuentra que el porcentaje para los hombres (8.3%) está debajo y para las mujeres (3.2%) está por arriba del promedio nacional.

Figura 1


Consumo diario y alto de alcohol según sexo. Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Figura 2

Consumo consuetudinario y abuso/dependencia de alcohol según sexo. Distrito Federal, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Conclusiones

En el caso de alcohol, el consumo alto está por arriba del promedio nacional en ambos sexos, igual que el consumo consuetudinario y abuso/ dependencia en mujeres.

El consumo diario para ambos sexos se encuentra por debajo de la media, para el consumo consuetudinario y abuso/dependencia también se encuentra por debajo del promedio en los hombres.

Bajo este contexto, es importante canalizar mayores esfuerzos a la prevención primaria del problema, en los distintos segmentos de

la sociedad, con la intención de disminuir la problemática y, de manera especial, trabajar con la población infantil, a fin de dotar a esta comunidad de mejores estrategias para enfrentar la problemática y tener mejores oportunidades de vida.

El incremento en el número de usuarios/as fuertes y los problemas asociados, nos indica la necesidad prioritaria de atender adecuadamente y con estrategias efectivas a quienes se encuentran en el proceso de adicción al consumo.

referencias y glosario

Referencias

1. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Primera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
2. Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Segunda Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1993.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
4. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática. Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 2002.
5. Villatoro J, Gutiérrez M, Quiroz N, Moreno M, Gaytán L, Gaytán F *et al.* Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. México DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2007.
6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Tratamiento no Gubernamentales. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
7. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Integración Juvenil. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Consejo Tutelar para Menores. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.

Tabaco

Adolescente: en la encuesta, persona de 12 a 17 años de edad.

Adulto: en la encuesta, persona de 18 a 65 años de edad.

Ex fumador: persona que al momento de la entrevista refirió haber dejado de fumar cigarros hace más de un año.

Fumador actual: persona que al momento de la entrevista refirió haber fumado cigarros al menos una vez durante el año previo a la entrevista.

Fumador pasivo: persona que refirió nunca haber fumado, que convive a diario con al menos una persona que fuma cigarros en su casa, en el salón de clases o en su trabajo.

Localidad rural: localidad con menos de 2 500 habitantes.

Localidad urbana: localidad con 2 500 habitantes o más.

Nunca fumador: persona que al momento de la entrevista refirió nunca haber fumado cigarros en su vida.

Drogas

Drogas ilegales: las drogas consideradas como ilegales son: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o estimulantes tipo anfetamínico (metanfetaminas).

Drogas médicas: son aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Para considerarse como consumo para drogarse, el uso se debe dar fuera de o en mayor tiempo al prescrito por el médico.

Incidencia acumulada: se refiere a la prevalencia global de consumo.

Consumo en los últimos 12 meses: consumo de alguna sustancia en los últimos 12 meses; también se le conoce como prevalencia anual.

Consumo en los últimos 30 días: Consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días; también se le conoce como prevalencia actual.

Índice de continuidad: es el porcentaje obtenido de dividir el número de usuarios del último año entre el número de usuarios que han consumido alguna vez.

Formas de uso: vía de utilización de las distintas drogas ilegales. En el cuestionario se les pregunta si las usaron en forma inyectada, inhalada, aspirada, fumada, tomada, tragada o comida.

Uso de servicios: se refiere a que la población acude en búsqueda de apoyo para sus problemas de salud. En el caso de esta encuesta se les pregunta si han solicitado ayuda por el consumo de alguna de las drogas en los siguientes lugares: hospital general o centro comunitario, hospital o servicio psiquiátrico, médicos privados, sacerdotes, curanderos, grupo de Alcohólicos Anónimos u otros.

Mariguana regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido esta sustancia regalada o para su compra.

Cualquier droga regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, sea regalada o para su compra.

Otra droga regalada o comprada: se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, a excepción de la marihuana, sea regalada o para su compra.

Índice de exposición a drogas: es la oportunidad que tienen los sujetos de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

Consumo experimental: es cuando una persona reporta haber usado entre una y cinco veces una o más sustancias.

Consumo regular: es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones.

Dependencia a drogas: es cuando una persona reporta haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo.

Remisión por uso de drogas: se refiere a cuando una persona asistió a tratamiento debido a su consumo de drogas.

Uso dada la oportunidad: se refiere a las personas que consumen drogas y que reportaron que previamente se les había ofrecido alguna sustancia.

Dependencia dado el abuso: se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

Remisión dado el abuso: se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su abuso de drogas.

Remisión dada la dependencia: se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su dependencia hacia las drogas.

Necesidades de atención por uso de drogas: se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de dependencia a las drogas, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

Alcohol

Consumo diario: Consumir diariamente al menos una copa de una bebida con contenido de alcohol.

Bebedores altos: Aquellas personas que por lo menos alguna vez en su vida han consumido cinco copas o más en una sola ocasión, para los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión, para las mujeres.

Abuso/dependencia al alcohol: Se refiere a una concepción amplia que incluye la presencia de distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de algunas manifestaciones físicas, cognitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un malestar significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de los síntomas de este consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún momento repetitivamente dentro de los últimos 12 meses.

Equivalencias de bebidas alcohólicas: Para efectos de establecer el patrón de consumo y el consumo per cápita, se consideran las siguientes equivalencias:

Un trago o copa es igual a:

- 1 lata o botella mediana de cerveza (330 ml)
- 1 jarro o jícara de pulque de 500 ml
- 1 vaso de 120 ml de vino de mesa
- 1 vaso o copa de destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra (30 ml)
- 1 botella "coolers" de vino (300 ml)
- 1 copa "farolazo" (30 ml)

Necesidades de atención por consumo de alcohol: Se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de abuso/

dependencia al alcohol, el segundo valor es el de presentar algún problema de abuso/dependencia, sin que reúna el criterio de abuso/dependencia completo. El tercer valor de riesgo consiste en haber consumido cinco copas (hombres) o cuatro copas (mujeres) alguna vez en la vida, sin incluirse en las categorías anteriores. Finalmente, la cuarta categoría corresponde a quienes no han consumido alcohol o que su consumo ha sido muy bajo.

Conceptos de metodología

Estudios epidemiológicos: Una visión global del problema se obtiene utilizando diferentes estrategias que permiten conocer la extensión y magnitud del consumo en diferentes grupos de población; para interpretar sus resultados es necesario que se tome en cuenta sus características propias, ventajas y desventajas. Los porcentajes de consumo que se anexan en la sección de antecedentes y que provienen de estas dos fuentes no son estrictamente comparables. Permiten sin embargo determinar si han existido cambios en los índices con el tiempo, en las diferencias por sexo o por tipo de droga. Los siguientes apartados guían al lector sobre los diferentes estudios que se citan en la sección de antecedentes en cada estado, a fin de facilitar su lectura adecuada.

Encuestas en población escolar sobre adicciones: Las encuestas de escuelas tienen la ventaja de ser autoaplicables. Las encuestas que se citan en la sección de antecedentes se aplicaron en forma colectiva sin identificar al sujeto, la última unidad de análisis es el grupo escolar y sólo participa un encuestador/a por grupo sin la presencia de maestros/as o autoridades de la escuela. El método facilita las respuestas de los/as estudiantes y regularmente se obtienen resultados más elevados que en las encuestas en hogares. Tienen como desventaja el excluir a la población joven que ya no está en la escuela, haberse aplicado en un rango corto de edad de los 12 a 19 años (sólo cuando se incluyen estudiantes de licenciatura el rango se incrementa hacia los 25 años), los estudios hechos en 1991, aquellos hechos en la Ciudad de México y que se han ampliado a partir del 2000 en diversos estados, abarcan población rural y urbana.

Encuestas en hogares sobre adicciones: Las encuestas de hogares abarcan a un rango más amplio de población, incluyen población de 12 a 65 años, abarcan población urbana y rural incluyen población adolescente y adulta que asiste y no asiste a la escuela e incluyen viviendas desde las que se ubican en grandes metrópolis hasta viviendas ubicadas en municipios poco habitados y con índices más bajos de consumo, además al ser autoaplicables tienden a tener un índice más alto de baja

respuesta. En estos estudios se elige en forma aleatoria a uno o más individuos en el hogar, una vez aplicada una cédula de la vivienda. La entrevista regularmente se hace cara a cara y la persona entrevistada sabe que el/a entrevistador/a conoce su nombre y la ubicación de su domicilio. El/a participante elige si participa o no y se le da un formato de consentimiento informado. Dado que es una entrevista cara a cara, la aplicación se realiza en forma individual. Ante ello, es importante que el/la entrevistador/a tenga un alto grado de entrenamiento y manejo de la situación de entrevista, a fin de dirigirla en forma ágil y que se gane la confianza del/a entrevistado/a para que se obtengan respuestas reales, especialmente en temas difíciles como el consumo de drogas o situaciones problemáticas asociadas al consumo. Comúnmente en nuestro país, la población objetivo de estos estudios es aquella que vive en sus hogares, entre los 12 y 65 años de edad y que sepan hablar español.

Estudios con usuarios de drogas (SISVEA, CIJ): Estos estudios se llevan a cabo con población ya consumidora de drogas y que decide asistir a una opción de tratamiento debido a su consumo de drogas, por lo que el 100% de las personas consumen drogas. Por lo común, se aplica una cédula estandarizada sobre el consumo y abuso de diversas drogas y elementos que permiten obtener el perfil de los/as usuarios/as, la aplicación se realiza la primera vez que el/a usuario/a asiste al centro de tratamiento y se aplica en forma de entrevista cara a cara. Debido a estas

situaciones es que los porcentajes de consumo derivados de estos estudios son más altos que en la población de los dos estudios anteriores. Adicionalmente, la proporción de hombres que van a este tipo de tratamiento es mucho mayor, aunque recientemente se está incrementando el número de mujeres que solicitan ayuda por su consumo de droga.

Ante las diferencias en el método y poblaciones de estos tipos de estudios, un punto central para determinar congruencia entre lo que se reporta en unos y otros, es principalmente el orden de preferencia de las drogas, que debe ser similar entre ellos, aunque cuando se da un cambio importante en las preferencias, éste se registra dos o tres años después en los estudios con usuarios de drogas, ya que primero se detecta en los estudios con escolares y población general. Hacer una comparación de prevalencias es posible aunque inadecuado, ya que los rangos de edad no son iguales y los métodos de aplicación de los cuestionarios no son iguales. Otro punto de interés para comparar resultados es la detección de casos de consumo de drogas de más difícil acceso, si está presente el consumo de una droga en el estado, en los tres ámbitos de estudio señalados, debe aparecer la presencia de la droga.

Finalmente, internacionalmente y en el país, es común que las cifras de consumo en hogares son menores a las detectadas en escolares. En el caso de usuarios/as no hay comparación en el indicador, debido a que en el denominador sólo hay usuarios/as.

anexos

A. Drogas

Resultados del estado

Intervalos de confianza

B. Alcohol

Resultados estatales

Intervalos de confianza

C. Estadísticas de fuentes estatales sobre
antecedentes de consumo de drogas

Resultados del estado

Cuadro A1

Características sociodemográficas según sexo de la población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Características	Hombres			Mujeres			Total		
	12-17 años	18-25 años	26-65 años	12-17 años	18-25 años	26-65 años	12-17 años	18-25 años	26-65 años
Sociodemográficas	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Situación Escolar									
Estudia actualmente	83.9	38.1	2.7	91.3	40.0	2.0	87.7	39.0	2.3
No estudia	16.1	61.9	97.3	8.7	60.0	98.0	12.3	61.0	97.7
Nivel de Estudios									
Ninguna/primaria	16.0	5.6	21.0	22.3	4.0	25.4	19.2	4.8	23.5
Secundaria	63.4	21.7	34.9	47.5	17.9	37.9	55.2	19.8	36.6
Bachillerato o equivalente	19.9	56.0	37.0	30.2	61.4	32.1	25.2	58.7	34.2
Licenciatura	.6	16.7	7.1	--	16.7	4.6	.3	16.7	5.7
Posgrado	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situación Laboral									
Trabaja	14.0	64.0	89.9	2.8	37.0	49.4	8.2	50.8	67.8
Ama de casa	--	1.6	--	2.2	24.6	44.8	1.1	12.8	24.6
Desempleado	86.0	34.4	10.1	95.0	38.4	5.7	90.7	36.4	7.7
Vive con									
Padre y Madre	76.4	57.2	13.3	64.0	50.6	8.0	70.0	54.0	10.4
Sólo padre	3.2	2.8	1.5	1.4	1.4	2.3	2.3	2.1	1.9
Sólo madre	18.3	21.1	10.5	25.8	15.1	10.0	22.1	18.2	10.2
Otro	2.1	18.9	74.7	8.8	32.8	79.7	5.6	25.7	77.5
Estado Civil									
Casado/unión libre	.6	21.3	72.3	.8	32.1	66.2	.7	26.5	69.0
Separado/viudo/divorciado	--	1.8	5.9	.4	6.1	15.4	.2	3.9	11.1
Soltero	99.4	76.9	21.9	98.8	61.9	18.4	99.1	69.6	20.0

*Porcentajes obtenidos de la población total por columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A2

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas según sexo, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 2 919 506		Mujeres 3 567 070		Total 6 486 576	
	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	2 540 423	87.0	2 756 119	77.3	5 296 542	81.7
Sigue igual	338 669	11.6	690 062	19.3	1 028 731	15.9
Parece que va disminuyendo	40 414	1.4	120 889	3.4	161 303	2.5

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A3

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 2 191 364		26-34 años 1 527 592		35-65 años 2 767 620	
	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	1 703 047	77.7	1 303 707	85.3	2 289 788	82.7
Sigue igual	446 285	20.4	202 891	13.3	379 555	13.7
Parece que va disminuyendo	42 032	1.9	20 994	1.4	98 277	3.6

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A4

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en hombres. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 951 471		26-34 años 710 214		35-65 años 1 257 821	
	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	778 930	81.9	632 747	89.1	1 128 746	89.7
Sigue igual	162 657	17.1	62 902	8.9	113 110	9.0
Parece que va disminuyendo	9 884	1.0	14 565	2.1	15 965	1.3

*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A5

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en mujeres. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 1 239 893		26-34 años 817 378		35-65 años 1 509 799	
	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México						
Ha incrementado el número de usuarios	924 117	74.5	670 960	82.1	1 161 042	76.9
Sigue igual	283 628	22.9	139 989	17.1	266 445	17.6
Parece que va disminuyendo	32 148	2.6	6 429	.8	82 312	5.5

*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A6

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas según sexo, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 2 919 506		Mujeres 3 567 070		Total 6 486 576	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:						
Enferma	1 459 455	50.0	1 974 826	55.4	3 434 281	52.9
Débil	950 021	32.5	896 572	25.1	1 846 593	28.5
Independiente	177 550	6.1	180 154	5.1	357 704	5.5
Egoísta	176 141	6.0	229 181	6.4	405 322	6.2
Que necesita ayuda	1 685 263	57.7	2 105 879	59.0	3 791 142	58.4
Delincuente	374 581	12.8	643 787	18.0	1 018 368	15.7

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A7

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 2 191 364		26-34 años 1 527 592		35-65 años 2 767 620	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:						
Enferma	1 121 074	51.2	891 930	58.4	1 421 277	51.4
Débil	691 685	31.6	387 103	25.3	767 805	27.7
Independiente	166 190	7.6	107 793	7.1	83 721	3.0
Egoísta	118 224	5.4	173 578	11.4	113 520	4.1
Que necesita ayuda	1 390 047	63.4	785 171	51.4	1 615 924	58.4
Delincuente	342 714	15.6	228 141	14.9	447 513	16.2

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A8

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en hombres. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 951 471		26-34 años 710 214		35-65 años 1 257 821	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:						
Enferma	501 612	52.7	334 297	47.1	623 546	49.6
Débil	297 245	31.2	231 173	32.5	421 603	33.5
Independiente	47 563	5.0	63 238	8.9	66 749	5.3
Egoísta	38 324	4.0	67 097	9.4	70 720	5.6
Que necesita ayuda	546 169	57.4	369 643	52.0	769 451	61.2
Delincuente	210 697	22.1	16 374	2.3	147 510	11.7

*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A9

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en mujeres. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 1 239 893		26-34 años 817 378		35-65 años 1 509 799	
	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:						
Enferma	619 462	50.0	557 633	68.2	797 731	52.8
Débil	394 440	31.8	155 930	19.1	346 202	22.9
Independiente	118 627	9.6	44 555	5.5	16 972	1.1
Egoísta	79 900	6.4	106 481	13.0	42 800	2.8
Que necesita ayuda	843 878	68.1	415 528	50.8	846 473	56.1
Delincuente	132 017	10.6	211 767	25.9	300 003	19.9

*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A10

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 2 919 506		Mujeres 3 567 070		Total 6 486 576	
	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción:						
Mariguana	2 472 922	84.7	2 998 777	84.1	5 471 699	84.4
Alucinógenos	1 942 085	66.5	2 232 101	62.6	4 174 186	64.4
Cocaína	2 556 127	87.6	2 876 819	80.6	5 432 946	83.8
Heroína	2 128 119	72.9	2 303 884	64.6	4 432 003	68.3
Inhalables	2 033 911	69.7	2 288 842	64.2	4 322 753	66.6
Alcohol	2 264 426	77.6	2 659 693	74.6	4 924 119	75.9
Tabaco	2 083 019	71.3	2 398 076	67.2	4 481 095	69.1

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A11

Percepción de la población total sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias, por grupos de edad. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 2 191 364		26-34 años 1 527 592		35-65 años 2 767 620	
	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción:						
Mariguana	1 852 287	84.5	1 330 375	87.1	2 289 037	82.7
Alucinógenos	1 374 533	62.7	975 962	63.9	1 823 691	65.9
Cocaína	1 787 316	81.6	1 279 968	83.8	2 365 662	85.5
Heroína	1 414 419	64.5	1 081 030	70.8	1 936 554	70.0
Inhalables	1 432 705	65.4	1 010 480	66.1	1 879 568	67.9
Alcohol	1 668 902	76.2	1 145 417	75.0	2 109 800	76.2
Tabaco	1 495 350	68.2	1 069 747	70.0	1 915 998	69.2

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A12

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia, según sexo. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 2 919 506		Mujeres 3 567 070		Total 6 486 576	
	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:						
Que los metan en la cárcel	92 377	3.2	60 586	1.7	152 963	2.4
Que los internen en hospitales psiquiátricos	448 489	15.7	696 331	19.9	1 144 820	18.0
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	1 273 528	44.6	1 614 186	46.2	2 887 714	45.5
Curarles en su propio ambiente	660 192	23.1	748 856	21.4	1 409 048	22.2
Que se curen por su cuenta	258 215	9.0	277 620	7.9	535 835	8.4
Otra	124 737	4.4	94 765	2.7	219 502	3.5

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A13

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia, por grupos de edad. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 2 191 364		26-34 años 1 527 592		35-65 años 2 767 620	
	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:						
Que los metan en la cárcel	40 984	1.9	31 878	2.2	80 101	3.0
Que los internen en hospitales psiquiátricos	397 225	18.2	272 425	18.7	475 170	17.6
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	1 066 287	48.8	661 717	45.3	1 159 710	42.9
Curarles en su propio ambiente	500 159	22.9	255 246	17.5	653 643	24.2
Que se curen por su cuenta	166 708	7.6	156 867	10.7	212 260	7.9
Otra	15 359	.7	81 103	5.6	123 040	4.6

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A14

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud, según sexo. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 2 919 506		Mujeres 3 567 070		Total 6 486 576	
	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:						
La violencia familiar y social	2 513 273	86.1	3 192 923	89.5	5 706 196	88.0
Los accidentes	2 442 535	83.7	3 113 980	87.3	5 556 515	85.7
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA						
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	2 577 087	88.3	3 397 653	95.3	5 974 740	92.1

*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A15

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud, por grupos de edad. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 2 191 364		26-34 años 1 527 592		35-65 años 2 767 620	
	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:						
La violencia familiar y social	1 941 524	88.6	1 317 782	86.3	2 446 890	88.4
Los accidentes	1 882 116	85.9	1 338 993	87.7	2 335 406	84.4
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA						
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	1 964 784	89.7	1 455 431	95.3	2 554 525	92.3

*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A16

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada, según edad y sexo. Distrito Federal, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Hombres					
12 - 25	1 098 504	311 616	28.4	129 290	11.8
26 - 34	592 560	334 440	56.4	138 321	23.3
35 - 65	1 349 257	395 024	29.3	157 648	11.7
Subtotal	3 040 321	1 041 080	34.2	425 259	14.0
Mujeres					
12 - 25	1 093 369	208 922	19.1	88 498	8.1
26 - 34	735 280	71 830	9.8	17 469	2.4
35 - 65	1 617 604	102 152	6.3	27 232	1.7
Subtotal	3 446 253	382 904	11.1	133 199	3.9
Total	6 486 574	1 423 984	22.0	558 458	8.6

*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A17

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada, según edad y sexo. Distrito Federal, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
Hombres					
12 – 25	1 098 504	317 148	28.9	133 844	12.2
26 – 34	592 560	337 159	56.9	153 906	26.0
35 – 65	1 349 257	410 812	30.4	170 743	12.7
Subtotal	3 040 321	1 065 119	35.0	458 493	15.1
Mujeres					
12 – 25	1 093 369	225 202	20.6	93 368	8.5
26 – 34	735 280	75 838	10.3	17 469	2.4
35 – 65	1 617 604	115 762	7.2	27 232	1.7
Subtotal	3 446 253	416 802	12.1	138 069	4.0
Total	6 486 574	1 481 921	22.8	596 562	9.2

*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A18

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 12 a 25 años. Distrito Federal, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	1 098 504	311 616	28.4	129 290	11.8
Mujeres	1 093 369	208 922	19.1	88 498	8.1
Situación Escolar					
Estudiante	1 286 856	308 816	24.0	158 792	12.3
No estudiante	905 017	211 722	23.4	58 996	6.5
Nivel de Escolaridad					
Ninguna/primaria	229 395	21 826	9.5	--	--
Secundaria	732 890	166 280	22.7	67 122	9.2
Bachillerato o equivalente	943 240	254 193	26.9	114 168	12.1
Licenciatura	207 536	70 796	34.1	31 783	15.3
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación Laboral					
Trabaja actualmente	736 007	163 170	22.2	73 411	10.0
Ama de casa	176 961	50 560	28.6	12 764	7.2
Desempleado	1 278 905	306 808	24.0	131 613	10.3
Nivel de Ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	625 675	98 849	15.8	38 221	6.1
De 3 a 6 salarios mínimos	1 030 027	270 581	26.3	116 819	11.3
Más de 6 salarios mínimos	167 888	52 743	31.4	22 773	13.6
Vive con					
Padre y madre	1 325 801	321 390	24.2	131 413	9.9
Sólo padre	47 660	17 083	35.8	6 351	13.3
Sólo madre	433 793	113 278	26.1	49 428	11.4
Otro	384 619	68 787	17.9	30 596	8.0

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A19

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 26 a 34 años. Distrito Federal, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	592 560	334 440	56.4	138 321	23.3
Mujeres	735 280	71 830	9.8	17 469	2.4
Situación escolar					
Estudiante	48 724	24 487	50.3	--	--
No estudiante	1 279 116	381 783	29.8	155 790	12.2
Nivel de escolaridad					
Ninguna/primaria	123 587	13 528	10.9	6 465	5.2
Secundaria	381 960	119 941	31.4	44 374	11.6
Bachillerato o equivalente	524 169	169 087	32.3	69 395	13.2
Licenciatura	57 190	31 637	55.3	7 738	13.5
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación laboral					
Trabaja actualmente	943 702	333 330	35.3	130 663	13.8
Ama de casa	302 680	29 647	9.8	11 850	3.9
Desempleado	81 458	43 293	53.1	13 277	16.3
Nivel de ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	407 666	118 701	29.1	48 452	11.9
De 3 a 6 salarios mínimos	591 483	175 165	29.6	53 930	9.1
Más de 6 salarios mínimos	174 595	76 799	44.0	41 024	23.5
Estado civil					
Casado/unión libre	853 618	215 596	25.3	92 605	10.8
Separado/viudo/divorciado	52 274	24 871	47.6	--	--
Soltero	421 948	165 803	39.3	63 185	15.0

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A20

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 35 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	1 349 257	395 024	29.3	157 648	11.7
Mujeres	1 617 604	102 152	6.3	27 232	1.7
Situación Escolar					
Estudiante	50 991	19 492	38.2	6 167	12.1
No estudiante	2 915 870	477 684	16.4	178 713	6.1
Nivel de Escolaridad					
Ninguna/primaria	721 674	74 652	10.3	28 280	3.9
Secundaria	934 012	102 155	10.9	41 417	4.4
Bachillerato o equivalente	707 535	145 564	20.6	34 384	4.9
Licenciatura	146 422	59 482	40.6	15 793	10.8
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación Laboral					
Trabaja actualmente	1 966 219	422 213	21.5	135 004	6.9
Ama de casa	752 509	17 063	2.3	12 535	1.7
Desempleado	248 133	57 900	23.3	37 341	15.0
Nivel de Ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	1 006 847	140 778	14.0	31 595	3.1
De 3 a 6 salarios mínimos	1 329 118	214 176	16.1	101 282	7.6
Más de 6 salarios mínimos	286 427	87 452	30.5	33 833	11.8
Estado Civil					
Casado/unión libre	2 108 172	347 465	16.5	141 174	6.7
Separado/viudo/divorciado	423 021	74 966	17.7	30 683	7.3
Soltero	435 668	74 745	17.2	13 023	3.0

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A21

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios. Distrito Federal, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
Sexo					
Hombres	3 040 321	1 065 119	35.0	458 493	15.1
Mujeres	3 446 253	416 802	12.1	138 069	4.0
Situación Escolar					
Estudiante	1 386 571	359 356	25.9	174 383	12.6
No estudiante	5 100 003	1 122 565	22.0	422 179	8.3
Nivel de Escolaridad					
Ninguna/primaria	1 074 656	111 441	10.4	34 745	3.2
Secundaria	2 048 862	403 228	19.7	160 642	7.8
Bachillerato o equivalente	2 174 944	599 382	27.6	245 235	11.3
Licenciatura	411 148	169 019	41.1	58 401	14.2
Posgrado	--	--	--	--	--
Situación Laboral					
Trabaja actualmente	3 645 928	951 357	26.1	366 269	10.0
Ama de casa	1 232 150	111 588	9.1	37 149	3.0
Desempleado	1 608 496	418 976	26.0	193 144	12.0
Nivel de Ingresos					
Hasta 2 salarios mínimos	2 040 188	374 738	18.4	123 647	6.1
De 3 a 6 salarios mínimos	2 950 628	693 216	23.5	302 406	10.2
Más de 6 salarios mínimos	628 910	221 002	35.1	97 630	15.5
Estado Civil					
Casado/unión libre	3 314 441	662 212	20.0	285 145	8.6
Separado/viudo/divorciado	528 112	134 113	25.4	34 811	6.6
Soltero	2 644 021	685 596	25.9	276 606	10.5
Vive con					
Padre y madre	1 773 160	464 943	26.2	179 422	10.1
Sólo padre	130 237	36 750	28.2	20 432	15.7
Sólo madre	872 226	245 653	28.2	105 889	12.1
Otro	3 710 951	734 575	19.8	290 819	7.8

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A22

Incidencia acumulada para el uso de cualquier droga en la población total según edad y sexo. Distrito Federal, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
Hombres							
12 – 17	429 848	33 494	7.8	33 494	7.8	1 863	.4
18 – 34	1 261 216	209 801	16.6	209 801	16.6	40 866	3.2
35 – 65	1 349 257	138 402	10.3	128 710	9.5	37 807	2.8
Subtotal	3 040 321	381 697	12.6	372 005	12.2	80 536	2.6
Mujeres							
12 – 17	457 033	38 458	8.4	30 574	6.7	9 451	2.1
18 – 34	1 371 616	81 860	6.0	71 748	5.2	15 874	1.2
35 – 65	1 617 604	47 595	2.9	31 737	2.0	17 955	1.1
Subtotal	3 446 253	167 913	4.9	134 059	3.9	43 280	1.3
Total	6 486 574	549 610	8.5	506 064	7.8	123 816	1.9

*Porcentajes obtenidos según sexo y edad definidos en los renglones para cada tipo de droga
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A23

Incidencia acumulada del consumo de drogas según sexo en la población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo Drogas	Hombres 3 040 321		Mujeres 3 446 253		Total 6 486 574	
	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	9 384	.3	9 701	.3	19 085	.3
Tranquilizantes	41 842	1.4	30 035	.9	71 877	1.1
Sedantes	24 319	.8	--	--	24 319	.4
Anfetaminas o estimulantes	39 554	1.3	7 486	.2	47 040	.7
Mariguana	329 375	10.8	100 883	2.9	430 258	6.6
Cocaína**	172 520	5.7	29 803	.9	202 323	3.1
Crack	71 610	2.4	16 485	.5	88 095	1.4
Alucinógenos	51 413	1.7	17 449	.5	68 862	1.1
Inhalables	70 889	2.3	16 290	.5	87 179	1.3
Heroína opio	24 581	.8	2 350	.1	26 931	.4
Estimulante tipo anfetamínico	44 781	1.5	6 207	.2	50 988	.8
Otras drogas	10 508	.3	708	***	11 216	.2
Cualquier droga	381 697	12.6	167 913	4.9	549 610	8.5
Drogas ilegales	372 005	12.2	134 059	3.9	506 064	7.8
Drogas médicas	80 536	2.6	43 280	1.3	123 816	1.9

*Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo definido en las columnas

**Cocaína también incluye crack

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A24

Edad de inicio del consumo de drogas de los usuarios de cada sustancia. Distrito Federal, México, 2008

Drogas	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
	%	%	%	%
Opiáceos	30.4	69.6	--	--
Tranquilizantes	56.1	32.2	1.8	9.9
Sedantes	46.7	53.3	--	--
Anfetaminas o estimulantes	38.6	8.9	39.2	13.3
Mariguana	52.7	43.2	4.1	--
Cocaína	34.0	46.8	19.2	--
Crack	36.4	47.6	16.0	--
Alucinógenos	29.8	54.6	15.6	--
Inhalables	68.8	31.2	--	--
Heroína opio	29.4	58.3	12.4	--
Estimulante tipo anfetamínico	66.1	33.9	--	--
Otras drogas	32.9	67.1	--	--
Cualquier droga	52.6	41.0	5.0	1.3

*Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A25

Relación entre mecanismos involucrados en la exposición y el uso de mariguana y otras drogas. Distrito Federal, México, 2008

N por subgrupo	Mariguana 430 258		Otras drogas 327 996		Cualquier droga 549 610	
	Exposición					
	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	47 834	1.0	55 133	1.1	95 493	1.9
Mariguana regalada	112 373	16.2	27 672	4.0	134 842	19.5
Otra droga regalada	--	--	14 051	25.6	14 051	25.6
Mariguana comprada	27 010	12.3	20 377	9.3	33 191	15.1
Otra droga comprada	2 639	25.1	5 660	53.8	5 660	53.8
Mariguana y otra droga regalada	149 399	36.6	108 451	26.6	164 465	40.3
Mariguana y otra droga comprada	17 782	43.9	27 120	67.0	27 120	67.0
Mariguana y otra droga regalada y comprada	73 221	62.6	69 532	59.5	74 788	64.0

*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A26

Exposición a la prevención en la población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México.

N por subgrupo	12-25 años 2 191 873		26-34 años 1 327 840		35-65 años 2 966 861		Total 6 486 574	
	Lugar							
	N	%	N	%	N	%	N	%
Expuestos a la prevención	992 413	45.3	330 560	24.9	668 630	22.5	1 991 603	30.7
En la escuela	889 495	89.6	123 389	37.3	95 011	14.2	1 107 895	55.6
En el trabajo	18 666	1.9	51 534	15.6	159 623	23.9	229 823	11.5
En la comunidad	38 848	3.9	81 707	24.7	144 846	21.7	265 401	13.3

*Porcentajes obtenidos por grupo de edad definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A27

Relación del perfil sociodemográfico y su impacto en el uso de drogas población de 12 a 25 años. Distrito Federal, México, 2008

Exposición	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
Situación Escolar							
Estudia actualmente	1 386 571	107 116	8.3	103 174	8.0	7 372	.6
No estudia	5 100 003	85 726	9.5	71 672	7.9	18 852	2.1
Situación Laboral							
Trabaja	3 645 928	68 311	9.3	63 958	8.7	9 151	1.2
Ama de casa	1 232 150	20 459	11.6	14 700	8.3	5 759	3.3
Desempleado	1 608 496	104 072	8.1	96 188	7.5	11 314	.9
Vive con							
Padre y Madre	1 773 160	119 639	9.0	107 402	8.1	14 100	1.1
Solo padre	130 237	6 351	13.3	6 351	13.3	--	--
Solo madre	872 226	32 425	7.5	32 425	7.5	4 798	1.1
Otro	3 710 951	34 427	9.0	28 668	7.5	7 326	1.9
Intento suicida							
Con intento	--	--	--	--	--	--	--
Sin intento	2 191 364	223 642	10.2	189 818	8.7	49 153	2.2

*Porcentajes de impacto en el uso de drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A28

Consumo de drogas y su relación con el consumo en el entorno en la población total de 12 a 25 años. Distrito Federal, México, 2008

Exposición	N por grupo	Uso de drogas en el individuo					
		Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
Uso de drogas en el entorno		N	%	N	%	N	%
Mariguana	957 530	76 649	19.1	68 354	17.0	14 660	3.6
Cocaína	591 946	61 734	27.5	57 792	25.7	10 307	4.6
Heroína opio	139 660	17 214	29.7	13 272	22.9	10 307	17.8
Inhalables	435 892	40 981	23.7	37 039	21.4	10 307	6.0
Alucinógenos	141 375	15 885	38.0	15 885	38.0	6 365	15.2

*Porcentajes obtenidos por tipo de droga consumida en el entorno definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A29

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas, población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

	Total	
	N	%
Dependencia	33 576	0.5
Uso sin dependencia	516 034	8.0
Exposición a drogas sin consumo	1 089 145	16.8
No consumo	4 847 819	74.7

*Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad en la población total definido en las columnas
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Intervalos de confianza

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de cocaína alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de cocaína alguna vez en el cuadro de población masculina que en este caso sería 4.15%; después se busca el dato de cocaína alguna vez en el cuadro de población femenina, que es de 0.72%; de estos datos se elige el porcentaje más alto (población masculina) para considerar su columna de IC 95% (3.728-4.563); posteriormente se ubica si el valor más bajo (población femenina) está por arriba, por abajo o dentro de este intervalo de confianza.

Aquí se observa que 0.72% está por debajo de los intervalos que van de 3.728-4.563, por lo que podemos decir con una confianza de 95% que el nivel de consumo de cocaína alguna vez es más alto en los hombres en comparación con las mujeres.

Los intervalos de confianza también pueden servir para comparar distintos grupos de edad o bien entre distintas sustancias.

Se incluyen los intervalos de confianza nacionales para que cada estado pueda ver cómo se encuentra en relación con el país en general.

Cuadro A30

Consumo de drogas en la población total del país. Distrito Federal, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.14	0.090-0.195
Tranquilizantes	0.58	0.480-0.675
Sedantes	0.18	0.111-0.246
Anfetaminas	0.30	0.223-0.378
Mariguana	4.19	3.885-4.493
Cocaína	2.37	2.146-2.588
Crack	0.59	0.483-0.707
Alucinógenos	0.35	0.270-0.437
Inhalables	0.71	0.592-0.829
Heroína	0.14	0.091-0.194
Metanfetaminas	0.49	0.394-0.585
Otra droga	0.06	0.029-0.098
Cualquier droga	5.72	5.364-6.078
Drogas Médicas	1.03	0.890-1.163
Drogas Ilegales	5.22	4.871-5.564
Consumo último año		
Opiáceos	0.06	0.023-0.095
Tranquilizantes	0.15	0.112-0.198
Sedantes	0.07	0.018-0.113
Anfetaminas	0.09	0.045-0.136
Mariguana	1.03	0.886-1.169
Cocaína	0.44	0.356-0.524
Crack	0.13	0.083-0.172
Alucinógenos	0.05	0.022-0.082
Inhalables	0.12	0.083-0.165
Heroína	0.04	0.019-0.065
Metanfetaminas	0.11	0.073-0.143
Otra droga	0.01	0.000-0.019
Cualquier droga	1.63	1.448-1.804
Drogas Médicas	0.34	0.263-0.420
Drogas Ilegales	1.40	1.234-1.566
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.017
Tranquilizantes	0.08	0.046-0.107
Sedantes	0.03	0.000-0.065
Anfetaminas	0.03	0.010-0.058
Mariguana	0.67	0.552-0.787
Cocaína	0.27	0.201-0.333
Crack	0.05	0.023-0.083
Alucinógenos	0.02	0.002-0.033
Inhalables	0.07	0.037-0.103
Heroína	0.01	0.000-0.021
Metanfetaminas	0.07	0.043-0.099
Otra droga	0.01	0.000-0.018
Cualquier droga	1.00	0.853-1.141
Drogas Médicas	0.15	0.094-0.198
Drogas Ilegales	0.90	0.761-1.038

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A31

Consumo de drogas en la población masculina del país. Distrito Federal, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.14	0.071-0.206
Tranquilizantes	0.75	0.581-0.910
Sedantes	0.25	0.126-0.365
Anfetaminas	0.44	0.292-0.587
Mariguana	7.19	6.634-7.741
Cocaína	4.15	3.728-4.563
Crack	1.03	0.810-1.244
Alucinógenos	0.59	0.441-0.730
Inhalables	1.28	1.042-1.511
Heroína	0.27	0.167-0.372
Metanfetaminas	0.79	0.617-0.969
Otra droga	0.10	0.033-0.166
Cualquier droga	9.13	8.501-9.755
Drogas Médicas	1.27	1.055-1.484
Drogas Ilegales	8.77	8.146-9.384
Consumo último año		
Opiáceos	0.03	0.000-0.059
Tranquilizantes	0.16	0.097-0.223
Sedantes	0.09	0.007-0.178
Anfetaminas	0.13	0.041-0.212
Mariguana	1.73	1.472-1.984
Cocaína	0.76	0.603-0.920
Crack	0.23	0.145-0.316
Alucinógenos	0.09	0.028-0.144
Inhalables	0.21	0.132-0.284
Heroína	0.08	0.034-0.116
Metanfetaminas	0.16	0.099-0.229
Otra droga	0.02	0.000-0.040
Cualquier droga	2.49	2.176-2.797
Drogas Médicas	0.36	0.241-0.484
Drogas Ilegales	2.33	2.028-2.633
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.013
Tranquilizantes	0.07	0.027-0.118
Sedantes	0.05	0.000-0.115
Anfetaminas	0.06	0.009-0.108
Mariguana	1.18	0.963-1.389
Cocaína	0.46	0.332-0.579
Crack	0.11	0.048-0.173
Alucinógenos	0.02	0.000-0.045
Inhalables	0.14	0.070-0.203
Heroína	0.02	0.000-0.044
Metanfetaminas	0.11	0.060-0.166
Otra droga	0.01	0.000-0.037
Cualquier droga	1.65	1.391-1.911
Drogas Médicas	0.18	0.086-0.275
Drogas Ilegales	1.57	1.313-1.822

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro A32

Consumo de drogas en la población femenina del país. Distrito Federal, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.15	0.066-0.226
Tranquilizantes	0.42	0.318-0.527
Sedantes	0.12	0.056-0.178
Anfetaminas	0.17	0.110-0.234
Mariguana	1.42	1.181-1.650
Cocaína	0.72	0.576-0.870
Crack	0.19	0.118-0.271
Alucinógenos	0.14	0.049-0.230
Inhalables	0.19	0.119-0.256
Heroína	0.02	0.000-0.052
Metanfetaminas	0.21	0.135-0.283
Otra droga	0.03	0.003-0.057
Cualquier droga	2.57	2.262-2.878
Drogas Médicas	0.80	0.647-0.956
Drogas Ilegales	1.94	1.660-2.215
Consumo último año		
Opiáceos	0.09	0.024-0.149
Tranquilizantes	0.15	0.092-0.209
Sedantes	0.04	0.000-0.085
Anfetaminas	0.06	0.019-0.096
Mariguana	0.38	0.255-0.502
Cocaína	0.14	0.079-0.206
Crack	0.03	0.000-0.064
Alucinógenos	0.02	0.000-0.044
Inhalables	0.05	0.012-0.081
Heroína	0.01	0.000-0.036
Metanfetaminas	0.06	0.025-0.086
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.83	0.661-1.001
Drogas Médicas	0.32	0.221-0.423
Drogas Ilegales	0.54	0.399-0.680
Consumo último mes		
Opiáceos	0.01	0.000-0.026
Tranquilizantes	0.08	0.040-0.122
Sedantes	0.01	0.000-0.030
Anfetaminas	0.01	0.002-0.020
Mariguana	0.20	0.105-0.298
Cocaína	0.09	0.037-0.147
Crack	0.00	0.000-0.002
Alucinógenos	0.02	0.000-0.035
Inhalables	0.01	0.000-0.017
Heroína	0.00	0.000-0.000
Metanfetaminas	0.03	0.009-0.055
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.39	0.273-0.511
Drogas Médicas	0.11	0.068-0.162
Drogas Ilegales	0.28	0.171-0.391

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados estatales

Cuadro B1

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 435	.8	258 972	33.3
Baja California	6 119	.3	420 914	18.4
Baja California Sur	2 650	.6	125 068	30.4
Campeche	2 758	.5	159 776	28.5
Coahuila	12 239	.7	334 852	18.2
Colima	4 149	1.0	94 042	22.0
Chiapas	32 651	1.1	429 753	14.0
Chihuahua	38 797	1.6	650 901	27.3
Distrito Federal	19 578	.3	2 086 555	32.2
Durango	8 472	.8	250 263	23.7
Guanajuato	9 638	.3	733 743	21.5
Guerrero	12 360	.6	561 476	27.1
Hidalgo	24 135	1.4	498 757	29.8
Jalisco	72 715	1.5	1 497 921	31.1
Estado de México	50 145	.5	2 850 223	26.8
Michoacán	46 278	1.7	902 705	33.4
Morelos	11 394	1.0	409 116	35.6
Nayarit	8 419	1.3	221 084	32.9
Nuevo León	40 089	1.3	947 170	29.7
Oaxaca	24 813	1.0	531 783	22.3
Puebla	34 557	.9	1 127 782	29.4
Querétaro	25 062	2.1	374 771	31.1
Quintana Roo	18 316	1.9	287 795	30.4
San Luis Potosí	15 662	.9	399 486	23.9
Sinaloa	10 691	.6	469 343	25.2
Sonora	3 101	.2	504 802	28.6
Tabasco	14 683	1.0	369 327	25.6
Tamaulipas	14 111	.6	626 093	27.7
Tlaxcala	5 881	.8	249 721	32.0
Veracruz	22 298	.4	1 101 373	21.8
Yucatán	10 155	.8	261 287	19.3
Zacatecas	14 522	1.6	279 184	30.0
Nacional	622 873	.8	20 016 038	26.6

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B2

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	42 736	5.5	61 232	7.9
Baja California	113 508	5.0	34 615	1.5
Baja California Sur	27 705	6.7	21 492	5.2
Campeche	39 467	7.0	44 919	8.0
Coahuila	101 629	5.5	82 313	4.5
Colima	26 086	6.1	12 942	3.0
Chiapas	85 627	2.8	77 213	2.5
Chihuahua	218 191	9.2	112 518	4.7
Distrito Federal	287 497	4.4	364 085	5.6
Durango	72 254	6.8	65 541	6.2
Guanajuato	138 013	4.0	77 977	2.3
Guerrero	78 952	3.8	124 548	6.0
Hidalgo	109 552	6.6	114 527	6.8
Jalisco	309 877	6.4	273 703	5.7
Estado de México	481 829	4.5	621 799	5.8
Michoacán	155 019	5.7	209 659	7.8
Morelos	63 858	5.6	96 298	8.4
Nayarit	51 827	7.7	66 706	9.9
Nuevo León	303 269	9.5	158 254	5.0
Oaxaca	105 220	4.4	129 098	5.4
Puebla	152 070	4.0	296 095	7.7
Querétaro	87 535	7.3	104 334	8.7
Quintana Roo	76 222	8.0	66 162	7.0
San Luis Potosí	100 235	6.0	103 040	6.2
Sinaloa	106 197	5.7	90 975	4.9
Sonora	95 430	5.4	83 223	4.7
Tabasco	55 383	3.8	78 184	5.4
Tamaulipas	188 889	8.4	140 001	6.2
Tlaxcala	20 007	2.6	45 983	5.9
Veracruz	173 120	3.4	284 275	5.6
Yucatán	60 201	4.4	47 116	3.5
Zacatecas	59 056	6.4	79 236	8.5
Nacional	3 986 461	5.3	4 168 063	5.5

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B3

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 306	1.7	180 946	48.9
Baja California	5 280	.5	271 534	23.6
Baja California Sur	1 141	.5	86 504	41.1
Campeche	1 734	.6	112 232	40.9
Coahuila	11 905	1.3	245 299	27.0
Colima	2 982	1.4	63 474	30.4
Chiapas	31 232	2.1	300 586	20.2
Chihuahua	37 388	3.2	480 826	40.8
Distrito Federal	16 738	.6	1 277 221	42.0
Durango	8 335	1.6	190 757	37.6
Guanajuato	4 727	.3	510 442	32.2
Guerro	11 867	1.2	401 325	41.1
Hidalgo	20 172	2.6	366 493	46.6
Jalisco	69 376	3.0	1 004 752	42.9
Estado de México	31 552	.6	1 950 777	38.0
Michoacán	31 268	2.5	613 879	48.7
Morelos	8 061	1.5	260 788	49.1
Nayarit	8 049	2.5	144 065	44.0
Nuevo León	33 502	2.1	751 569	47.5
Oaxaca	21 892	2.0	397 770	35.8
Puebla	27 203	1.5	825 845	45.9
Querétaro	23 062	4.0	262 724	45.9
Quintana Roo	16 132	3.4	192 220	40.1
San Luis Potosí	14 387	1.8	327 208	41.1
Sinaloa	10 691	1.2	357 780	39.0
Sonora	3 101	.4	405 620	46.2
Tabasco	10 647	1.5	274 443	39.2
Tamaulipas	14 111	1.3	510 860	46.1
Tlaxcala	4 590	1.2	178 545	48.1
Veracruz	22 298	.9	793 048	33.1
Yucatán	6 805	1.0	178 279	27.0
Zacatecas	11 255	2.6	211 752	48.4
Nacional	527 789	1.5	14 129 563	39.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B4

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	33 191	9.0	51 034	13.8
Baja California	89 612	7.8	27 555	2.4
Baja California Sur	21 712	10.3	17 201	8.2
Campeche	36 341	13.3	36 202	13.2
Coahuila	79 166	8.7	68 497	7.5
Colima	21 100	10.1	9 573	4.6
Chiapas	71 448	4.8	66 928	4.5
Chihuahua	190 179	16.2	99 550	8.5
Distrito Federal	209 327	6.9	252 788	8.3
Durango	66 327	13.1	56 450	11.1
Guanajuato	108 094	6.8	68 657	4.3
Guerrero	75 101	7.7	101 196	10.4
Hidalgo	92 479	11.8	95 800	12.2
Jalisco	241 366	10.3	217 356	9.3
Estado de México	407 199	7.9	500 463	9.7
Michoacán	129 889	10.3	180 891	14.4
Morelos	52 892	10.0	79 095	14.9
Nayarit	41 264	12.6	56 464	17.2
Nuevo León	283 719	17.9	153 774	9.7
Oaxaca	102 373	9.2	120 929	10.9
Puebla	127 473	7.1	266 885	14.8
Querétaro	71 966	12.6	80 863	14.1
Quintana Roo	62 349	13.0	57 542	12.0
San Luis Potosí	93 093	11.7	94 076	11.8
Sinaloa	85 687	9.3	83 186	9.1
Sonora	89 382	10.2	68 055	7.7
Tabasco	45 586	6.5	64 691	9.2
Tamaulipas	173 078	15.6	128 379	11.6
Tlaxcala	15 424	4.2	41 602	11.2
Veracruz	149 262	6.2	243 318	10.2
Yucatán	50 745	7.7	40 271	6.1
Zacatecas	50 169	11.5	68 675	15.7
Nacional	3 366 993	9.3	3 497 946	9.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B5

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	129	***	78 026	19.1
Baja California	839	.1	149 380	13.1
Baja California Sur	1 509	.7	38 564	19.2
Campeche	1 024	.4	47 544	16.6
Coahuila	334	***	89 553	9.6
Colima	1 167	.5	30 568	13.9
Chiapas	1 419	.1	129 167	8.1
Chihuahua	1 409	.1	170 075	14.1
Distrito Federal	2 840	.1	809 334	23.5
Durango	137	***	59 506	10.9
Guanajuato	4 911	.3	223 301	12.2
Guerrero	493	***	160 151	14.6
Hidalgo	3 963	.4	132 264	14.9
Jalisco	3 339	.1	493 169	19.9
Estado de México	18 593	.3	899 446	16.3
Michoacán	15 010	1.0	288 826	20.0
Morelos	3 333	.5	148 328	24.0
Nayarit	370	.1	77 019	22.4
Nuevo León	6 587	.4	195 601	12.2
Oaxaca	2 921	.2	134 013	10.6
Puebla	7 354	.4	301 937	14.9
Querétaro	2 000	.3	112 047	17.8
Quintana Roo	2 184	.5	95 575	20.4
San Luis Potosí	1 275	.1	72 278	8.2
Sinaloa	--	--	111 563	11.8
Sonora	--	--	99 182	11.2
Tabasco	4 036	.5	94 884	12.8
Tamaulipas	--	--	115 233	10.0
Tlaxcala	1 291	.3	71 176	17.4
Veracruz	--	--	308 325	11.6
Yucatán	3 350	.5	83 008	12.0
Zacatecas	3 267	.7	67 432	13.7
Nacional	95 084	.2	5 886 475	15.1

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Cuadro B6

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Distrito Federal, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	9 545	2.3	10 198	2.5
Baja California	23 896	2.1	7 060	.6
Baja California Sur	5 993	3.0	4 291	2.1
Campeche	3 126	1.1	8 717	3.0
Coahuila	22 463	2.4	13 816	1.5
Colima	4 986	2.3	3 369	1.5
Chiapas	14 179	.9	10 285	.6
Chihuahua	28 012	2.3	12 968	1.1
Distrito Federal	78 170	2.3	111 297	3.2
Durango	5 927	1.1	9 091	1.7
Guanajuato	29 919	1.6	9 320	.5
Guerrero	3 851	.4	23 352	2.1
Hidalgo	17 073	1.9	18 727	2.1
Jalisco	68 511	2.8	56 347	2.3
Estado de México	74 630	1.4	121 336	2.2
Michoacán	25 130	1.7	28 768	2.0
Morelos	10 966	1.8	17 203	2.8
Nayarit	10 563	3.1	10 242	3.0
Nuevo León	19 550	1.2	4 480	.3
Oaxaca	2 847	.2	8 169	.6
Puebla	24 597	1.2	29 210	1.4
Querétaro	15 569	2.5	23 471	3.7
Quintana Roo	13 873	3.0	8 620	1.8
San Luis Potosí	7 142	.8	8 964	1.0
Sinaloa	20 510	2.2	7 789	.8
Sonora	6 048	.7	15 168	1.7
Tabasco	9 797	1.3	13 493	1.8
Tamaulipas	15 811	1.4	11 622	1.0
Tlaxcala	4 583	1.1	4 381	1.1
Veracruz	23 858	.9	40 957	1.5
Yucatán	9 456	1.4	6 845	1.0
Zacatecas	8 887	1.8	10 561	2.1
Nacional	619 468	1.6	670 117	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Intervalos de confianza

Cuadro B7

Intervalos de confianza de la población total del país. Distrito Federal, México, 2008

	Población Total		Hombres		Mujeres	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Consumo diario	0.8	0.706-0.952	1.5	1.227-1.697	0.2	0.158-0.330
Consumo alto	26.6	25.917-27.370	39.1	38.066-40.229	15.1	14.261-15.902
Bebedores consuetudinarios	5.3	4.954-5.658	9.3	8.671-9.986	1.6	1.325-1.849
Abuso/Dependencia	5.5	5.196-5.900	9.7	9.038-10.345	1.7	1.454-1.980

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas*

Cuadro C1

Perfil sociodemográfico de la población global que acuden a los Centros de Tratamientos, SISVEA. Distrito Federal, México, 2008

Características	Global	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2007
	N = 13341	n=1122	n=1344	n=1180	n=1140	n=1385	n=1733	n=1203	n=1420	n=930	n=1884
Sexo											
Masculino	87.4	86.9	90.8	89.7	85.1	86.4	88.9	86.0	88.4	92.1	82.4
Femenino	12.6	13.1	9.2	10.3	14.9	13.6	11.1	14.0	11.6	7.9	17.6
Edad											
5 - 9 años	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
10 - 14 años	4.8	4.8	5.6	5.9	6.4	4.4	5.5	2.8	3.7	2.4	5.4
15 - 19 años	22.1	21.5	26.3	25.0	21.7	23.3	22.9	17.9	20.6	21.9	20.5
20 - 24 años	20.5	18.0	22.3	19.6	21.4	20.5	21.0	19.7	20.5	24.7	18.8
25 - 29 años	16.0	14.7	14.7	15.8	14.3	13.8	16.9	17.2	18.4	18.4	16.1
30 - 34 años	12.5	13.4	10.4	13.1	12.2	14.6	12.6	13.1	11.9	12.7	11.6
35 años o más	23.9	27.6	20.5	20.5	23.8	23.0	21.2	29.1	24.9	19.8	27.6
Escolaridad											
Sin escolaridad	0.9	1.2	1.1	1.5	1.4	0.8	0.5	0.4	0.6	1.3	0.7
Primaria	16.0	21.7	23.2	19.9	17.4	14.6	14.4	9.6	13.7	16.5	13.0
Tec. Post-primaria	0.7	1.5	1.2	0.8	0.4	1.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.6
Secundaria	39.0	35.5	39.1	41.0	34.9	38.5	40.2	36.4	42.0	38.4	41.0
Tec. Post-secundaria	3.5	4.2	4.8	4.2	3.4	3.3	3.3	3.7	2.8	4.6	2.4
Bachillerato	23.5	19.5	18.2	20.1	24.4	22.4	24.0	27.1	26.6	27.2	24.8
Licenciatura	14.7	15.0	10.7	10.4	16.5	16.8	15.6	21.0	13.0	11.1	15.8
Posgrado	1.6	1.3	1.6	2.2	1.7	2.2	1.7	1.6	0.9	0.7	1.7
Estado Civil											
Soltero	55.6	53.0	59.2	58.0	56.4	54.2	57.5	52.6	52.0	55.6	56.2
Casado	27.4	30.9	24.8	24.5	27.7	28.9	26.1	34.8	30.2	24.6	23.2
Divorciado	3.5	4.0	2.5	3.7	2.8	4.1	3.7	2.6	3.7	3.7	3.6
Separado	4.4	4.3	4.3	4.6	4.8	4.3	4.4	3.1	4.3	5.1	4.6
Viudo	0.6	1.0	0.9	0.4	1.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.9	0.5
Unión libre	8.6	6.9	8.3	8.7	7.1	8.0	8.0	6.6	9.3	10.2	11.8
Situación Laboral											
Estudiante	15.8	0.0	0.0	0.0	15.2	16.8	17.6	15.3	14.7	13.9	15.7
Desempleado	14.9	0.0	0.0	0.0	16.9	13.7	16.5	12.0	12.2	18.6	15.6
Desocupado	10.8	0.0	0.0	0.0	13.2	11.5	9.5	8.4	10.6	13.5	10.8
Trabajo fijo	37.4	0.0	0.0	0.0	33.8	38.8	34.5	47.6	40.4	30.9	35.4
Trabajo ocasional	17.7	0.0	0.0	0.0	16.7	15.2	19.6	13.6	18.8	20.9	18.8
Ama de casa	2.8	0.0	0.0	0.0	3.7	3.6	2.3	2.8	2.9	1.5	2.6
Jubilado	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.1	0.4	0.5	0.7	1.2
Acudió											
En forma voluntaria	47.9	41.1	43.2	34.2	42.0	51.9	47.6	46.5	51.6	49.1	62.3
Por amigos o familia	44.1	46.0	46.4	53.5	46.7	42.8	44.9	50.9	41.9	40.9	33.2
Por indicación legal	2.4	4.1	6.6	1.6	4.7	1.6	2.6	0.8	1.2	1.5	0.7
Por indicación médica	3.4	8.8	3.7	10.7	2.4	0.6	1.5	1.2	2.9	4.6	0.7
Otros	2.1	0.0	0.0	0.0	4.3	3.2	3.3	0.6	2.4	3.9	3.0

* Los cuadros de este anexo provienen de los reportes del SISVEA y de los de CIJ.

Cuadro C2.A

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales, según droga de Inicio, SISVEA. Distrito Federal, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo																										
Masculino	1552	100	158	10.2	896	57.7	129	8.3	280	18.0	3	0.2	76	4.9	1	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0	4	0.3	0	0.0
Femenino	332	100	23	6.9	186	56.0	38	11.4	56	16.9	5	1.5	18	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.5	0	0.0
Edad																										
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	102	100	3	2.9	39	38.2	33	32.4	23	22.5	0	0.0	4	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	386	100	48	12.4	179	46.4	59	15.3	83	21.5	0	0.0	16	4.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20 - 24 años	355	100	53	14.9	196	55.2	27	7.6	49	13.8	1	0.3	26	7.3	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	303	100	23	7.6	161	53.1	30	9.9	62	20.5	1	0.3	22	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	0	0.0
30 - 34 años	218	100	26	11.9	126	57.8	7	3.2	44	20.2	2	0.9	9	4.1	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	0.9	0	0.0
35 años o más	520	100	28	5.4	381	73.3	11	2.1	75	14.4	4	0.8	17	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	0	0.0
Escolaridad																										
Sin escolaridad	13	100	0	0.0	5	38.5	5	38.5	1	7.7	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	244	100	27	11.1	110	45.1	57	23.4	41	16.8	0	0.0	8	3.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tec. Post-primaria	11	100	0	0.0	6	54.5	3	27.3	1	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	770	100	82	10.6	383	49.7	80	10.4	173	22.5	1	0.1	47	6.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
Tec. Post-secundaria	46	100	4	8.7	31	67.4	0	0.0	5	10.9	0	0.0	5	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
Bachillerato	466	100	53	11.4	274	58.8	22	4.7	85	18.2	4	0.9	22	4.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	5	1.1	0	0.0
Licenciatura	297	100	13	4.4	244	82.2	0	0.0	27	9.1	0	0.0	10	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0
Posgrado	31	100	1	3.2	26	83.9	0	0.0	2	6.5	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
Estado Civil																										
Soltero	1055	100	119	11.3	579	54.9	113	10.7	179	17.0	3	0.3	56	5.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.4	0	0.0
Casado	436	100	22	5.0	292	67.0	15	3.4	83	19.0	3	0.7	16	3.7	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	2	0.5	0	0.0
Divorciado	68	100	2	2.9	46	67.6	1	1.5	12	17.6	1	1.5	6	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Separado	87	100	7	8.0	53	60.9	7	8.0	16	18.4	0	0.0	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
Viudo	9	100	0	0.0	7	77.8	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	222	100	28	12.6	103	46.4	31	14.0	42	18.9	1	0.5	13	5.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	0.9	0	0.0
Situación Laboral																										
Estudiante	293	100	30	10.2	143	48.8	43	14.7	67	22.9	1	0.3	9	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desempleado	292	100	30	10.3	180	61.6	18	6.2	50	17.1	1	0.3	10	3.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0
Desocupado	201	100	21	10.4	87	43.3	29	14.4	46	22.9	0	0.0	16	8.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Trabajo fijo	662	100	71	10.7	418	63.1	30	4.5	99	15.0	4	0.6	32	4.8	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	6	0.9	0	0.0
Trabajo ocasional	351	100	27	7.7	194	55.3	42	12.0	63	17.9	0	0.0	23	6.6	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ama de casa	48	100	0	0.0	35	72.9	3	6.3	3	6.3	2	4.2	4	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
Jubilado	22	100	0	0.0	19	86.4	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Acudió																										
En forma voluntaria	1173	100	116	9.9	699	59.6	70	6.0	214	18.2	7	0.6	59	5.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	4	0.3	0	0.0
Por amigos o familia	626	100	61	9.7	342	54.6	82	13.1	105	16.8	1	0.2	28	4.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	5	0.8	0	0.0
Por indicación legal	14	100	2	14.3	7	50.0	2	14.3	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Por indicación médica	14	100	1	7.1	5	35.7	3	21.4	4	28.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	56	100	1	1.8	28	50.0	10	17.9	10	17.9	0	0.0	6	10.7	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0

* Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anticulinérgicos, Antidepresivos, Morfina

*** Alucinógenos, Ootros psicotrópicos

Fuente: SISVEA, Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C2.B

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales SISVEA según Droga de Inicio. Distrito Federal, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. Ilícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Frecuencia Actual																										
Diario	827	100	93	11.2	363	43.9	82	9.9	224	27.1	5	0.6	46	5.6	1	0.1	1	0.1	3	0.4	1	0.1	8	1.0	0	0.0
2 - 3 veces por semana	370	100	39	10.5	212	57.3	48	13.0	52	14.1	0	0.0	19	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 vez por semana	406	100	20	4.9	304	74.9	22	5.4	41	10.1	1	0.2	16	3.9	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
1 - 3 veces por mes	226	100	19	8.4	169	74.8	11	4.9	19	8.4	1	0.4	7	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-11 veces al año	55	100	10	18.2	34	61.8	4	7.3	0	0.0	1	1.8	6	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Edad de Inicio																										
9 años o menos	100	100	6	6.0	56	56.0	19	19.0	19	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	809	100	71	8.8	426	52.7	97	12.0	179	22.1	3	0.4	29	3.6	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
15 - 19 años	764	100	83	10.9	487	63.7	40	5.2	114	14.9	1	0.1	34	4.5	0	0.0	1	0.1	3	0.4	0	0.0	1	0.1	0	0.0
20 - 24 años	149	100	21	14.1	80	53.7	11	7.4	18	12.1	1	0.7	15	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	0	0.0
25 - 29 años	42	100	0	0.0	26	61.9	0	0.0	4	9.5	1	2.4	10	23.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
30 - 34 años	14	100	0	0.0	5	35.7	0	0.0	2	14.3	0	0.0	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0
35 años o más	6	100	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0

* Cocaína. Basuco. Crack

** Barbitúricos. Anticulinérgicos. Antidepresivos. Morfina

*** Alucinógenos. Ootros psicotrópicos

Fuente: SISVEA. Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C3.A

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de impacto, SISVEA. Distrito Federal, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. Ilícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sexo																										
Masculino	1552	100	165	10.6	406	26.2	149	9.6	10	0.6	22	1.4	761	49.0	3	0.2	7	0.5	12	0.8	0	0.0	13	0.8	4	0.3
Femenino	332	100	27	8.1	93	28.0	61	18.4	1	0.3	12	3.6	128	38.6	1	0.3	3	0.9	0	0.0	0	0.0	6	1.8	0	0.0
Edad																										
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	102	100	10	9.8	11	10.8	63	61.8	3	2.9	0	0.0	15	14.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	386	100	85	22.0	66	17.1	99	25.6	2	0.5	4	1.0	119	30.8	1	0.3	4	1.0	2	0.5	0	0.0	3	0.8	1	0.3
20 - 24 años	355	100	55	15.5	52	14.6	21	5.9	0	0.0	2	0.6	216	60.8	0	0.0	3	0.8	3	0.8	0	0.0	1	0.3	2	0.6
25 - 29 años	303	100	12	4.0	60	19.8	12	4.0	3	1.0	7	2.3	201	66.3	1	0.3	1	0.3	2	0.7	0	0.0	4	1.3	0	0.0
30 - 34 años	218	100	10	4.6	50	22.9	6	2.8	0	0.0	4	1.8	137	62.8	0	0.0	1	0.5	4	1.8	0	0.0	5	2.3	1	0.5
35 años o más	520	100	20	3.8	260	50.0	9	1.7	3	0.6	17	3.3	201	38.7	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	6	1.2	0	0.0
Escolaridad																										
Sin escolaridad	13	100	0	0.0	4	30.8	5	38.5	1	7.7	0	0.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	244	100	9	3.7	62	25.4	56	23.0	1	0.4	7	2.9	106	43.4	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tec. Post-primaria	11	100	0	0.0	5	45.5	1	9.1	0	0.0	1	9.1	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
Secundaria	770	100	80	10.4	132	17.1	119	15.5	8	1.0	7	0.9	405	52.6	0	0.0	6	0.8	7	0.9	0	0.0	5	0.6	1	0.1
Tec. Post-secundaria	46	100	4	8.7	17	37.0	0	0.0	0	0.0	5	10.9	19	41.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
Bachillerato	466	100	70	15.0	98	21.0	28	6.0	1	0.2	6	1.3	248	53.2	3	0.6	1	0.2	2	0.4	0	0.0	6	1.3	3	0.6
Licenciatura	297	100	28	9.4	157	52.9	1	0.3	0	0.0	8	2.7	95	32.0	0	0.0	3	1.0	1	0.3	0	0.0	4	1.3	0	0.0
Posgrado	31	100	0	0.0	22	71.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	22.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0
Estado Civil																										
Soltero	1055	100	168	15.9	206	19.5	176	16.7	8	0.8	8	0.8	458	43.4	1	0.1	10	0.9	8	0.8	0	0.0	9	0.9	3	0.3
Casado	436	100	7	1.6	186	42.7	6	1.4	1	0.2	16	3.7	213	48.9	1	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	4	0.9	0	0.0
Divorciado	68	100	2	2.9	25	36.8	1	1.5	0	0.0	3	4.4	36	52.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
Separado	87	100	3	3.4	31	35.6	9	10.3	1	1.1	0	0.0	41	47.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0
Viudo	9	100	0	0.0	7	77.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	222	100	10	4.5	44	19.8	18	8.1	1	0.5	5	2.3	136	61.3	2	0.9	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	1.4	1	0.5
Situación Laboral																										
Estudiante	293	100	72	24.6	58	19.8	79	27.0	3	1.0	2	0.7	73	24.9	1	0.3	2	0.7	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.3
Desempleado	292	100	33	11.3	60	20.5	34	11.6	1	0.3	3	1.0	147	50.3	1	0.3	5	1.7	3	1.0	0	0.0	4	1.4	1	0.3
Desocupado	201	100	17	8.5	38	18.9	40	19.9	3	1.5	0	0.0	101	50.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Trabajo fijo	662	100	33	5.0	221	33.4	18	2.7	2	0.3	14	2.1	354	53.5	2	0.3	1	0.2	4	0.6	0	0.0	11	1.7	2	0.3
Trabajo ocasional	351	100	34	9.7	85	24.2	34	9.7	1	0.3	9	2.6	182	51.9	0	0.0	2	0.6	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0
Ama de casa	48	100	1	2.1	16	33.3	3	6.3	0	0.0	6	12.5	22	45.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jubilado	22	100	0	0.0	20	90.9	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Acudió																										
En forma voluntaria	1173	100	113	9.6	325	27.7	65	5.5	7	0.6	29	2.5	604	51.5	4	0.3	4	0.3	9	0.8	0	0.0	10	0.9	3	0.3
Por amigos o familia	626	100	71	11.3	152	24.3	126	20.1	4	0.6	4	0.6	253	40.4	0	0.0	4	0.6	3	0.5						

Cuadro C3.B

Patrón de consumo de población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales, según droga de impacto.
Distrito Federal, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas**			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Frecuencia Actual																										
Diario	1159	100	137	11.8	285	24.6	125	10.8	11	0.9	25	2.2	544	46.9	2	0.2	5	0.4	5	0.4	0	0.0	18	1.6	2	0.2
2 - 3 veces por semana	398	100	25	6.3	97	24.4	46	11.6	0	0.0	7	1.8	210	52.8	1	0.3	4	1.0	6	1.5	0	0.0	1	0.3	1	0.3
1 vez por semana	230	100	14	6.1	79	34.3	19	8.3	0	0.0	1	0.4	114	49.6	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
1 - 3 veces por mes	80	100	12	15.0	36	45.0	13	16.3	0	0.0	1	1.3	17	21.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1- 11 veces al año	17	100	4	23.5	2	11.8	7	41.2	0	0.0	0	0.0	4	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Edad de Inicio																										
5 - 9 años	100	100	20	20.0	17	17.0	20	20.0	1	1.0	0	0.0	42	42.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	809	100	87	10.8	175	21.6	135	16.7	7	0.9	18	2.2	364	45.0	4	0.5	7	0.9	2	0.2	0	0.0	6	0.7	4	0.5
15 - 19 años	764	100	78	10.2	227	29.7	52	6.8	3	0.4	8	1.0	381	49.9	0	0.0	3	0.4	8	1.0	0	0.0	4	0.5	0	0.0
20 - 24 años	149	100	7	4.7	51	34.2	3	2.0	0	0.0	6	4.0	76	51.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	4	2.7	0	0.0
25 - 29 años	42	100	0	0.0	22	52.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0
30 - 34 años	14	100	0	0.0	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0
35 años o más	6	100	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
Droga de Inicio																										
Alcohol	1082	100	97	9.0	423	39.1	68	6.3	1	0.1	17	1.6	452	41.8	2	0.2	5	0.5	8	0.7	0	0.0	7	0.6	2	0.2
Marihuana	181	100	42	23.2	9	5.0	14	7.7	0	0.0	3	1.7	109	60.2	2	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
Inhalables	167	100	11	6.6	5	3.0	84	50.3	0	0.0	9	5.4	54	32.3	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0
Alucinógenos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Heroína	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opio-Morfina y deriv.	6	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0
Cocaína	37	100	2	5.4	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	89.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tranquilizantes	8	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	3	37.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
Barbitúricos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
Anticolinérgicos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tabaco	336	100	37	11.0	58	17.3	41	12.2	10	3.0	2	0.6	183	54.5	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.6
Antidepresivos	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Otros Psicotrópicos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Basuco o pasta base	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Cristal	2	100	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Flunitrazepan (Rohypnol)	3	100	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Crack	56	100	1	1.8	2	3.6	3	5.4	0	0.0	0	0.0	50	89.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Refractil Ofteno	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

* Cocaína. Basuco. Crack

** Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos. Morfina

*** Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Fuente: SISVEA. Centros de tratamiento no gubernamentales 2007

Cuadro C4

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas. Distrito Federal, México, 2007

Características	Global	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Cocaína	Heroína	Tabaco
	n=1036	n=110	n=196	n=201	n=74	n=1	n=231
Sexo							
Masculino	95.9	98.2	98.5	96.0	94.6	100.0	97.4
Femenino	4.1	1.8	1.5	4.0	5.4	0.0	2.6
Edad							
5 - 9 Años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 Años	9.6	8.3	10.7	5.5	4.1	0.0	6.6
15 - 18 Años	90.4	91.7	89.3	94.5	95.9	100.0	93.4
Escolaridad							
Primaria	24.8	38.0	40.4	25.8	50.0	0.0	29.4
Secundaria	58.3	54.6	48.2	56.1	34.7	100.0	55.0
Prepa	14.4	2.8	3.6	17.2	1.4	0.0	14.3
Licenciatura o posgrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No Estudio	2.5	4.6	7.8	1.0	13.9	0.0	1.3
Ocupación							
Estudiante	33.9	17.3	12.8	26.9	12.2	0.0	23.8
Empleado	14.3	19.1	14.8	12.4	9.5	0.0	10.0
Subempleado	40.8	50.0	60.2	48.8	63.5	100.0	53.2
Hogar	1.4	0.9	0.0	1.5	1.4	0.0	0.9
Ninguna	9.7	12.7	12.2	10.4	13.5	0.0	12.1
Usa tatuajes							
Sí	17.4	32.7	24.5	21.9	27.0	0.0	23.4
No	82.6	67.3	75.5	78.1	73.0	100.0	76.6
Ha pertenecido a una banda							
Sí	2.8	10.0	5.1	2.0	8.1	0.0	2.6
No	97.2	90.0	94.9	98.0	91.9	100.0	97.4
Infracción bajo intoxicación							
Sí	11.7	25.5	37.2	27.9	37.8	100.0	15.2
No	88.3	74.5	62.8	72.1	62.2	0.0	84.8
Tipo de infracción							
Robo	89.5	80.9	91.8	89.6	79.7	0.0	89.2
Violación	2.1	0.9	0.5	1.5	0.0	0.0	1.3
Homicidio	1.2	2.7	0.5	1.5	0.0	0.0	1.7
Lesiones a terceros	1.8	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.4
Daños en propiedad ajena	0.4	0.9	0.5	1.0	0.0	0.0	0.9
Secuestro	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4
Delitos contra la salud	4.3	12.7	4.1	4.0	17.6	100.0	4.8
Consumo de drogas	0.3	0.9	1.0	0.5	1.4	0.0	0.9
Portación de arma	5.2	6.4	7.7	3.5	12.2	0.0	3.5
Otros	1.2	1.8	1.0	1.0	2.7	0.0	1.7
Lugar de la infracción							
Vía pública	89.4	90.0	90.3	83.1	93.2	100.0	84.8
Hogar	4.3	6.4	6.6	5.5	5.4	0.0	6.5
Trabajo	1.4	0.9	1.0	2.5	0.0	0.0	1.7
Escuela	1.3	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	2.6
Aeropuerto							
Internacional (aduana)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugar de recreo	1.2	0.9	1.0	2.5	0.0	0.0	1.3
Otro	2.5	1.8	0.5	5.0	1.4	0.0	3.0

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007

Cuadro 5


Mortalidad por causas múltiples al consumo de sustancias psicoactivas. Distrito Federal, 2006

CIE 10a Rev. Causa	No de Muertes	Tasa por un millón de hab.
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol.	942.0	106.9
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos.	0.0	0.0
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides.	1.0	0.1
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos	0.0	0.0
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína.	6.0	0.7
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína.	0.0	0.0
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos.	0.0	0.0
F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco.	168.0	19.1
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles.	0.0	0.0
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas.	10.0	1.1
K70 Enfermedad alcohólica del hígado	566.0	64.2
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0.0	0.0
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificados en otra parte.	0.0	0.0
X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0.0	0.0
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas	0.0	0.0
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	0.0	0.0
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	0.0	0.0
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada.	0.0	0.0

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2006, DGE/SSA

Figura C1

Tendencias en el consumo de drogas alguna vez en la vida para la población que acude a Centros de Tratamiento. Distrito Federal, México.



Cuadro C7

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los Centros de Integración Juvenil según droga de impacto. Distrito Federal, México, 2007

Características	Global		Tabaco		Alcohol		Marihuana		Cocaína		Inhalables		Estimulantes		De diseño		Alucinógenos		Depresores		Opiáceos		Otras	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo																								
Masculino	4227	100	630	14.9	748	17.7	563	13.3	1378	32.6	813	19.2	21	0.5	9	0.2	16	0.4	38	0.9	5	0.1	6	0.1
Femenino	1483	100	624	42.1	311	21.0	82	5.5	165	11.1	254	17.1	8	0.5	10	0.7	3	0.2	19	1.3	3	0.2	4	0.3
Edad																								
9 años o menos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	582	100	37	6.4	96	16.5	34	5.8	19	3.3	391	67.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2
15 - 19 años	1494	100	128	8.6	272	18.2	294	19.7	205	13.7	553	37.0	6	0.4	7	0.5	11	0.7	12	0.8	4	0.3	2	0.1
20 - 24 años	901	100	91	10.1	178	19.8	151	16.8	389	43.2	65	7.2	4	0.4	5	0.6	7	0.8	8	0.9	1	0.1	2	0.2
25 - 29 años	651	100	95	14.6	116	17.8	55	8.4	347	53.3	16	2.5	9	1.4	3	0.5	0	0.0	6	0.9	2	0.3	2	0.3
30 - 34 años	532	100	89	16.7	118	22.2	33	6.2	265	49.8	15	2.8	4	0.8	2	0.4	0	0.0	6	1.1	0	0.0	0	0.0
35 años o más	1521	100	807	53.1	276	18.1	77	5.1	309	20.3	19	1.2	6	0.4	0	0.0	0	0.0	23	1.5	1	0.1	3	0.2
Estado Civil																								
Soltero	3218	100	395	12.3	600	18.6	487	15.1	707	22.0	943	29.3	12	0.4	14	0.4	18	0.6	31	1.0	5	0.2	6	0.2
Casado	1016	100	469	46.2	179	17.6	39	3.8	298	29.3	14	1.4	7	0.7	0	0.0	0	0.0	7	0.7	0	0.0	3	0.3
Unión libre	629	100	107	17.0	120	19.1	44	7.0	299	47.5	38	6.0	7	1.1	1	0.2	1	0.2	10	1.6	2	0.3	0	0.0
Separado	387	100	109	28.2	77	19.9	25	6.5	150	38.8	15	3.9	2	0.5	2	0.5	0	0.0	6	1.6	1	0.3	0	0.0
Divorciado	114	100	57	50.0	19	16.7	5	4.4	30	26.3	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
Viudo	77	100	60	77.9	10	13.0	1	1.3	3	3.9	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
No específica	274	100	58	21.2	56	20.4	44	16.1	57	20.8	56	20.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
Escolaridad																								
Sin estudios (no sabe leer ni escribir)	18	100	3	16.7	2	11.1	1	5.6	5	27.8	7	38.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sin estudios (sabe leer y escribir)	19	100	8	42.1	4	21.1	3	15.8	2	10.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	536	100	152	28.4	79	14.7	38	7.1	158	29.5	88	16.4	7	1.3	1	0.2	0	0.0	11	2.1	2	0.4	0	0.0
Secundaria	2469	100	356	14.4	404	16.4	235	9.5	655	26.5	776	31.4	8	0.3	7	0.3	4	0.2	18	0.7	2	0.1	4	0.2
Técnico o comercial	293	100	140	47.8	50	17.1	20	6.8	58	19.8	18	6.1	2	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.7
Bachillerato	1619	100	310	19.1	343	21.2	276	17.0	484	29.9	152	9.4	10	0.6	9	0.6	9	0.6	20	1.2	4	0.2	2	0.1
Licenciatura	664	100	253	38.1	163	24.5	65	9.8	157	23.6	10	1.5	2	0.3	1	0.2	6	0.9	5	0.8	0	0.0	2	0.3
Posgrado	35	100	19	54.3	5	14.3	2	5.7	9	25.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ocupación																								
Estudiante	1275	100	125	9.8	269	21.1	214	16.8	96	7.5	545	42.7	2	0.2	5	0.4	9	0.7	8	0.6	1	0.1	1	0.1
Estudia y trabaja	231	100	44	19.0	51	22.1	49	21.2	34	14.7	46	19.9	0	0.0	1	0.4	2	0.9	3	1.3	0	0.0	1	0.4
Laboral estable	1591	100	499	31.4	313	19.7	116	7.3	549	34.5	75	4.7	9	0.6	4	0.3	0	0.0	21	1.3	1	0.1	4	0.3
Laboral inestable	618	100	84	13.6	106	17.2	68	11.0	269	43.5	76	12.3	6	1.0	0	0.0	2	0.3	5	0.8	2	0.3	0	0.0
Desempleado	379	100	43	11.3	60	15.8	46	12.1	177	46.7	44	11.6	3	0.8	1	0.3	0	0.0	4	1.1	1	0.3	0	0.0
Desocupado	550	100	35	6.4	104	18.9	61	11.1	196	35.6	136	24.7	4	0.7	4	0.7	3	0.5	5	0.9	1	0.2	1	0.2
Hogar	311	100	186	59.8	49	15.8	7	2.3	45	14.5	17	5.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	1.3	0	0.0	2	0.6
Pensionado	91	100	82	90.1	7	7.7	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Nivel Socioeconómico																								
Alto	17	100	6	35.3	1	5.9	2	11.8	4	23.5	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
Medio Alto	582	100	244	41.9	88	15.1	66	11.3	129	22.2	39	6.7	3	0.5	3	0.5	3	0.5	6	1.0	0	0.0	1	0.2
Medio Bajo	3485	100	711	20.4	663	19.0	423	12.1	929	26.7	670	19.2	20	0.6	12	0.3	15	0.4	31	0.9	5	0.1	6	0.2
Bajo	977	100	114	11.7	192	19.7	79	8.1	299	30.6	269	27.5	4	0.4	2	0.2	1	0.1	14	1.4	2	0.2	1	0.1
Pobreza Extrema	35	100	2	5.7	4	11.4	6	17.1	9	25.7	11	31.4	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.9	0	0.0
Droga de inicio																								
Tabaco	3214	100	1034	32.2	503	15.7	297	9.2	891	27.7	434	13.5	13	0.4	6	0.2	8	0.2	20	0.6	5	0.2	3	0.1
Alcohol	1706	100	190	11.1	509	29.8	205	12.0	442	25.9	301	17.6	13	0.8	9	0.5	10	0.6	21	1.2	2	0.1	4	0.2
Marihuana	278	100	18	6.5	19	6.8	121	43.5	77	27.7	32	11.5	1	0.4	0	0.0	1	0.4	8	2.9	0	0.0	1	0.4
Cocaína	85	100	0	0.0	3	3.5	6	7.1	72	84.7	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Inhalables	388	100	10	2.6	22	5.7	12	3.1	47	12.1	294	75.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0
Estimulantes	7	100	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	2	28.6	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
De diseño	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Depresores	14	100	0	0.0	0	0.0	1	7.1	8	57.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Otras	5	100	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	40.0

Cuadro C8

Tendencias de la droga de inicio en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales global. Distrito Federal, México

	Año									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2007
Droga Inicio										
Alcohol	47.0	34.9	31.1	47.0	50.8	49.0	53.3	44.6	47.4	57.4
Mariguana	24.4	28.2	28.9	21.3	15.7	18.4	12.7	14.4	17.5	9.6
Inhalables	16.2	25.0	21.9	13.5	10.8	12.0	11.5	10.6	14.4	8.9
Alucin	0.3	0.4	1.8	0.6	0.1	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0
Heroína	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
Cocaina	3.8	4.9	8.5	9.1	9.5	11.8	14.0	16.1	12.2	2.0
Tranq	0.9	2.7	2.3	1.2	0.5	0.6	0.7	1.0	0.2	0.4
Anfeta	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1
Tabaco	2.5	2.0	3.2	4.0	9.5	5.4	4.4	9.3	4.2	17.8
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
Crack	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.4	1.0	0.4	3.0
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Opio/Morf	0.6	0.4	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3
Barbitu	1.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.4	0.0
Anticoli	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepre	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
Otros	2.1	0.5	0.3	0.8	1.3	0.3	0.2	0.7	0.6	0.0
Basuco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.8	0.1
Rohypnol	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.4	0.2	0.6	0.6	0.2

Cuadro C9

Tendencias de la droga de impacto en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales global. Distrito Federal, México

	Año									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2007
Droga Impacto										
Alcohol	29.9	22.6	29.3	24.4	23.0	13.8	22.6	19.8	12.2	26.5
Mariguana	12.0	14.2	13.1	17.1	11.1	12.4	8.2	12.2	13.1	10.2
Inhalables	14.6	16.0	16.3	11.8	8.9	9.9	6.2	8.7	7.8	11.1
Alucin	3.1	5.0	4.9	1.2	0.8	0.5	0.2	0.4	0.6	0.2
Heroína	0.5	0.7	0.9	1.3	1.5	1.3	1.2	0.7	0.2	0.2
Cocaina	17.3	20.9	19.0	34.9	42.7	52.0	48.7	44.2	44.8	17.4
Tranq	4.1	10.2	8.3	1.7	1.0	0.6	1.1	1.2	0.9	1.8
Anfeta	1.5	0.8	1.3	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4
Tabaco	2.9	2.3	1.8	0.9	2.1	0.5	0.8	1.0	0.2	0.6
Cristal	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.6	0.9	0.5
Crack	0.0	0.0	0.0	1.4	2.7	3.2	2.5	3.6	7.6	29.3
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
Opio/Morf	1.9	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.2	0.7	0.6	0.5
Barbitu	6.5	3.5	1.6	0.9	1.1	0.4	0.5	0.4	0.9	0.0
Anticoli	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepre	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Otros	5.7	2.6	1.7	0.7	1.0	0.4	0.1	0.9	0.9	0.0
Basuco	0.0	0.0	0.3	0.9	1.5	2.5	5.6	4.6	7.8	0.5
Rohypnol	0.0	0.0	0.7	1.0	0.8	0.8	0.2	0.6	0.6	0.6

Encuesta Nacional de Adicciones 2008
Resultados por entidad federativa, Distrito Federal

Se terminó de imprimir en Junio del 2009.
La edición consta de 200 ejemplares y estuvo al cuidado
de la Subdirección de Comunicación Científica
y Publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública.

