



# Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados por entidad federativa

**SALUD**

## Nayarit





---

Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Resultados por entidad federativa, Nayarit**

---



Encuesta Nacional  
de **Adicciones**  
**2008**

Resultados por entidad federativa

**Nayarit**

Encuesta Nacional de Adicciones 2008, **Resultados por entidad federativa, Nayarit**  
Primera edición, 2009

D.R. © Instituto Nacional de Salud Pública  
Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatlán  
62508 Cuernavaca, Morelos, México

Impreso y hecho en México  
*Printed and made in Mexico*

ISBN: 978-607-7530-38-1

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 es un esfuerzo de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, en el cual participaron el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue responsable del operativo de campo y del diseño conceptual e interpretación de los datos de tabaco, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que tuvo a su cargo el diseño del cuestionario, la capacitación de los encuestadores, la supervisión de campo, el diseño conceptual y el análisis de las secciones de drogas y alcohol.

La encuesta se realizó con apoyo financiero de la Secretaría de Salud, así como con financiamiento adicional de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Embajada de los Estados Unidos para la supervisión de campo y análisis de datos.

---

# Encuesta Nacional de Adicciones 2008

---

## Coordinación general

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones

## Coordinación técnica

Jorge A. Villatoro Velázquez  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Coordinación logística

Martha María Téllez-Rojo  
Claudia Díaz Olavarrieta  
Laura Mendoza Alvarado  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño conceptual

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones  
  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Diseño conceptual sección de tabaco

Eduardo Lazcano  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño logístico

Juan Pablo Gutiérrez  
Manuel Castro Tinoco  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño y control muestral

Oswaldo Palma Coca  
Isaac Sidhartha Salcedo Campos  
Alaín López Condado  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Capacitación general drogas y alcohol

Clara Fleiz Bautista  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Francisco Juárez García  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Supervisión de práctica de capacitación

Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Michelle Bretón Cirett  
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores  
Vianney Sánchez Pineda  
Elsa Nancy Magaña Méndez  
Mitzi Roxana Razo Guzmán  
Miguel Ángel López Brambila  
María Estela Rojas Guiot  
Lianed Gaytán López  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Levantamiento de campo

Juan Pablo Gutiérrez  
Manuel Castro Tinoco  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Supervisión de trabajo de campo

Clara Fleiz Bautista  
Vianney Sánchez Pineda  
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores  
Elsa Nancy Magaña Méndez  
Mitzi Roxana Razo Guzmán  
Miguel Ángel López Brambila  
Michelle Bretón Cirett  
Midiam Moreno López  
María Estela Rojas Guiot  
Lianed Gaytán López  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Desarrollo de sistemas y bases de datos**

Oswaldo Palma Coca  
Alaín López Condado  
Daniel Acosta Vargas  
Francisco Javier Carlos Rivera  
Isaac Sidhartha Salcedo Campos  
Claudia Irene Larracilla Camacho  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Análisis estadístico de drogas y alcohol**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Jerónimo Blanco Jaimés  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Elaboración del reporte de drogas y alcohol**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Clara Fleiz Bautista  
Patricia Cravioto  
Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Nieves Quiroz del Valle  
Mario Cortés  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones

#### **Elaboración del reporte de tabaco**

Eduardo Lazcano  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Reporte metodológico**

Martha María Téllez-Rojo  
Claudia Díaz Olavarrieta  
Juan Pablo Gutiérrez  
Oswaldo Palma Coca  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Clasificación de sustancias psicoactivas**

Mario Gómez  
Arturo Ortiz  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Consejo asesor**

Guilherme Borges Guimaraes  
Guillermina Natera Rey  
Patricia Cravioto  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Rafael Lozano  
Patricia Nilda Soliz  
Dirección General de Información en Salud

Víctor Guiza  
Ricardo Sánchez Huesca  
Centros de Integración Juvenil

Carlos Magis  
CENSIDA



# Contenido

<b>Prólogo</b>	<b>11</b>
<b>Presentación</b>	<b>13</b>
<b>Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Nayarit</b>	<b>15</b>
<b>Método</b>	<b>17</b>
<b>Tabaco</b>	<b>23</b>
Principales resultados	24
Conclusiones	30
<b>Drogas</b>	<b>31</b>
Principales resultados	32
Conclusiones	34
<b>Alcohol</b>	<b>35</b>
Principales resultados	36
Conclusiones	37
<b>Referencias</b>	<b>40</b>
<b>Glosario</b>	<b>41</b>
<b>Anexos</b>	<b>45</b>
A. Drogas	46
Resultados del estado	46
Intervalos de confianza	59
B. Alcohol	<b>63</b>
Resultados estatales	63
Intervalos de confianza	69
C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas	70



La información confiable y oportuna es una de las herramientas más valiosas para la toma de decisiones, el diseño de programas y políticas públicas de atención y prevención y de apoyo en la definición de la normativa en materia de salud. En ella se apoya de manera sustantiva la gestión estratégica que busca atender de manera efectiva los problemas de salud de los mexicanos.

En la actualidad las adicciones son una prioridad a nivel global y nacional, que por su magnitud y consecuencias nos requiere estar bien informados para poder dirigir de manera precisa y contundente nuestros recursos y esfuerzos.

Las encuestas nacionales son una metodología muy útil a este fin y México tiene amplia experiencia en su realización, un ejemplo son las encuestas nacionales de adicciones (ENA) que se vienen realizando desde 1988, de las cuales la quinta y más reciente, la ENA 2008, se realizó entre los años 2007 y 2008. En ella destaca su diseño probabilístico polietápico, que ha permitido la representatividad nacional, urbano-rural, regional y ahora por entidad federativa. Luego de presentar el reporte de la ENA 2008 con los datos nacionales, establecimos el compromiso de difundir en breve las estadísticas estatales, que por primera ocasión permitirán conocer en forma específica para cada estado el comportamiento de las adicciones.

Con las ENA hemos podido conocer más acerca de la magnitud y distribución de las adicciones; identificar algunas variables a las cuales se asocian más frecuentemente; generar hipótesis de investigación; contribuir en el conocimiento de su historia natural, así como evaluar medidas de control y detectar cambios en las prácticas médicas y de salud.

Estoy plenamente convencido de que el esfuerzo quedaría inacabado si la información generada en la Encuesta no llega a las manos de los gestores a nivel local y de los ciudadanos en general, en donde se vive de manera inmediata esta problemática. Tenemos la obligación de difundirla de manera que sirva para construir nuevos conocimientos que deban utilizarse no sólo para comprender y predecir, sino para modificar políticas, estrategias, programas y comportamientos, y como mecanismo para la movilización social de voluntades, recursos y la generación de compromisos. Ante la evidencia confiable, no existe duda.

A nivel nacional, la ENA 2008 muestra que el problema más importante en adicciones en México está en el abuso del consumo de

bebidas alcohólicas, con las graves consecuencias familiares, sociales y comunitarias, y en el uso de tabaco, arraigados ambos en muchas poblaciones, tanto rurales como urbanas, y que está cobrando víctimas en los jóvenes que se inician en su consumo a edades cada vez más tempranas.

En el caso de las drogas ilegales, en México se ha generado un mercado de consumidores similar al de algunos países europeos y de otros como Perú o Colombia, originando un daño cada vez mayor, tanto a la salud como a la armonía social y a la gobernabilidad. Las cifras muestran que cada vez existe mayor exposición al consumo y es mayor la facilidad con la que se consiguen las drogas entre los jóvenes.

Los resultados que presentamos para las 32 entidades federativas muestran que las adicciones son un problema generalizado, con sus especificidades dependiendo de variables como tipo de droga, intensidad, edad, sexo, residencia, etc., y que se deben tener presentes.

En general se destaca, en cuanto al consumo de tabaco, que 20.4% de la población urbana entre los 12 y los 65 años de edad son fumadores activos, en tanto que en las localidades rurales la proporción es de 11.3 por ciento. Para el caso del consumo de alcohol, fueron los estados del centro-occidente los de alto consumo, donde se ubican Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

Para el consumo de drogas ilegales y médicas, los datos de la medición mostraron que dos estados fronterizos tienen el mayor consumo, Quintana Roo en el sur y Tamaulipas en el norte, con una incidencia de 11.2 y 11.1 por ciento. Junto con ellos se ubican 12 entidades federativas más que registraron una incidencia acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre los 12 y los 65 años de edad, por arriba de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional.

De esta manera ponemos a disposición de la sociedad en general la información estatal de la ENA 2008, la cual es parte del esfuerzo sistematizado que la administración federal, a cargo del C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, está realizando, en coordinación con los gobiernos estatales, para enfrentar el problema de quienes consumen, abusan o ya dependen de las drogas, y disminuir sus graves consecuencias a través de la aplicación de políticas públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integran en una acción sinérgica todos los recursos disponibles de las instituciones y están siendo una gran oportunidad para una responsabilidad

social compartida, entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos.

La realización de la ENA 2008, coordinada por la Secretaría de Salud, fue posible gracias a la participación y compromiso de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Consejo Nacional contra las Adicciones, y a la colaboración de otras instancias como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Reconozco de la misma manera el destacado apoyo recibido por parte de las entidades federativas, organizaciones y personas que

hicieron posible la realización de la Encuesta, a los que han contribuido a su financiamiento y a los que difunden los resultados derivados de ella.

Las bases de datos estarán también disponibles para la sociedad en general, los tomadores de decisiones, los académicos, los investigadores, etc., esperando que el dato se convierta en conocimiento transformador, como lo expresara Sócrates hace ya muchos años: "Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores".

Dr. José Ángel Córdova Villalobos.  
Secretario de Salud.

# Presentación

**E**n nuestro actual entorno social, el consumo de drogas juega un papel muy importante. Debido a ello, los esfuerzos de prevención deben enfocarse a fortalecer a los adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo con el desarrollo de habilidades (comunicación, resolución de conflictos, etc.). El Programa Nacional de Salud 2007-2012, en su búsqueda por mejorar las condiciones de salud de la población, tiene entre sus principales objetivos disminuir los niveles de consumo de drogas en la población, en donde los adolescentes y jóvenes tienen prioridad. Para el cumplimiento de esta tarea, se tiene el Programa contra las Adicciones, que integrado a las acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Atención de las Enfermedades, constituye una respuesta sin precedentes para revertir los crecientes índices de prevalencia de problemas de adicción.

El fenómeno del consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas legales o ilegales muestra una preocupante evolución. Sus principales indicadores revelan un incremento de las prevalencias de consumo, así como una disminución en las edades de inicio, principalmente para las drogas introductorias como el tabaco y el alcohol. Una de las metodologías más útiles para observar la evolución de este fenómeno es la realización de estudios transversales con encuestas de hogares que se realizan con periodicidad fijada de manera convencional en muestras representativas nacionales. Esto se ha venido desarrollando a través de la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones en sus versiones anteriores.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008) se realizó en hogares y, además de los valiosos resultados sobre el consumo y las actitudes de la población ante los diversos tipos de drogas, permite tener datos comparativos de dos ciclos de 10 años cada uno (1988-1998-2008), es decir, cuatro lustros de estudio del problema en los que se realizaron cinco encuestas mediante las que es posible observar con mejor precisión las modificaciones en las prevalencias nacionales. Por lo tanto, la ENA 2008 nos brinda información esencial para observar cómo evoluciona el proceso, para saber qué sustancias son las más utilizadas y por quién, a fin de planificar adecuadamente los programas y las acciones que en materia de adicciones debe realizar el gobierno en tanto autoridad rectora en la materia. Hay que resaltar que, debido al tipo de información que recoge, el desarrollo de esta Encuesta se topó con una serie de dificultades para su levantamiento, finalmente resueltas para poder alcanzar los resultados en el ámbito estatal que aquí se engloban.

En lo relacionado con el consumo de drogas, la ENA 2008 presenta un escenario de salud pública donde en los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la

oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50 por ciento. Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta los 18 y 20 años, respectivamente, para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo. La Encuesta ha logrado identificar las seis principales sustancias adictivas de mayor consumo en la población y que la oferta de sustancias que ha invadido al país se ha elevado considerablemente. El principal beneficio que los tomadores de decisiones obtienen con los datos que proporciona la ENA 2008 es que, en el escenario de la política de salud, la prevención, la detección oportuna y las intervenciones breves son las acciones que han demostrado ser más costo-efectivas para enfrentar el complejo problema de las adicciones.

La principal diferencia entre las encuestas anteriores y esta quinta consiste en la representatividad estatal, lo que permitirá a los estados iniciar un proceso de medición; es decir, un seguimiento de la prevalencia del consumo en la población al interior de cada entidad con base en un conteo metodológico bien estructurado.

La serie de resultados estatales de la ENA 2008 abre una nueva perspectiva en la salud pública y la epidemiología de las adicciones en cada una de las 32 entidades federativas del país. Además de que hoy se cuenta con información que permite supervisar y tomar decisiones en el ámbito estatal, se cubre un vacío de información que era necesaria para la instrumentación de acciones de intervención, prevención y promoción de ambientes saludables. De igual modo, la información que se incluye constituye una referencia básica para el desarrollo de programas de intervención adecuados a las necesidades de cada entidad federativa.

Contar con este tipo de herramientas metodológicas plantea también un reto a los sistemas de salud estatales, ya que éstas se convierten en el observatorio que mide, si bien transversalmente, los éxitos en la lucha contra el consumo de drogas. Igualmente se constituyen en el elemento básico para el tomador de decisiones en el proceso de evaluación. Los resultados por entidad federativa de la ENA 2008 son una contribución más al conocimiento en salud y se convierten en parte de la rendición de cuentas que hoy es compromiso fundamental del trabajo en salud pública, especialmente en lo referente al combate contra el abuso de las drogas.

Dr. Mauricio Hernández Ávila  
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud  
Secretaría de Salud



# Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Nayarit

**N**uestro país cuenta con una amplia experiencia acumulada en la investigación, de corte epidemiológico y psicosocial, sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco. Estas investigaciones se han llevado a cabo continuamente desde la década de los setentas con una misma metodología utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes para cada tipo de población estudiada, lo cual ha permitido conocer el panorama global que guarda dicho fenómeno en distintos escenarios, entre los cuales se encuentran los hogares, las escuelas y los centros de tratamiento. Asimismo, a través de estos esfuerzos en investigación se han identificado, en estos escenarios, los patrones de consumo, los grupos más vulnerables, las tendencias a lo largo del tiempo, las características sociodemográficas más importantes que predicen o protegen de dicho consumo, entre otros aspectos relevantes relacionados con el ámbito social de las adicciones.

En este contexto, a continuación se muestran, los resultados arrojados por estos estudios en el país, como preámbulo y referencia de los resultados encontrados en esta entidad en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Es importante destacar que con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, por primera vez se cuenta con un informe para cada Estado de la República, además de un Reporte Nacional para población rural y urbana de 12 a 65 años. En las encuestas nacionales previas (ENA 1988, 1993, 1998, 2002),<sup>1-4</sup> se obtuvieron datos regionales y a nivel nacional; en las encuestas de 1988, 1993 y 1998 se obtuvieron datos con población urbana, y con la encuesta del 2002 se tuvieron datos para población rural y urbana.

En el caso específico de Nayarit, se tienen pocos antecedentes estatales en las encuestas nacionales de adicciones y en comunidad escolar que permitan hacer comparaciones con los datos de la Encuesta del 2008. En el primer caso, el estado se ha incluido en la región centro del país, junto con otras entidades que en 1988 y 1998 reportaron un consumo promedio de drogas médicas e ilegales.

Sin embargo, se tenía conocimiento que Nayarit era uno de los estados con menor prevalencia de la región, pero en los últimos años ha incrementado el consumo. En estudiantes se cuenta con el antecedente de la encuesta que se realizó en 1991 y en 2005, que se describen más adelante.

Por lo que respecta a Centros de Tratamiento, se cuenta con amplia información derivada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA)\* y de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

## Encuestas en estudiantes

En Nayarit, el único estudio previo en población escolar es la Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media y Media Superior que se realizó en 1991. Los resultados de la medición indicaron que el 6% del total de la muestra había consumido al menos una droga en su vida, sin incluir al tabaco o al alcohol, por debajo del promedio nacional (8.2%). Por sexo, la proporción de hombres que experimentó con drogas al menos una vez fue superior al de mujeres (7% y 4.6%, respectivamente). Por tipo de sustancia, los tranquilizantes (2.15%), los inhalables (1.69%) y las anfetaminas (1.15%) fueron las sustancias que más consumieron los estudiantes.<sup>5</sup>

En lo que respecta al consumo de alcohol el 54.6% del total de la población estudiantil había consumido alcohol alguna vez en la vida y por sexo el 60.4% de los hombres y el 49.7% de las mujeres.

---

\* Para la recolección de información el SISVEA se basa en el "reporte de eventos" de aquellas personas que han acudido a distintas instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales a solicitar tratamiento por consumo de drogas. Da cuenta sobre los casos o pacientes (eventos) que acuden a tratamiento a los diferentes centros de atención (gubernamentales y no gubernamentales) en un estado y esa información se refiere únicamente a la demanda real (efectiva) de atención. También registra las muertes asociadas al consumo. Es importante señalar que el número total de estos eventos puede exceder el de los individuos en contacto con las instituciones que los reportan en un tiempo determinado, toda vez que el mismo individuo puede ser contactado por más de una institución, con lo que puede ser cuantificado en diversos reportes de evento.

## SISVEA

De acuerdo a los datos registrados por este sistema, en el Estado de Nayarit la búsqueda de tratamiento ha aumentado de 2002 al 2007. Por ejemplo, en 2002 se registraron 1,187 personas y en el 2007 la demanda de tratamiento ascendió a 1,494 casos. En total en el periodo comprendido se registraron 6,870 personas.<sup>6</sup>

Por otra parte, el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en este periodo, indica que la mayoría son hombres (88.3%). Por grupos de edad, destaca la población adulta de 35 años o más (25.1%). Por nivel educativo la mayoría tienen secundaria (42.8%). En cuanto al estado civil, casi la mitad de esta población es soltera (46.2%) y un poco más de una cuarta parte está casada (26.8%). Respecto a su situación laboral, el 38.4% cuenta con un trabajo ocasional. Casi la mitad de los usuarios asiste en forma voluntaria a buscar ayuda (48.5%).

Asimismo, entre 2006 y 2007, las drogas ilegales más consumidas entre la población que acudió a estos centros fueron la cocaína (55.6%), la marihuana (46.1%) y el cristal (24.9%).

Respecto a las drogas de inicio, los datos del 2007, registraron que el alcohol (45.3% hombres y 58.1% mujeres) y el tabaco (29.9% hombres y 33.3% mujeres) fueron las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a la droga de impacto\* que motivó la búsqueda de ayuda, en los hombres fue el alcohol (37.2%) y la cocaína (20.7%); mientras que en las mujeres fue el alcohol (50.2%) y el tabaco (23.8%).

### Mediciones realizadas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información obtenida en los CIJ sobre el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en el 2007, muestra coincidencias importantes con lo registrado por SISVEA en instituciones no gubernamentales. De tal forma que, la mayor parte

de la población que acudió a esta institución en el Estado de Nayarit, fue del sexo masculino (8 varones y 1 mujer). En cuanto a la edad, la mayoría fueron jóvenes entre los 15 y 19 años (n=4). En cuanto al estado civil y la escolaridad, la mayoría eran solteros (n=7) y habían estudiado hasta la secundaria (n=5). En lo que respecta a la ocupación, tres de ellos contaban con un trabajo estable. El nivel socioeconómico de la mayoría fue medio bajo (n=5).<sup>7</sup>

Es importante señalar que es el estado con menor cantidad de personas que asistieron a tratamiento.

El tabaco en hombres (62.5%) y el alcohol en las mujeres (100%) son las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a la droga de impacto, en los hombres fue la cocaína (37.5%). Las mujeres no reportaron alguna droga en específico.

### Mediciones realizadas en los consejos tutelares de menores

Los datos obtenidos por los Consejos Tutelares de Menores indican que del grupo de menores infractores usuarios de drogas, casi el 98.2% es población masculina. En cuanto al nivel educativo el 49.1% cuenta con escolaridad máxima de primaria. En lo que respecta al uso de drogas, la mayoría consume tabaco, marihuana y cocaína. La infracción que cometió el 71.9% de esta población fue el robo.<sup>8</sup>

### Mediciones realizadas en el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones

En el Estado de Nayarit, el número de defunciones debido al consumo de alcohol es de 60 habitantes, cifra que corresponde al 0.41% del total de muertes registradas en el país. Asimismo, las defunciones ocasionadas por la enfermedad alcohólica del hígado y por el uso de tabaco fueron 50 y 41, respectivamente, que equivalen al 0.62% y 1.62% del total de muertes.<sup>9</sup>

\* La que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (de salud, familiares, laborales, etc.) y que lo motiva a solicitar atención médica.



La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, así como del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (ST-CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008). Sus objetivos incluyen generar información confiable y caracterizar la prevalencia del uso de tabaco, alcohol y drogas en la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 años. La encuesta busca también conocer los factores asociados a la utilización de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el abuso de las mismas.

## Objetivos

Los objetivos que se plantearon para la ENA 2008 son:

- Evaluar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas (consumidas fuera de prescripción) como no médicas, alcohol y tabaco en los ámbitos nacional y estatal
- Evaluar las tendencias en el consumo de sustancias en una muestra representativa de las poblaciones urbana y rural del país

La ENA 2008 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y estatal, en la que se encuentran representadas poblaciones rurales –aquellas con un número de habitantes menor o igual a 2 500– y urbanas –aquellas con más de 2 500 habitantes. La selección de las unidades muestrales se realizó en múltiples etapas: áreas geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas o segmentos, viviendas y, finalmente, personas dentro de los hogares. La selección de viviendas se hizo a partir de los croquis y listados elaborados en campo usando una técnica de muestreo aleatorio sistemático.

En cada hogar, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó un adulto de entre 18 y 65 años de edad y un adolescente de entre 12 y 17 años. La selección se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos por la ENA 2008 permiten:

- Identificar los estados de mayor riesgo en relación con el problema de consumo de drogas
- Evaluar la relación de los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, el uso habitual y el uso problemático de drogas, alcohol y tabaco
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con el fin de incidir en la creación e implementación de programas de prevención
- Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con el fin de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco
- Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y sintomatología depresiva

Es importante considerar que a pesar de que se eligieron muestras con el mismo diseño y que se mantuvieron estables la mayor parte de las condiciones de las encuestas 2002-2008, hay importantes diferencias; por ejemplo, la encuesta de 2008 se realizó mediante computadora en tanto que la de 2002 se efectuó en una versión lápiz y papel. Adicionalmente, cambiaron las definiciones de consumo alto para las mujeres, ya que internacionalmente se considera para ellas el que hayan consumido 4 copas o más, a diferencia de las 5 copas consideradas en las encuestas anteriores.

## Unidades de análisis

Las unidades de análisis definidas para la ENA 2008 son las siguientes:

- Hogar es el conjunto de personas, relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros
- Adolescentes son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 12 y 17 años
- Adultos son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 18 y 65 años

## Cobertura geográfica y de unidades

La información obtenida a través de la ENA 2008 permitirá el cálculo de indicadores estatales con representatividad de las áreas urbanas y rurales de cada entidad federativa. Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas tales como instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles, asilos, etcétera.

## Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalan la existencia de importantes diferencias para los indicadores de interés según el tamaño de la localidad, para el diseño de la ENA 2008 se decidió estratificar por el tamaño de la localidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

Estrato	Descripción
I. Ciudad o área metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudades y áreas metropolitanas</li> <li>• Ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado</li> </ul>
II. Complemento urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localidades de 2 500 a 99 999 habitantes</li> </ul>
III. Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localidades con menos de 2 500 habitantes</li> </ul>

La asignación del tamaño de muestra para cada estrato se hizo de manera proporcional al número de habitantes dentro del estrato.

## Tamaño de la muestra

Para cumplir con los objetivos de la ENA 2008, se consideró que el tamaño de la muestra seleccionado debería permitir estimar proporciones estatales de aproximadamente 12.2%. Además, contemplando que la encuesta debería permitir obtener estimaciones

estatales con error y confianza idénticos a los utilizados para el diseño de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, se consideró un error relativo máximo de 15%, una confianza de 90%, una tasa de 15% de no respuesta, un efecto de diseño de 2.183 y un promedio de 1.4 individuos entrevistados por vivienda. Se determinó un tamaño de muestra estatal de aproximadamente 1 584 viviendas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1-p) \cdot deff}{r^2 \cdot p \cdot TR \cdot h}$$

donde

$n$	Tamaño de muestra
$p$	Proporción a estimar
$z_{\alpha/2}$	Cuantil de una distribución normal asociado con un nivel de confianza deseado $1-\alpha$
$r$	Error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar
$deff$	Efecto de diseño, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia derivada del uso de un diseño complejo para la ENA 2008
$TR$	Tasa de respuesta esperada
$h$	Promedio de entrevistas por vivienda

El tamaño de la muestra en el ámbito nacional fue de 50 688 viviendas, a partir del cual se podrán estimar proporciones mayores o iguales a 0.43% en el ámbito nacional con la misma precisión y confianza que en las estimaciones estatales.

## Esquema de selección

El diseño muestral de la ENA 2008 es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados; para el proceso de selección, se utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda de 2000. Ya que en los estratos I y II las localidades incluyen AGEB y en el estrato III las AGEB incluyen localidades, el esquema de selección depende del estrato que se esté observando. Así, los esquemas de selección para los estratos I y II son idénticos, mientras que el esquema para el estrato III es diferente; ambos esquemas se describen a continuación:

## Estratos I y II

- En la primera etapa se seleccionaron  $k$  AGEB con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), definido por el número de viviendas particulares habitadas en el AGEB
- Para cada una de las AGEB seleccionadas, se seleccionaron seis manzanas con probabilidad proporcional a su número de viviendas
- Posteriormente, en cada una de las manzanas seleccionadas, se realizó una selección de seis viviendas, utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio
- En cada una de las viviendas seleccionadas y siempre que la composición del hogar lo permitió, es decir, que en el hogar existieran individuos en el rango de edad, se seleccionaron

un adulto y un adolescente, según las definiciones descritas anteriormente, mediante el uso de muestreo aleatorio simple.

La encuesta se aplicó en todos los hogares de la vivienda

- A cada uno de los individuos seleccionados se le aplicó la entrevista siguiendo el cuestionario correspondiente

La constante  $k$  será proporcional al tamaño de muestra asignado al estrato.

### Estrato III

El esquema de selección en el caso de las localidades que conforman el estrato III se describe a continuación:

- Las unidades primarias de muestreo fueron AGEB rurales, que contienen las localidades que conforman el estrato III. La probabilidad de seleccionar un AGEB fue proporcional al número de viviendas particulares habitadas en ella. Se seleccionaron tantas AGEB como viviendas particulares habitadas en el estrato
- La unidad secundaria de muestreo (USM) estuvo constituida por las localidades o grupos de localidades adyacentes, que agruparon un mínimo de 120 viviendas. Estas USM se seleccionaron con probabilidad proporcional al número de viviendas particulares habitadas que existían
- Para cada localidad o grupo de localidades seleccionadas se extrajo una muestra aleatoria sistemática de tres grupos de doce viviendas consecutivas cada uno, llamados segmentos
- En cada una de las viviendas que conformaron los segmentos seleccionados, se aplicó la encuesta en todos los hogares de la vivienda. Siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionaron un adulto y un adolescente. Esta selección se realizó utilizando muestreo aleatorio simple

### Logística en campo

La ENA 2008 se realizó en dos fases:

- En la primera fase (tamizaje), se elaboraron los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y se identificó a los residentes habituales (nombre, edad y sexo) de las viviendas seleccionadas. El primer paso consistió en aplicar el cuestionario de hogar y posteriormente se llevó a cabo la selección aleatoria de los adultos y adolescentes. En esta fase también se completó la prueba piloto
- En la segunda fase se recabó información en campo mediante la aplicación de la encuesta a los residentes previamente seleccionados

### Prueba piloto

La prueba piloto tuvo como objetivo general evaluar la metodología, los procedimientos, los instrumentos y la logística de la ENA 2008 a pequeña escala. Con el fin de contar con instrumentos revisados, afinados e implementados en campo, la ENA 2008 incluyó una fase piloto que se llevó a cabo en la localidad de Texcoco, en el Estado de México del 10 al 14 de diciembre de 2007. Se seleccionaron ocho AGEB; al interior de cada una de ellas se seleccionaron dos manzanas, y ahí, se aplicó un total de cinco entrevistas por manzana, lo cual da un total de 80 viviendas seleccionadas. Se utilizaron dos equipos integrados por un jefe de grupo, cuatro entrevistadores y una persona de apoyo informático. Los resultados de la prueba piloto permitieron identificar y corregir errores en el cuestionario e implementar mejoras en el equipo de campo.

### Cuestionarios de recolección de información

El cuestionario se diseñó y programó para aplicarse en computadoras *laptop*. El cuestionario incluyó dos grandes rubros de información: a) información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales y b) información sobre los individuos seleccionados en cada uno de los grupos de edad. El primero se administró en los hogares de la muestra en el ámbito nivel nacional.

El informante adecuado para la sección del hogar fue el jefe de hogar, el ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más sin impedimentos para poder responder y con conocimientos de las características de la vivienda y sus residentes habituales.

Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador, por informante, a fin de asentar el código de resultado definitivo en el plano individual
- Características y nivel socioeconómico del hogar. Se registró información referente al total de cuartos, el tipo de material del piso, el tipo de material de construcción de la vivienda, la disponibilidad de agua entubada, el calentador de agua, la posesión de automóvil, así como al ingreso promedio mensual familiar
- Características de los miembros del hogar. Se identificó el número de miembros del hogar y para cada uno se recabó la siguiente información: nombre (listado de personas), edad, fecha de nacimiento, sexo, parentesco con el jefe de familia, nivel de escolaridad, estado civil y ocupación

## Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo previamente seleccionado por el equipo de investigación encargado del diseño muestral de la ENA 2008. Se administró un solo cuestionario individual en cada hogar visitado donde hubiera por lo menos un informante elegible, esto es, una persona entre 12 y 65 años de edad cumplidos al momento de la visita. También se incluyó una sobremuestra de adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

El cuestionario individual recabó información con respecto a los siguientes temas:

- Datos sociodemográficos del informante: sexo, edad, estado civil, escolaridad, datos sobre la familia, ocupación e ingreso familiar
- Consumo de tabaco
- Consumo de drogas
- Consumo de alcohol
- Dependencia y abuso al consumo de drogas
- Dependencia y abuso al consumo de alcohol
- Exposición al uso de drogas
- Consumo de drogas en el entorno familiar y social
- Percepción acerca de las drogas y de los usuarios
- Exposición a la prevención de drogas
- Tratamiento por consumo de drogas

El instrumento incluyó otras secciones que evaluaron aspectos de la salud mental como la sintomatología depresiva, el intento suicida y, del contexto social, la violencia de género, la conducta antisocial y la migración, además de los conocimientos y creencias sobre algunas enfermedades como el VIH/SIDA, la hepatitis y su relación con el consumo de drogas y el comportamiento sexual.

La parte principal del instrumento se aplicó al 100% de los entrevistados, y consistió hasta la sección de tratamiento y uso de servicios. Aproximadamente el 40% de los entrevistados, seleccionados aleatoriamente, contestaron las secciones adicionales que se indicaron en el párrafo anterior. Esta situación conlleva que para el análisis de estas secciones, se usa un ponderador específico, distinto del de la sección principal, para obtener resultados expandidos a nivel nacional. Esta situación refleja que al usar uno u otro ponderador, las expansiones de los grupos, sea por sexo, edad u otra variable, varíen ligeramente.

## Levantamiento de la ENA 2008

La fase inicial de campo de la ENA 2008 se llevó a cabo entre abril y junio de 2008. Antes de esta fase, se llevó a cabo una capacitación en la Ciudad de México del 24 de marzo al 4 de abril, en la cual se incluyeron dos días de prueba de campo, con la participación de los casi 300 encuestadores reclutados para el proyecto.

El periodo operativo de la ENA 2008 se implementó de forma simultánea en las 32 entidades federativas, con equipos integrados por un coordinador estatal, un supervisor y un grupo de

encuestadores. Para cada vivienda seleccionada, se programaron hasta cuatro visitas, incluyendo horarios especiales (antes de las 8 am o después de las 8 pm) y fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes. La encuesta se aplicó con captura simultánea de datos, es decir, que se utilizaron una aplicación informática y computadoras portátiles en campo para las entrevistas. El cuestionario básico de hogar considera las características demográficas y socioeconómicas, lo que permite contar con información tanto sobre el contexto en el que ocurre el consumo de sustancias, como sobre el perfil de los consumidores y los no consumidores.

El diseño consideró la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 años por hogar y de un adolescente de entre 12 y 17 años por hogar. La aplicación informática de la encuesta se programó para realizar una selección aleatoria del individuo o individuos a entrevistar a partir del listado de integrantes obtenido en el cuestionario básico de hogar. Debido a factores externos a la encuesta –relacionados con el contexto nacional y con problemas de inseguridad y climatológicos–, la tasa de respuesta de la encuesta fue menor a la esperada, lo que se tradujo en un número menor del necesario de entrevistas individuales completas para las estimaciones deseadas.

Debido a ello, posterior al término del periodo operativo inicial, se llevó a cabo uno especial de recuperación de entrevistas individuales en un conjunto de 11 entidades; éste se implementó entre julio y agosto de 2008. Adicionalmente, se tomó la decisión de elaborar una muestra más para 21 estados, de forma que se pudiera contar con observaciones suficientes para los análisis propuestos para la ENA 2008. El componente operativo para esta muestra adicional se implementó entre septiembre y octubre de 2008. Ambos operativos adicionales siguieron los procedimientos y estructura utilizados para el original.

Nayarit fue una de las entidades cuya muestra se cubrió en dos etapas. En la primera se visitaron 1 441 hogares y se entrevistó a 977 individuos, mientras que en la segunda fueron 197 los hogares y 144 los individuos encuestados. Las tasas de respuesta en la primera y segunda etapas fueron de 79.3% y 88.3%, respectivamente. La tasa global fue de 80.4 por ciento.

## Supervisión del periodo operativo

La estructura de campo se integró con un coordinador nacional, un subcoordinador nacional, 32 coordinadores estatales, 32 supervisores y siete entrevistadores por estado. Los coordinadores estatales y los supervisores fueron los encargados de la supervisión directa de las entrevistas y de la correcta ubicación de las viviendas.

El trabajo de supervisión se diseñó con base en las dos fases siguientes:

- Planeación y organización. En esta etapa, el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador a su cargo.
- Supervisión en campo. En esta etapa, el supervisor controló el levantamiento de la información, retroalimentó a los

entrevistadores con respecto a las dudas o problemas surgidos durante el levantamiento, así como respecto a los lineamientos de la capacitación. También verificó que los individuos y los hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente una de cada cuatro entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó 100% de los códigos de no respuesta.

Adicionalmente, la coordinación nacional de la encuesta en el INSP monitorizó regularmente las actividades en cada estado y, a partir de los informes recibidos –tanto internos como de las supervisiones del personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz– envió precisiones sobre la aplicación de los instrumentos o actividades del operativo. Se requirió que los coordinadores estatales informaran sobre el desempeño de cada uno de los encuestadores y verificaran las causales de no entrevista de las viviendas. Adicionalmente, el área responsable en el INSP envió supervisión con personal independiente del operativo para recontactar viviendas visitadas por entrevistadores con baja detección de casos de consumo y verificar la realización de las re-entrevistas.

### Supervisión externa ENA 2008

Para garantizar la calidad en los procesos de recopilación de la información en campo y la validez de la propia información, el INSP contrató una empresa para realizar una supervisión externa (SE) a sus procesos de recopilación de información en campo durante el periodo operativo de la encuesta. El objetivo de la SE fue medir la calidad de información en una submuestra de aproximadamente 10% del universo de viviendas de la ENA. El interés del equipo de investigadores de la ENA 2008 fue generar informes sobre procesos de recolección de información por parte de los entrevistadores

en campo y contar con los parámetros que permitieran determinar la validez y la confiabilidad de la información recolectada en campo. El INSP, en colaboración con el INPRFM, diseñó un cuestionario *ad hoc*; el formato de aplicación fue cara a cara y la duración de las entrevistas, fue de aproximadamente 15 minutos. El número estimado de entrevistas fue de 156 por entidad, de las cuales aproximadamente 70% se recabó en zonas urbanas y 30%, en zonas rurales.

La empresa ganadora llevó a cabo un proceso de capacitación en el cual participaron miembros del equipo de investigación del INSP con el fin de resolver dudas sobre temas conceptuales; además, se discutieron los objetivos de la ENA 2008 (mediante el uso de manuales y cuestionarios) y la importancia de contar con una supervisión externa. Durante el proceso de levantamiento en campo de la SE, se entregaron al INSP informes semanales de las incidencias detectadas y se registraron incidentes o situaciones que dificultaban el trabajo en campo. El informe final de la supervisión externa constituye un documento que registra el proceso de recolección de información de la ENA 2008 en la submuestra seleccionada.

### Consideraciones éticas

Todos los participantes leyeron (o les fue leída, en caso necesario) una carta de consentimiento informado. Se recabó información solamente de quienes aceptaron participar y firmaron la carta correspondiente.

En el caso de los menores de edad, los padres o tutores firmaron una carta de asentimiento previo a que el menor proporcionara la información requerida por la encuesta. Se hizo énfasis en el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.



**tabaco**

---

# Principales resultados

## ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tiene como objetivo estimar la prevalencia de vida (*lifetime prevalence*) del consumo de tabaco en la población. Bajo esta definición, se encontró que 35.9% de la población Nayarita entre 18 y 65 años, cerca de 194 mil personas, había probado alguna vez en su vida el cigarrillo. El 50.2% de los hombres y el 22.6% de las mujeres respondieron afirmativamente a esta pregunta (cuadro 1).

## Edad de consumo de tabaco por primera vez

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en la población de 18 a 65 años del estado de Nayarit es de 17.2 años (IC 95% 16.6–17.9).

## Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 61% de los fumadores (58.7% de los hombres y 65.7% de las mujeres) iniciaron el consumo de tabaco por curiosidad, mientras que 27.2% y 20.9% de los hombres y mujeres que fuman comenzaron a hacerlo por convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores (cuadro 2).

## ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida?

La pregunta ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida? tiene como objetivo estimar la prevalencia de consumo de tabaco en la población. Por muchos años esta fue la pregunta utilizada para la estimación de la prevalencia, en concordancia con la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al usar esta definición, se encontró que 19.6% de la población en el rango en estudio, cerca de 106 mil Nayaritas, había fumado más de 100 cigarrillos en su vida (cuadro 3). Desde el punto de vista epidemiológico (estimación

de prevalencias de fumadores, ex fumadores y nunca fumadores), esta definición sobreestima el consumo de tabaco en los adultos. Por esta razón y debido que la epidemia de tabaquismo es un problema de salud pública global y cambiante, que requiere de indicadores válidos y precisos para la vigilancia epidemiológica y la evaluación del cumplimiento de políticas y estrategias de control del tabaco, esta definición dejó de ser utilizada.

## Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado

Para caracterizar la población mexicana respecto al consumo de tabaco, se utilizaron las siguientes definiciones:

- Fumador activo: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber fumado durante el último año
- Ex fumador: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber dejado de fumar hace más de un año
- Nunca ha fumado: persona que contestó no haber fumado en la vida

Mediante el uso de estas definiciones se encontró que, entre los pobladores de 18 a 65 años de Nayarit, 17.6% eran fumadores activos, lo que representa cerca de 95 mil fumadores en el estado. La comparación de la prevalencia de consumo de tabaco a nivel estatal con el promedio nacional (20.6%) se puede observar en la figura 1. El 18.3% de los encuestados refirieron ser ex fumadores y el 64.1% no había fumado. El consumo de tabaco en los hombres fue de 27.5% y de 8.3% en las mujeres (cuadro 4).

## Fumadores activos

### Edad de inicio del consumo diario de cigarrillos

En Nayarit, los fumadores activos de 18 a 65 años inician el consumo diario de cigarrillos, en promedio, a los 16.5 años (IC95% 15.7-17.4). Los hombres a los 16 años y las mujeres a los 19 años.



**Cuadro 1**

Respuesta a la pregunta ¿Ha fumado alguna vez en su vida?. según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Nayarit. México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
<b>No</b>		N*	129.9	216.5	346.4
	IC95 %	L. Inferior	111.5	194.3	321.3
		L. Superior	148.2	238.8	371.6
		%	49.8	77.4	64.1
	IC95 %	L. Inferior	44.7	72.6	60.7
L. Superior		55.0	81.6	67.4	
<b>Sí</b>		N*	130.8	63.1	193.8
	IC95 %	L. Inferior	113.2	48.6	172.6
		L. Superior	148.3	77.6	215.1
		%	50.2	22.6	35.9
	IC95 %	L. Inferior	45.0	18.4	32.6
L. Superior		55.3	27.4	39.3	
<b>Total</b>		N*	<b>260.6</b>	<b>279.6</b>	<b>540.3</b>

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 2**

Razón por la que empezó a fumar según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Nayarit, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
<b>Porque su familia, amigos o compañeros fumaban</b>		N*	35.6	13.2	48.8
	IC95%	L. Inferior	24.3	6.5	35.3
		L. Superior	46.9	19.8	62.3
		%	27.2	20.9	25.2
	IC95%	L. Inferior	20.7	13.1	19.8
L. Superior		35.0	31.6	31.4	
<b>Por curiosidad</b>		N*	76.7	41.4	118.1
	IC95%	L. Inferior	62.9	29.4	101.4
		L. Superior	90.6	53.4	134.9
		%	58.7	65.7	61.0
	IC95%	L. Inferior	51.1	51.7	54.1
L. Superior		65.9	77.4	67.4	
<b>Otra razón</b>		N*	18.4	8.5	26.9
	IC95%	L. Inferior	12.3	3.1	19.5
		L. Superior	24.6	13.8	34.3
		%	14.1	13.4	13.9
	IC95%	L. Inferior	10.0	7.5	10.7
L. Superior		19.4	22.8	17.8	
<b>Total</b>		N*	<b>130.8</b>	<b>63.1</b>	<b>193.8</b>

\*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 3**

Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Nayarit, Mexico, 2008


		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
<b>No</b>	N*	176.9	257.2	434.1	
	IC95%	L. Inferior	155.4	231.0	404.1
		L. Superior	198.5	283.4	464.2
		%	67.9	92.0	80.4
	IC95%	L. Inferior	61.9	88.6	76.9
L. Superior		73.3	94.4	83.4	
<b>Sí</b>	N*	83.7	22.4	106.1	
	IC95%	L. Inferior	66.6	14.3	88.5
		L. Superior	100.9	30.5	123.8
		%	32.1	8.0	19.6
	IC95%	L. Inferior	26.7	5.6	16.6
L. Superior		38.1	11.4	23.1	
<b>Total</b>	N*	<b>260.6</b>	<b>279.6</b>	<b>540.3</b>	

\*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 1**

Prevalencia de fumador activo.  
Adultos de 18-65 años.  
Nayarit, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Consumo diario de cigarrillos (cantidad y duración)**

Los fumadores activos entre 18 y 65 años en Nayarit fuman, en promedio, nueve cigarrillos al día (IC95% 6-11), con un tiempo promedio de fumar diariamente de 11.4 años (IC95% 9.5-13.4). El 81.9% de los fumadores activos consume menos de 16 cigarrillos al día, 16% de 16 a 25 cigarrillos y el 2% más de 26 cigarrillos.

**Adicción**

Algunas de las características de los fumadores activos (aquellos que fumaron cigarrillos durante el último año) en la población entre 18 y 65 años residente en Nayarit, son las siguientes: 75.5% le dan el golpe al cigarro algunas veces o siempre; 12.9% fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse; el periodo en el que fuman con mayor frecuencia, en 82.7% de los casos, es en el transcurso de la tarde y la noche.

**Estrategias para dejar de fumar**

A los fumadores activos entre 18 y 65 años se les solicitó información sobre el dejar de fumar. Sobre esto 10.3% contestaron que les sería difícil abstenerse de fumar en lugares públicos, y 65.7% que han intentado dejar de fumar alguna vez. Las principales formas en que lo hicieron fueron: dejar de fumar súbitamente (57.9%); dejar de comprar cigarrillos (10%); sustituir fumar por otra actividad (2.9%), y disminuir gradualmente el número de cigarrillos (21.5%). Únicamente el 1.9% se ha sometido a un tratamiento para dejar de fumar.

**Cuadro 4**

Fumador activo, Exfumador y Nunca ha fumado según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Nayarit, México, 2008

		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Nunca ha Fumado	N*	129.9	216.5	346.4	
	IC95%	L. Inferior	111.5	194.3	321.3
		L. Superior	148.2	238.8	371.6
		%	49.8	77.4	64.1
	IC95%	L. Inferior	44.7	72.6	60.7
L. Superior		55.0	81.6	67.4	
Fumador actual**	N*	71.7	23.3	95.0	
	IC95%	L. Inferior	55.6	14.9	77.5
		L. Superior	87.8	31.7	112.5
		%	27.5	8.3	17.6
	IC95%	L. Inferior	22.5	5.8	14.7
L. Superior		33.2	11.8	20.9	
Exfumador	N*	59.1	39.8	98.8	
	IC95%	L. Inferior	48.3	27.3	82.2
		L. Superior	69.8	52.3	115.5
		%	22.7	14.2	18.3
	IC95%	L. Inferior	18.9	10.7	15.6
L. Superior		26.9	18.7	21.4	
Total	N*	<b>260.6</b>	<b>279.6</b>	<b>540.3</b>	

\*N en miles

\*\* Fumó en el último año

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

El 77.6% de los fumadores activos entre 18 y 65 años ha escuchado hablar sobre algún medicamento que ayuda a dejar de fumar. De ellos, 61.1% están de acuerdo en que si decidieran dejar de fumar, las medicinas (chicles y parches con nicotina, o bupropión) les ayudarían a hacerlo; 33.6% opinaron que dichas medicinas son muy caras; 28% contestaron que estas medicinas pueden dañar su salud; 20.7% respondieron que esas medicinas son muy difíciles de conseguir. Finalmente, 81.7% mencionaron que si decidieran dejar de fumar, podrían hacerlo sin la ayuda de las mencionadas medicinas (cuadro 5).

**Ex fumadores**

En Nayarit, 18.3% de la población entre 18 y 65 años, cerca de 99 mil personas, refirieron ser ex fumadores. La edad promedio en la que los adultos que, habiendo fumado alguna vez en su vida, y que al momento de la encuesta se consideraban ex fumadores, dejaron de fumar, fue a los 28.5 años; a los 29.4 años para el caso de los hombres y a los 26.9 para las mujeres. Estos ex fumadores fumaban, en promedio, ocho cigarrillos al día: diez y seis los hombres y las mujeres, respectivamente. Las principales razones por las que los ex fumadores dejaron de fumar fueron: por conciencia del daño a la salud (29%) y porque se hartaron de fumar (13.5%). Estas proporciones fueron semejantes entre hombres y mujeres.

**Nunca han fumado**

El 64.1% de la población (49.8% de los hombres y 77.4% de las mujeres) entre 18 y 65 años del estado de Nayarit refirió no haber fumado.

**Exposición al humo de tabaco ambiental (HTA)**

26.6% de los encuestados que nunca han fumado, representativos de cerca de 123 mil Nayaritas, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA); así lo expresaron 30.4% de los hombres y 24% de las mujeres en esta categoría, mientras que 32.8% de los adolescentes, equivalente a cerca de 38 mil adolescentes en el estado, reportaron estar expuestos al HTA (cuadro 6).

**Percepción de las políticas de control del tabaco**

En cuanto a la opinión que los participantes de esta encuesta expresaron sobre las medidas de protección a la salud relativas al establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos, estuvieron completa o medianamente a favor de que fueran establecidas: En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos, 92%, en cines y otros lugares de espectáculos, 93.2%; en bares y otros lugares

**Cuadro 5**

Opinión de los fumadores activos sobre los medicamentos para dejar de fumar. Adultos de 18 a 65 años. Nayarit, México, 2008

	N*	IC 95%		%	IC 95%	
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior
<b>Si decidiera fumar. estas medicinas le ayudarían a hacerlo</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	45.0	32.7	57.4	61.1	51.2	70.2
Complemento	28.7	19.8	37.5	38.9	29.8	48.8
<b>Las medicinas para dejar de fumar son carísimas</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	24.8	14.4	35.2	33.6	24.2	44.6
Complemento	48.9	38.1	59.7	66.4	55.4	75.8
<b>Las medicinas para dejar de fumar pueden dañar su salud</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	20.6	10.3	30.9	28.0	17.2	42.1
Complemento	53.1	38.6	67.5	72.0	57.9	82.8
<b>Si decidiera dejar de fumar. podría hacerlo sin estas medicinas</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	60.2	45.8	74.6	81.7	74.4	87.3
Complemento	13.5	8.5	18.5	18.3	12.7	25.6
<b>Las medicinas para dejar de fumar son muy difíciles de conseguir</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	15.2	8.6	21.9	20.7	14.0	29.4
Complemento	58.5	45.2	71.7	79.3	70.6	86.0
<b>Total</b>	<b>73.7</b>	<b>58.2</b>	<b>89.2</b>	<b>100.0</b>		

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 6**

Exposición a humo de tabaco ambiental, según sexo y grupos de edad. Nayarit, México, 2008

		Sexo		Grupos de edad			
		Hombre	Mujer	Adolescentes	Adultos	Total	
<b>No</b>	N*	131.5	208.6	78.4	261.6	340.1	
	IC 95 %						
		L. Inferior	114.0	179.8	68.1	235.3	308.8
		L. Superior	148.9	237.4	88.8	287.9	371.3
		%	69.6	76.0	67.2	75.5	73.4
		IC 95 %					
	L. Inferior	64.2	70.3	61.1	71.3	69.3	
	L. Superior	74.5	81.0	72.8	79.3	77.1	
<b>Sí</b>	N*	57.4	65.7	38.3	84.8	123.1	
	IC 95 %						
		L. Inferior	45.4	51.5	29.4	71.2	104.4
		L. Superior	69.3	79.9	47.1	98.5	141.7
		%	30.4	24.0	32.8	24.5	26.6
		IC 95 %					
	L. Inferior	25.5	19.0	27.2	20.7	22.9	
	L. Superior	35.8	29.7	38.9	28.7	30.7	
<b>Total</b>	N*	<b>188.8</b>	<b>274.3</b>	<b>116.7</b>	<b>346.4</b>	<b>463.1</b>	

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

en donde se venden bebidas con alcohol, 66.1%; en hospitales y otros centros de atención a la salud, 98.2%; en lugares de trabajo, 91.9%; en el transporte público, 96%. El 95.3% estuvo completa o medianamente

a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado. Proporciones semejantes se obtienen al estratificar por edad, es decir, entre los adolescentes y los adultos (cuadro 7).

**Cuadro 7**

Percepción sobre medidas de protección a la salud en lugares públicos según grupos de edad. Nayarit, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%		
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior	
<b>Adolescentes</b>							
<b>En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	119.4	106.3	132.5	91.2	86.3	94.5	
Complemento	11.5	5.9	17.1	8.8	5.5	13.7	
<b>En cines y otros lugares de espectáculos</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	122.8	109.5	136.1	93.8	90.7	95.9	
Complemento	8.1	4.5	11.7	6.2	4.1	9.3	
<b>En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	79.9	68.7	91.1	61.0	54.6	67.0	
Complemento	51.0	40.6	61.4	39.0	33.0	45.4	
<b>En hospitales y otros centros de atención a la salud</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	128.0	114.9	141.1	97.7	94.9	99.0	
Complemento	3.0	0.4	5.6	2.3	1.0	5.1	
<b>En lugares de trabajo</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	118.6	106.3	131.0	90.6	86.8	93.4	
Complemento	12.3	7.5	17.2	9.4	6.6	13.2	
<b>En el transporte público</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	123.6	109.8	137.4	94.4	90.5	96.7	
Complemento	7.4	3.3	11.5	5.6	3.3	9.5	
<b>Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	125.0	111.7	138.2	95.4	92.4	97.3	
Complemento	6.0	2.6	9.3	4.6	2.7	7.6	
<b>Total</b>	<b>130.9</b>	<b>116.6</b>	<b>145.3</b>	<b>100.0</b>			
<b>Adultos</b>							
<b>En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	498.2	466.3	530.1	92.2	89.7	94.2	
Complemento	42.1	30.5	53.7	7.8	5.8	10.3	
<b>En cines y otros lugares de espectáculos</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	502.8	474.7	531.0	93.1	91.5	94.4	
Complemento	37.4	29.5	45.3	6.9	5.6	8.5	
<b>En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	363.4	329.7	397.2	67.3	62.7	71.5	
Complemento	176.8	153.1	200.6	32.7	28.5	37.3	
<b>En hospitales y otros centros de atención a la salud</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	530.9	502.6	559.1	98.3	96.7	99.1	
Complemento	9.4	3.3	15.4	1.7	0.9	3.3	
<b>En lugares de trabajo</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	498.5	468.6	528.3	92.3	90.0	94.0	
Complemento	41.8	31.1	52.6	7.7	6.0	10.0	
<b>En el transporte público</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	520.7	492.3	549.2	96.4	95.1	97.3	
Complemento	19.5	13.6	25.5	3.6	2.7	4.9	
<b>Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado</b>							
Completamente a favor/medianamente a favor	514.7	487.9	541.5	95.3	93.4	96.6	
Complemento	25.6	16.5	34.7	4.7	3.4	6.6	
<b>Total</b>	<b>540.3</b>	<b>511.9</b>	<b>568.6</b>	<b>100.0</b>			

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# Conclusiones

**A**nivel nacional en la población de 18 a 65 años se encontró que 20.6% de la población era fumadora activa (31.3% de los hombres y 10.9% de las mujeres); 19.6% eran ex fumadores (24.3% de los hombres y 15.3% de las mujeres), y 59.8% nunca habían fumado (44.4% de los hombres y 73.9% de las mujeres).

En Nayarit se encontró que los fumadores activos constituían 17.6% de la población (cerca de 95 mil personas), con una prevalencia menor al promedio nacional. Los fumadores activos iniciaron el consumo diario de cigarrillos a los 16.5 años, fuman en promedio nueve cigarrillos diarios y 12.9% de ellos fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse.

El 18.3% de la población en el rango estudiado, cerca de 99 mil, son ex fumadores y la razón más importante por la que dejaron

de fumar fue la conciencia por los daños a la salud que provoca el consumo de tabaco.

El 64.1% de este sector poblacional, cerca de 346 mil personas, refirió nunca haber fumado. Sin embargo, de este grupo 24.5% de los adultos, cerca de 85 mil, y 32.8% de los adolescentes, cerca de 38 mil, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA).

La opinión de los habitantes de Nayarit acerca del establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos es de apoyo, pues el 95.3% de los adultos y adolescentes estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado.

drogas

# Principales resultados

Los resultados en Nayarit muestran que la exposición al consumo de drogas (que les hayan regalado o intentado vender drogas) en los hombres es mayor al promedio nacional y en las mujeres es similar al promedio. Para los hombres, la razón es de 1.3 hombres en el estado por cada 1 a nivel nacional y en las mujeres, la razón es de 1.1 mujeres en Nayarit por cada 1 a nivel nacional.

Al igual que los resultados nacionales, más hombres (40%) que mujeres están expuestos (8.9%).

Esto se refleja en las prevalencias del consumo global de drogas (sin incluir tabaco ni alcohol), en donde se observa que el consumo es también mayor al promedio nacional tanto en los hombres (12.0%) como en las mujeres (3.4%) (figura 1).

Una situación similar ocurre para las drogas ilegales, en donde el consumo en el estado también es mayor al promedio nacional, en un 2.0% en el caso de los hombres y un 0.6% en las mujeres (figura 2).


Esta situación es diferente para las drogas médicas, ya que el consumo del estado, se encuentra dentro del promedio nacional, tanto en hombres como en mujeres.

En cuanto al consumo de algunas drogas específicas, en la marihuana y cocaína es mayor en el estado para ambos sexos en comparación con el nacional. En el caso de las metanfetaminas, el consumo en mujeres y hombres es igual al promedio (figura 3).

Adicional a lo señalado anteriormente, en todos los casos, el consumo de estas drogas es mayor en los hombres en comparación con las mujeres.

Los datos de la encuesta permiten aproximarnos a la demanda de necesidades de atención de la población total, de manera que en lo alto de la pirámide de atención, se observa que el 1.0% de ella presenta dependencia, que corresponde a poco más de 6,600 personas en el estado.

**Figura 1**  
Exposición y consumo de drogas según sexo. Nayarit, México, 2008




Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Figura 2**


Consumo de drogas médicas e ilegales según sexo. Nayarit, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 3**

Consumo de marihuana, cocaína y metanfetaminas según sexo. Nayarit, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Al analizar otros aspectos sobre el consumo de drogas, casi dos terceras partes de los hombres y las mujeres, señala que el número de usuarios se ha incrementado en los últimos cinco años en el país.

De la misma forma, prevalece la creencia de que el adicto a las drogas es alguien que necesita ayuda (68.8%) y es una persona enferma (66.4%); en tanto, una menor proporción considera que necesariamente es un delincuente (26.7%) o que es independiente (15.4%).

En cuanto a qué hacer para rehabilitar a las personas adictas a las drogas, la mitad de la gente señala que deben ser enviadas a granjas especiales fuera de la ciudad (51.8%).

Con relación a la percepción de las drogas, la cocaína (81.0%), la marihuana (80.7%), y el alcohol (73.4%), son las que señalan en el estado como las de mayor potencial adictivo.

Al analizar algunas de las características de quienes usan drogas, especialmente en la población de 12 a 25 años, se observa que en su mayoría son personas que no estudian, que se encuentran trabajando o recibiendo algún salario que les permite comprarla y que sólo viven con su mamá, además de que en el entorno social en que se mueven, hay personas que consumen drogas.

# Conclusiones

Los resultados muestran que en Nayarit, el consumo de drogas es mayor que el promedio nacional, tanto en hombres como en mujeres, especialmente la marihuana y la cocaína. Sólo en el caso de drogas médicas y metanfetaminas, el consumo en ambos sexos, está dentro del promedio nacional.

Adicionalmente, el porcentaje de personas dependientes al consumo de drogas en Nayarit es de 1.0%, que está por arriba del promedio nacional que es del 0.6%.

También se muestra que la exposición a la oportunidad de consumo, en los hombres es mayor en el estado y en las mujeres es similar al promedio.

De la misma forma, en la población más joven, quienes ya no estudian, trabajan y viven sólo con su mamá, son quienes están más expuestos y consumen drogas en mayor proporción. Lo cual refuerza el valor protector no sólo de la asistencia a la escuela, sino de la importancia de dotar de estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar. En el ámbito familiar, es importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas.

Si bien no se tienen fuentes directas de estudios similares en el estado, regularmente se le había incluido como un estado de consumo promedio del país. Los datos del actual estudio dirigen nuestra atención a que el consumo en el mismo es mayor al reportado en el promedio nacional, indicando un crecimiento importante en los últimos años.

**alcohol**

---

# Principales resultados


**E**n relación al consumo diario de alcohol, en las mujeres (0.1%) está por debajo del promedio mientras que en los hombres (2.5%) es más alto que el promedio nacional.

En cuanto al consumo alto, los hombres y las mujeres se encuentran por arriba de la media nacional (44.0% y 22.4%, respectivamente) (figura 1).

Para el consumo consuetudinario, se observa un consumo mayor al nacional tanto en los hombres (12.6%) como en las mujeres (3.1%) (figura 2).


Finalmente, en relación con el abuso/dependencia, en el estado se encuentra que para los hombres (17.2%) y para las mujeres (3.0%) el consumo está por arriba del promedio nacional.

**Figura 1**  
Consumo diario y alto de alcohol según sexo. Nayarit, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 2**  
Consumo consuetudinario y abuso/dependencia de alcohol según sexo. Nayarit, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# Conclusiones

**E**n el caso de alcohol, el consumo en general es mayor al promedio, sólo el consumo diario en las mujeres se encuentra por debajo del promedio nacional. Llama la atención el porcentaje elevado de hombres que muestra abuso/dependencia en Nayarit.

Bajo este contexto, es importante canalizar mayores esfuerzos a la prevención primaria del problema, en los distintos segmentos de la sociedad, con la intención de disminuir la problemática y, de

manera especial, trabajar con la población infantil, a fin de dotar a esta comunidad de mejores estrategias para enfrentar la problemática y tener mejores oportunidades de vida.

El incremento en el número de usuarios/as fuertes y los problemas asociados, nos indica la necesidad prioritaria de atender adecuadamente y con estrategias efectivas a quienes se encuentran en el proceso de adicción al consumo.



# referencias y glosario

# Referencias

1. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Primera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
2. Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Segunda Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1993.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
4. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática. Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 2002.
5. Villatoro J, Gutiérrez M, Quiroz N, Moreno M, Gaytán L, Gaytán F *et al.* Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. México DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2007.
6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Tratamiento no Gubernamentales. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
7. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Integración Juvenil. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Consejo Tutelar para Menores. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.



## Tabaco

**Adolescente:** en la encuesta, persona de 12 a 17 años de edad.

**Adulto:** en la encuesta, persona de 18 a 65 años de edad.

**Ex fumador:** persona que al momento de la entrevista refirió haber dejado de fumar cigarros hace más de un año.

**Fumador actual:** persona que al momento de la entrevista refirió haber fumado cigarros al menos una vez durante el año previo a la entrevista.

**Fumador pasivo:** persona que refirió nunca haber fumado, que convive a diario con al menos una persona que fuma cigarros en su casa, en el salón de clases o en su trabajo.

**Localidad rural:** localidad con menos de 2 500 habitantes.

**Localidad urbana:** localidad con 2 500 habitantes o más.

**Nunca fumador:** persona que al momento de la entrevista refirió nunca haber fumado cigarros en su vida.

## Drogas

**Drogas ilegales:** marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o estimulantes tipo anfetamínico (metanfetaminas).

**Drogas médicas:** son aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Para considerarse como consumo para drogarse, el uso se debe dar fuera de o en mayor tiempo al prescrito por el médico.

**Incidencia acumulada:** se refiere a la prevalencia global de consumo.

**Consumo en los últimos 12 meses:** consumo de alguna sustancia en los últimos 12 meses; también se le conoce como prevalencia anual.

**Consumo en los últimos 30 días:** Consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días; también se le conoce como prevalencia actual.

**Índice de continuidad:** es el porcentaje obtenido de dividir el número de usuarios del último año entre el número de usuarios que han consumido alguna vez.

**Formas de uso:** vía de utilización de las distintas drogas ilegales. En el cuestionario se les pregunta si las usaron en forma inyectada, inhalada, aspirada, fumada, tomada, tragada o comida.

**Uso de servicios:** se refiere a que la población acude en búsqueda de apoyo para sus problemas de salud. En el caso de esta encuesta se les pregunta si han solicitado ayuda por el consumo de alguna de las drogas en los siguientes lugares: hospital general o centro comunitario, hospital o servicio psiquiátrico, médicos privados, sacerdotes, curanderos, grupo de Alcohólicos Anónimos u otros.

**Mariguana regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido esta sustancia regalada o para su compra.

**Cualquier droga regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, sea regalada o para su compra.

**Otra droga regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, a excepción de la marihuana, sea regalada o para su compra.

**Índice de exposición a drogas:** es la oportunidad que tienen los sujetos de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

**Consumo experimental:** es cuando una persona reporta haber usado entre una y cinco veces una o más sustancias.

**Consumo regular:** es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones.

**Dependencia a drogas:** es cuando una persona reporta haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo.

**Remisión por uso de drogas:** se refiere a cuando una persona asistió a tratamiento debido a su consumo de drogas.

**Uso dada la oportunidad:** se refiere a las personas que consumen drogas y que reportaron que previamente se les había ofrecido alguna sustancia.

**Dependencia dado el abuso:** se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

**Remisión dado el abuso:** se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su abuso de drogas.

**Remisión dada la dependencia:** se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su dependencia hacia las drogas.

**Necesidades de atención por uso de drogas:** se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de dependencia a las drogas, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

## Alcohol

**Consumo diario:** Consumir diariamente al menos una copa de una bebida con contenido de alcohol.

**Bebedores altos:** Aquellas personas que por lo menos alguna vez en su vida han consumido cinco copas o más en una sola ocasión, para los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión, para las mujeres.

**Abuso/dependencia al alcohol:** Se refiere a una concepción amplia que incluye la presencia de distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de algunas manifestaciones físicas, cognitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un malestar significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de los síntomas de este consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún momento repetitivamente dentro de los últimos 12 meses.

**Equivalencias de bebidas alcohólicas:** Para efectos de establecer el patrón de consumo y el consumo per cápita, se consideran las siguientes equivalencias:

Un trago o copa es igual a:

1 lata o botella mediana de cerveza (330 ml)

1 jarro o jícara de pulque de 500 ml

1 vaso de 120 ml de vino de mesa

1 vaso o copa de destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra (30 ml)

1 botella "coolers" de vino (300 ml)

1 copa "farolazo" (30 ml)

**Necesidades de atención por consumo de alcohol:** Se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de abuso/

dependencia al alcohol, el segundo valor es el de presentar algún problema de abuso/dependencia, sin que reúna el criterio de abuso/dependencia completo. El tercer valor de riesgo consiste en haber consumido cinco copas (hombres) o cuatro copas (mujeres) alguna vez en la vida, sin incluirse en las categorías anteriores. Finalmente, la cuarta categoría corresponde a quienes no han consumido alcohol o que su consumo ha sido muy bajo.

## Conceptos de metodología

**Estudios epidemiológicos:** Una visión global del problema se obtiene utilizando diferentes estrategias que permiten conocer la extensión y magnitud del consumo en diferentes grupos de población; para interpretar sus resultados es necesario que se tome en cuenta sus características propias, ventajas y desventajas. Los porcentajes de consumo que se anexan en la sección de antecedentes y que provienen de estas dos fuentes no son estrictamente comparables. Permiten sin embargo determinar si han existido cambios en los índices con el tiempo, en las diferencias por sexo o por tipo de droga. Los siguientes apartados guían al lector sobre los diferentes estudios que se citan en la sección de antecedentes en cada estado, a fin de facilitar su lectura adecuada.

**Encuestas en población escolar sobre adicciones:** Las encuestas de escuelas tienen la ventaja de ser autoaplicables. Las encuestas que se citan en la sección de antecedentes se aplicaron en forma colectiva sin identificar al sujeto, la última unidad de análisis es el grupo escolar y sólo participa un encuestador/a por grupo sin la presencia de maestros/as o autoridades de la escuela. El método facilita las respuestas de los/as estudiantes y regularmente se obtienen resultados más elevados que en las encuestas en hogares. Tienen como desventaja el excluir a la población joven que ya no está en la escuela, haberse aplicado en un rango corto de edad de los 12 a 19 años (sólo cuando se incluyen estudiantes de licenciatura el rango se incrementa hacia los 25 años), los estudios hechos en 1991, aquellos hechos en la Ciudad de México y que se han ampliado a partir del 2000 en diversos estados, abarcan población rural y urbana.

**Encuestas en hogares sobre adicciones:** Las encuestas de hogares abarcan a un rango más amplio de población, incluyen población de 12 a 65 años, abarcan población urbana y rural incluyen población adolescente y adulta que asiste y no asiste a la escuela e incluyen viviendas desde las que se ubican en grandes metrópolis hasta viviendas ubicadas en municipios poco habitados y con índices más bajos de consumo, además al ser autoaplicables tienden a tener un índice más alto de baja

respuesta. En estos estudios se elige en forma aleatoria a uno o más individuos en el hogar, una vez aplicada una cédula de la vivienda. La entrevista regularmente se hace cara a cara y la persona entrevistada sabe que el/a entrevistador/a conoce su nombre y la ubicación de su domicilio. El/a participante elige si participa o no y se le da un formato de consentimiento informado. Dado que es una entrevista cara a cara, la aplicación se realiza en forma individual. Ante ello, es importante que el/la entrevistador/a tenga un alto grado de entrenamiento y manejo de la situación de entrevista, a fin de dirigirla en forma ágil y que se gane la confianza del/a entrevistado/a para que se obtengan respuestas reales, especialmente en temas difíciles como el consumo de drogas o situaciones problemáticas asociadas al consumo. Comúnmente en nuestro país, la población objetivo de estos estudios es aquella que vive en sus hogares, entre los 12 y 65 años de edad y que sepan hablar español.

**Estudios con usuarios de drogas (SISVEA, CIJ):** Estos estudios se llevan a cabo con población ya consumidora de drogas y que decide asistir a una opción de tratamiento debido a su consumo de drogas, por lo que el 100% de las personas consumen drogas. Por lo común, se aplica una cédula estandarizada sobre el consumo y abuso de diversas drogas y elementos que permiten obtener el perfil de los/as usuarios/as, la aplicación se realiza la primera vez que el/a usuario/a asiste al centro de tratamiento y se aplica en forma de entrevista cara a cara. Debido a estas

situaciones es que los porcentajes de consumo derivados de estos estudios son más altos que en la población de los dos estudios anteriores. Adicionalmente, la proporción de hombres que van a este tipo de tratamiento es mucho mayor, aunque recientemente se está incrementando el número de mujeres que solicitan ayuda por su consumo de droga.

Ante las diferencias en el método y poblaciones de estos tipos de estudios, un punto central para determinar congruencia entre lo que se reporta en unos y otros, es principalmente el orden de preferencia de las drogas, que debe ser similar entre ellos, aunque cuando se da un cambio importante en las preferencias, éste se registra dos o tres años después en los estudios con usuarios de drogas, ya que primero se detecta en los estudios con escolares y población general. Hacer una comparación de prevalencias es posible aunque inadecuado, ya que los rangos de edad no son iguales y los métodos de aplicación de los cuestionarios no son iguales. Otro punto de interés para comparar resultados es la detección de casos de consumo de drogas de más difícil acceso, si está presente el consumo de una droga en el estado, en los tres ámbitos de estudio señalados, debe aparecer la presencia de la droga.

Finalmente, internacionalmente y en el país, es común que las cifras de consumo en hogares son menores a las detectadas en escolares. En el caso de usuarios/as no hay comparación en el indicador, debido a que en el denominador sólo hay usuarios/as.



# anexos

---

## A. Drogas

Resultados del estado

---

Intervalos de confianza

## B. Alcohol

Resultados estatales

---

Intervalos de confianza

C. Estadísticas de fuentes estatales sobre  
antecedentes de consumo de drogas

## Resultados del estado

### Cuadro A1

Características sociodemográficas según sexo de la población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Características sociodemográficas	Hombres			Mujeres			Total		
	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %
<b>Situación Escolar</b>									
Estudia actualmente	88.0	28.3	1.0	82.2	26.2	4.5	85.2	27.2	2.8
No estudia	12.0	71.7	99.0	17.8	73.8	95.5	14.8	72.8	97.2
<b>Nivel de Estudios</b>									
Ninguna/primaria	28.1	9.2	44.9	19.0	5.6	46.1	23.6	7.3	45.5
Secundaria	56.4	40.8	30.3	59.0	33.9	36.0	57.6	37.2	33.2
Bachillerato o equivalente	15.3	29.8	20.0	22.1	48.9	14.3	18.6	39.8	17.1
Licenciatura	.2	20.2	4.9	--	11.6	3.5	.1	15.7	4.2
Posgrado	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Situación Laboral</b>									
Trabaja	19.1	64.5	84.5	7.3	26.1	37.0	13.3	44.1	60.2
Ama de casa	1.2	2.4	1.9	9.6	41.3	55.9	5.3	23.0	29.6
Desempleado	79.7	33.2	13.6	83.1	32.6	7.0	81.4	32.9	10.2
<b>Vive con</b>									
Padre y Madre	67.0	50.6	9.6	64.5	24.8	4.4	65.8	36.9	6.9
Sólo padre	1.5	2.3	1.6	3.0	.5	.8	2.3	1.4	1.2
Sólo madre	22.1	19.5	6.6	17.0	19.0	4.5	19.6	19.2	5.5
Otro	9.3	27.6	82.2	15.5	55.7	90.3	12.3	42.5	86.4
<b>Estado Civil</b>									
Casado/unión libre	1.3	28.7	80.7	4.7	40.1	78.8	2.9	34.7	79.7
Separado/viudo/divorciado	.9	.2	3.7	--	3.7	10.6	.5	2.1	7.3
Soltero	97.8	71.1	15.6	95.3	56.2	10.5	96.6	63.2	13.0

\*Porcentajes obtenidos de la población total por columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A2**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas según sexo, población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 322 228		Mujeres 348 986		Total 671 214	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	208 581	64.7	212 141	60.8	420 722	62.7
Sigue igual	82 816	25.7	108 553	31.1	191 369	28.5
Parece que va disminuyendo	30 831	9.6	28 292	8.1	59 123	8.8

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A3**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad, población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 282 114		26-34 años 108 786		35-65 años 280 314	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	163 378	57.9	72 824	66.9	184 520	65.8
Sigue igual	98 996	35.1	27 934	25.7	64 439	23.0
Parece que va disminuyendo	19 740	7.0	8 028	7.4	31 355	11.2

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A4**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en hombres. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 147 757		26-34 años 45 615		35-65 años 128 856	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	84 586	57.2	32 519	71.3	91 476	71.0
Sigue igual	47 246	32.0	8 268	18.1	27 302	21.2
Parece que va disminuyendo	15 925	10.8	4 828	10.6	10 078	7.8

\*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A5**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en mujeres. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 134 357		26-34 años 63 171		35-65 años 151 458	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	78 792	58.6	40 305	63.8	93 044	61.4
Sigue igual	51 750	38.5	19 666	31.1	37 137	24.5
Parece que va disminuyendo	3 815	2.8	3 200	5.1	21 277	14.0

\*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A6**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas según sexo, población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 322 228		Mujeres 348 986		Total 671 214	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	213 561	66.3	232 419	66.6	445 980	66.4
Débil	161 699	50.2	175 210	50.2	336 909	50.2
Independiente	47 624	14.8	55 556	15.9	103 180	15.4
Egoísta	81 946	25.4	102 599	29.4	184 545	27.5
Que necesita ayuda	208 762	64.8	252 853	72.5	461 615	68.8
Delincuente	74 821	23.2	104 218	29.9	179 039	26.7

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A7**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad, población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 282 114		26-34 años 108 786		35-65 años 280 314	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	186 737	66.2	69 949	64.3	189 294	67.5
Débil	137 244	48.6	57 712	53.1	141 953	50.6
Independiente	53 819	19.1	15 971	14.7	33 390	11.9
Egoísta	84 732	30.0	27 592	25.4	72 221	25.8
Que necesita ayuda	202 904	71.9	76 323	70.2	182 388	65.1
Delincuente	78 048	27.7	36 328	33.4	64 663	23.1

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro A8**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en hombres. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 147 757		26-34 años 45 615		35-65 años 128 856	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	100 147	67.8	29 460	64.6	83 954	65.2
Débil	79 727	54.0	23 181	50.8	58 791	45.6
Independiente	30 816	20.9	5 127	11.2	11 681	9.1
Egoísta	48 854	33.1	6 978	15.3	26 114	20.3
Que necesita ayuda	104 948	71.0	30 256	66.3	73 558	57.1
Delincuente	41 667	28.2	16 658	36.5	16 496	12.8

\*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A9**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en mujeres. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 134 357		26-34 años 63 171		35-65 años 151 458	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	86 590	64.4	40 489	64.1	105 340	69.6
Débil	57 517	42.8	34 531	54.7	83 162	54.9
Independiente	23 003	17.1	10 844	17.2	21 709	14.3
Egoísta	35 878	26.7	20 614	32.6	46 107	30.4
Que necesita ayuda	97 956	72.9	46 067	72.9	108 830	71.9
Delincuente	36 381	27.1	19 670	31.1	48 167	31.8

\*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A10**

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo, población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 322 228		Mujeres 348 986		Total 671 214	
	N	%	N	%	N	%
<b>Considera que estas sustancias producen adicción:</b>						
Mariguana	255 561	79.3	286 305	82.0	541 866	80.7
Alucinógenos	179 542	55.7	199 528	57.2	379 070	56.5
Cocaína	262 395	81.4	281 173	80.6	543 568	81.0
Heroína	197 333	61.2	224 835	64.4	422 168	62.9
Inhalables	177 035	54.9	210 547	60.3	387 582	57.7
Alcohol	240 982	74.8	251 860	72.2	492 842	73.4
Tabaco	229 203	71.1	247 656	71.0	476 859	71.0

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A11**

Percepción de la población total sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias por grupos de edad. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 282 114		26-34 años 108 786		35-65 años 280 314	
	N	%	N	%	N	%
<b>Considera que estas sustancias producen adicción:</b>						
Mariguana	238 007	84.4	89 289	82.1	214 570	76.5
Alucinógenos	172 795	61.3	59 470	54.7	146 805	52.4
Cocaína	232 175	82.3	87 866	80.8	223 527	79.7
Heroína	188 541	66.8	70 222	64.6	163 405	58.3
Inhalables	175 181	62.1	62 220	57.2	150 181	53.6
Alcohol	208 785	74.0	81 445	74.9	202 612	72.3
Tabaco	212 367	75.3	78 279	72.0	186 213	66.4

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A12**

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia según sexo. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 322 228		Mujeres 348 986		Total 671 214	
	N	%	N	%	N	%
<b>Rehabilitación más efectiva para un adicto:</b>						
Que los metan en la cárcel	3 163	1.0	3 331	1.0	6 494	1.0
Que los internen en hospitales psiquiátricos	62 384	19.8	73 317	21.7	135 701	20.8
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	150 910	48.0	187 410	55.5	338 320	51.8
Curarles en su propio ambiente	41 293	13.1	38 481	11.4	79 774	12.2
Que se curen por su cuenta	33 308	10.6	14 436	4.3	47 744	7.3
Otra	23 558	7.5	20 991	6.2	44 549	6.8

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A13**

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia por grupos de edad, Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 282 114		26-34 años 108 786		35-65 años 280 314	
	N	%	N	%	N	%
<b>Rehabilitación más efectiva para un adicto:</b>						
Que los metan en la cárcel	1 327	.5	1 783	1.7	3 384	1.2
Que los internen en hospitales psiquiátricos	76 099	27.5	17 784	17.1	41 818	15.4
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	133 921	48.5	56 419	54.3	147 980	54.3
Curarles en su propio ambiente	40 766	14.8	12 467	12.0	26 541	9.7
Que se curen por su cuenta	17 299	6.3	4 535	4.4	25 910	9.5
Otra	6 864	2.5	10 952	10.5	26 733	9.8

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A14**

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud según sexo. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 322 228		Mujeres 348 986		Total 671 214	
	N	%	N	%	N	%
<b>El consumo de drogas ilegales tiene relación con:</b>						
La violencia familiar y social	276 534	85.8	312 715	89.6	589 249	87.8
Los accidentes	288 175	89.4	315 610	90.4	603 785	90.0
<b>Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA</b>						
	291 674	90.5	322 632	92.4	614 306	91.5
<b>Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA</b>						
	255 186	79.2	274 335	78.6	529 521	78.9

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A15**

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud, por grupos de edad. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 282 114		26-34 años 108 786		35-65 años 280 314	
	N	%	N	%	N	%
<b>El consumo de drogas ilegales tiene relación con:</b>						
La violencia familiar y social	247 017	87.6	90 584	83.3	251 648	89.8
Los accidentes	248 864	88.2	95 736	88.0	259 185	92.5
<b>Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA</b>						
	261 811	92.8	99 601	91.6	252 894	90.2
<b>Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA</b>						
	207 613	73.6	91 227	83.9	230 681	82.3

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A16**

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según edad y sexo. Nayarit, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Hombres</b>					
12 – 25	129 733	39 289	30.3	15 758	12.1
26 – 34	61 288	28 752	46.9	6 974	11.4
35 – 65	136 322	46 095	33.8	8 541	6.3
<b>Subtotal</b>	327 343	114 136	34.9	31 273	9.6
<b>Mujeres</b>					
12 – 25	135 375	16 784	12.4	3 393	2.5
26 – 34	65 258	2 160	3.3	897	1.4
35 – 65	143 234	4 144	2.9	3 945	2.8
<b>Subtotal</b>	343 867	23 088	6.7	8 235	2.4
<b>Total</b>	671 210	137 224	20.4	39 508	5.9

\*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A17**

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada, según edad y sexo. Nayarit, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
<b>Hombres</b>					
12 – 25	578 572	111 492	19.3	44 734	7.7
26 – 34	346 104	112 551	32.5	58 742	17.0
35 – 65	658 002	164 174	25.0	83 402	12.7
<b>Subtotal</b>	<b>1 582 678</b>	<b>388 217</b>	<b>24.5</b>	<b>186 878</b>	<b>11.8</b>
<b>Mujeres</b>					
12 – 25	572 715	34 678	6.1	23 196	4.1
26 – 34	348 289	20 848	6.0	5 835	1.7
35 – 65	683 344	15 070	2.2	10 492	1.5
<b>Subtotal</b>	<b>1 604 348</b>	<b>70 596</b>	<b>4.4</b>	<b>39 523</b>	<b>2.5</b>
<b>Total</b>	<b>3 187 026</b>	<b>458 813</b>	<b>14.4</b>	<b>226 401</b>	<b>7.1</b>

\*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A18**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 12 a 25 años. Nayarit, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	129 733	39 289	30.3	15 758	12.1
Mujeres	135 375	16 784	12.4	3 393	2.5
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	147 987	23 321	15.8	5 829	3.9
No estudiante	117 121	32 752	28.0	13 322	11.4
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	39 848	3 751	9.4	1 997	5.0
Secundaria	121 353	24 464	20.2	6 704	5.5
Bachillerato o equivalente	73 665	18 002	24.4	8 438	11.5
Licenciatura	19 573	7 064	36.1	2 012	10.3
Posgrado	--	--	--	--	--
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	76 668	27 766	36.2	12 350	16.1
Ama de casa	37 830	2 706	7.2	589	1.6
Desempleado	150 610	25 601	17.0	6 212	4.1
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	118 181	18 064	15.3	5 334	4.5
De 3 a 6 salarios mínimos	104 489	27 288	26.1	11 230	10.7
Más de 6 salarios mínimos	19 525	8 623	44.2	1 617	8.3
<b>Vive con</b>					
Padre y madre	135 647	22 081	16.3	5 188	3.8
Sólo padre	4 804	1 148	23.9	1 008	21.0
Sólo madre	51 501	14 901	28.9	9 547	18.5
Otro	73 156	17 943	24.5	3 408	4.7

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A19**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 26 a 34 años. Nayarit, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	61 288	28 752	46.9	6 974	11.4
Mujeres	65 258	2 160	3.3	897	1.4
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	2 559	253	9.9	--	--
No estudiante	123 987	30 659	24.7	7 871	6.3
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	35 236	9 853	28.0	1 525	4.3
Secundaria	41 969	9 581	22.8	2 916	6.9
Bachillerato o equivalente	25 850	7 578	29.3	1 104	4.3
Licenciatura	2 854	--	--	--	--
Posgrado	--	--	--	--	--
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	79 228	28 114	35.5	7 151	9.0
Ama de casa	38 035	583	1.5	--	--
Desempleado	9 283	2 215	23.9	720	7.8
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	56 716	9 827	17.3	3 231	5.7
De 3 a 6 salarios mínimos	55 042	16 180	29.4	3 113	5.7
Más de 6 salarios mínimos	8 010	2 666	33.3	1 023	12.8
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	99 437	22 192	22.3	4 328	4.4
Separado/viudo/divorciado	3 983	1 242	31.2	720	18.1
Soltero	23 126	7 478	32.3	2 823	12.2

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A20**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 35 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Mariguana regalada		Mariguana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	136 322	46 095	33.8	8 541	6.3
Mujeres	143 234	4 144	2.9	3 945	2.8
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	8 957	1 335	14.9	3 151	35.2
No estudiante	270 599	48 904	18.1	9 335	3.4
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	120 646	22 815	18.9	3 986	3.3
Secundaria	71 869	9 874	13.7	2 551	3.5
Bachillerato o equivalente	32 637	7 966	24.4	2 537	7.8
Licenciatura	11 505	3 453	30.0	820	7.1
Posgrado	--	--	--	--	--
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	165 072	40 721	24.7	8 436	5.1
Ama de casa	82 310	1 760	2.1	1 353	1.6
Desempleado	32 174	7 758	24.1	2 697	8.4
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	133 462	23 698	17.8	2 350	1.8
De 3 a 6 salarios mínimos	112 215	20 503	18.3	6 269	5.6
Más de 6 salarios mínimos	23 954	4 041	16.9	3 635	15.2
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	224 325	43 396	19.3	10 523	4.7
Separado/viudo/divorciado	25 575	1 827	7.1	261	1.0
Soltero	29 656	5 016	16.9	1 702	5.7

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A21**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios. Nayarit, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	327 343	129 191	39.5	40 377	12.3
Mujeres	343 867	28 233	8.2	10 239	3.0
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	159 503	27 207	17.1	9 149	5.7
No estudiante	511 707	130 217	25.4	41 467	8.1
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	195 730	40 625	20.8	10 508	5.4
Secundaria	235 191	52 077	22.1	18 822	8.0
Bachillerato o equivalente	132 152	37 840	28.6	13 388	10.1
Licenciatura	33 932	11 020	32.5	2 832	8.3
Posgrado	--	--	--	--	--
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	320 968	110 825	34.5	36 877	11.5
Ama de casa	158 175	7 169	4.5	3 941	2.5
Desempleado	192 067	39 430	20.5	9 798	5.1
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	308 359	59 215	19.2	14 625	4.7
De 3 a 6 salarios mínimos	271 746	73 009	26.9	26 785	9.9
Más de 6 salarios mínimos	51 489	16 060	31.2	7 331	14.2
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	374 218	89 717	24.0	25 285	6.8
Separado/viudo/divorciado	32 921	3 330	10.1	1 634	5.0
Soltero	264 071	64 377	24.4	23 697	9.0
<b>Vive con</b>					
Padre y madre	163 759	31 393	19.2	9 038	5.5
Sólo padre	9 690	4 065	42.0	3 055	31.5
Sólo madre	73 880	22 636	30.6	11 976	16.2
Otro	423 881	99 330	23.4	26 547	6.3

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A22**

Incidencia acumulada para el uso de cualquier droga en la población total según edad y sexo. Nayarit, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Hombres</b>							
12 - 17	66 697	1 792	2.7	1 792	2.7	--	--
18 - 34	124 324	26 351	21.2	22 703	18.3	4 305	3.5
35 - 65	136 322	11 164	8.2	10 963	8.0	201	.1
<b>Subtotal</b>	<b>327 343</b>	<b>39 307</b>	<b>12.0</b>	<b>35 458</b>	<b>10.8</b>	<b>4 506</b>	<b>1.4</b>
<b>Mujeres</b>							
12 - 17	64 243	2 648	4.1	2 427	3.8	405	.6
18 - 34	136 390	1 748	1.3	1 016	.7	732	.5
35 - 65	143 234	7 215	5.0	5 191	3.6	2 024	1.4
<b>Subtotal</b>	<b>343 867</b>	<b>11 611</b>	<b>3.4</b>	<b>8 634</b>	<b>2.5</b>	<b>3 161</b>	<b>.9</b>
<b>Total</b>	<b>671 210</b>	<b>50 918</b>	<b>7.6</b>	<b>44 092</b>	<b>6.6</b>	<b>7 667</b>	<b>1.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y edad definidos en los renglones para cada tipo de droga  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A23**

Incidencia acumulada del consumo de drogas según sexo en la población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo Drogas	Hombres 327343		Mujeres 343867		Total 671210	
	N	%	N	%	N	%
<b>Opiáceos</b>	1 131	.3	--	--	1 131	.2
<b>Tranquilizantes</b>	3 375	1.0	873	.3	4 248	.6
<b>Sedantes</b>	--	--	927	.3	927	.1
<b>Anfetaminas o estimulantes</b>	--	--	1 361	.4	1 361	.2
<b>Mariguana</b>	26 037	8.0	6 132	1.8	32 169	4.8
<b>Cocaína**</b>	22 024	6.7	4 254	1.2	26 278	3.9
<b>Crack</b>	1 599	.5	--	--	1 599	.2
<b>Alucinógenos</b>	748	.2	253	.1	1 001	.1
<b>Inhalables</b>	3 622	1.1	169	***	3 791	.6
<b>Heroína opio</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Estimulante tipo anfetamínico</b>	2 728	.8	583	.2	3 311	.5
<b>Otras drogas</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Cualquier droga</b>	<b>39 307</b>	<b>12.0</b>	<b>11 611</b>	<b>3.4</b>	<b>50 918</b>	<b>7.6</b>
<b>Drogas ilegales</b>	<b>35 458</b>	<b>10.8</b>	<b>8 634</b>	<b>2.5</b>	<b>44 092</b>	<b>6.6</b>
<b>Drogas médicas</b>	<b>4 506</b>	<b>1.4</b>	<b>3 161</b>	<b>.9</b>	<b>7 667</b>	<b>1.1</b>

\*Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo definido en las columnas

\*\*Cocaína también incluye crack

\*\*\*El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro A24**

Edad de inicio del consumo de drogas de los usuarios de cada sustancia. Nayarit, México, 2008

Drogas	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
	%	%	%	%
<b>Opiáceos</b>	100.0	--	--	--
<b>Tranquilizantes</b>	15.5	25.4	44.5	14.6
<b>Sedantes</b>	19.8	--	--	80.2
<b>Anfetaminas o estimulantes</b>	16.2	62.7	--	21.0
<b>Mariguana</b>	46.3	49.8	2.8	1.1
<b>Cocaína</b>	27.7	52.6	16.2	3.5
<b>Crack</b>	46.8	53.2	--	--
<b>Alucinógenos</b>	73.5	--	--	26.5
<b>Inhalables</b>	88.6	11.4	--	--
<b>Heroína opio</b>	--	--	--	--
<b>Estimulante tipo anfetamínico</b>	77.5	22.5	--	--
<b>Otras drogas</b>	--	--	--	--
<b>Cualquier droga</b>	36.5	47.4	10.5	5.7

\*Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A25**

Relación entre mecanismos involucrados en la exposición el uso de mariguana y otras drogas. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo Exposición	Mariguana 32 169		Otras drogas 34 152		Cualquier droga 50 918	
	N	%	N	%	N	%
	<b>Sin exposición</b>	1 138	.2	7 082	1.4	7 571
<b>Mariguana regalada</b>	4 519	6.6	2 496	3.6	7 015	10.2
<b>Otra droga regalada</b>	--	--	1 215	7.7	1 215	7.7
<b>Mariguana comprada</b>	7 205	38.8	1 557	8.4	8 306	44.8
<b>Otra droga comprada</b>	1 749	29.2	4 336	72.5	4 336	72.5
<b>Mariguana y otra droga regalada</b>	9 194	24.0	9 966	26.0	12 904	33.7
<b>Mariguana y otra droga comprada</b>	1 489	82.2	1 812	100.0	1 812	100.0
<b>Mariguana y otra droga regalada y comprada</b>	6 875	56.9	5 688	47.1	7 759	64.2

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A26**

Exposición a la prevención en la población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

N por subgrupo Lugar	12-25 años 265 108		26-34 años 126 546		35-65 años 279 556		Total 671 210	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	<b>Expuestos a la prevención</b>	147 142	55.5	47 428	37.5	86 318	30.9	280 888
<b>En la escuela</b>	120 899	82.2	9 981	21.0	15 287	17.7	146 167	52.0
<b>En el trabajo</b>	1 280	.9	7 140	15.1	10 266	11.9	18 686	6.7
<b>En la comunidad</b>	12 569	8.5	17 708	37.3	29 987	34.7	60 264	21.5

\*Porcentajes obtenidos por grupo de edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A27**

Relación del perfil sociodemográfico y su impacto en el uso de drogas población de 12 a 25 años. Nayarit, México, 2008

Exposición	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Situación escolar</b>							
Estudia actualmente	159 503	4 925	3.3	4 704	3.2	405	.3
No estudia	511 707	14 774	12.6	14 451	12.3	980	.8
<b>Situación laboral</b>							
Trabaja	320 968	13 658	17.8	13 658	17.8	657	.9
Ama de casa	158 175	323	.9	--	--	323	.9
Desempleado	192 067	5 718	3.8	5 497	3.6	405	.3
<b>Vive con</b>							
Padre y madre	163 759	6 968	5.1	6 968	5.1	--	--
Sólo padre	9 690	--	--	--	--	--	--
Sólo madre	73 880	6 630	12.9	6 409	12.4	405	.8
Otro	423 881	6 101	8.3	5 778	7.9	980	1.3
<b>Intento suicida</b>							
Con intento	1 543	699	45.3	699	45.3	--	--
Sin intento	280 571	20 593	7.3	19 340	6.9	1 253	.4

\*Porcentajes de impacto en el uso de drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A28**

Consumo de drogas y su relación con el consumo en el entorno en la población total de 12 a 25 años. Nayarit, México, 2008

Exposición	N por grupo	Uso de drogas en el individuo					
		Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Uso de drogas en el entorno</b>							
Mariguana	92 473	6 669	13.7	6 669	13.7	--	--
Cocaína	67 124	5 916	16.4	5 916	16.4	--	--
Heroína opio	15 106	2 448	29.2	2 448	29.2	--	--
Inhalables	23 235	3 716	24.5	3 716	24.5	--	--
Alucinógenos	10 750	1 557	46.0	1 557	46.0	--	--

\*Porcentajes obtenidos por tipo de droga consumida en el entorno definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A29**

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

	Total	
	N	%
<b>Dependencia</b>	6 649	1.0
<b>Uso sin dependencia</b>	44 269	6.6
<b>Exposición a drogas sin consumo</b>	118 026	17.6
<b>No consumo</b>	502 266	74.8

\*Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad en la población total definido en las columnas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Intervalos de confianza

**E**l intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de cocaína alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de cocaína alguna vez en el cuadro de población masculina que en este caso sería 4.15%; después se busca el dato de cocaína alguna vez en el cuadro de población femenina, que es de 0.72%; de estos datos se elige el porcentaje más alto (población masculina) para considerar su columna de IC 95% (3.728-4.563); posteriormente se ubica si el valor más bajo (población femenina) está por arriba, por abajo o dentro de este intervalo de confianza.

Aquí se observa que 0.72% está por debajo de los intervalos que van de 3.728-4.563, por lo que podemos decir con una confianza de 95% que el nivel de consumo de cocaína alguna vez es más alto en los hombres en comparación con las mujeres.

Los intervalos de confianza también pueden servir para comparar distintos grupos de edad o bien entre distintas sustancias.

Se incluyen los intervalos de confianza nacionales para que cada estado pueda ver cómo se encuentra en relación con el país en general.

**Cuadro A30**

Consumo de drogas en la población total del país. Nayarit, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.14	0.090-0.195
Tranquilizantes	0.58	0.480-0.675
Sedantes	0.18	0.111-0.246
Anfetaminas	0.30	0.223-0.378
Mariguana	4.19	3.885-4.493
Cocaína	2.37	2.146-2.588
Crack	0.59	0.483-0.707
Alucinógenos	0.35	0.270-0.437
Inhalables	0.71	0.592-0.829
Heroína	0.14	0.091-0.194
Metanfetaminas	0.49	0.394-0.585
Otra droga	0.06	0.029-0.098
Cualquier droga	5.72	5.364-6.078
Drogas médicas	1.03	0.890-1.163
Drogas ilegales	5.22	4.871-5.564
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.06	0.023-0.095
Tranquilizantes	0.15	0.112-0.198
Sedantes	0.07	0.018-0.113
Anfetaminas	0.09	0.045-0.136
Mariguana	1.03	0.886-1.169
Cocaína	0.44	0.356-0.524
Crack	0.13	0.083-0.172
Alucinógenos	0.05	0.022-0.082
Inhalables	0.12	0.083-0.165
Heroína	0.04	0.019-0.065
Metanfetaminas	0.11	0.073-0.143
Otra droga	0.01	0.000-0.019
Cualquier droga	1.63	1.448-1.804
Drogas médicas	0.34	0.263-0.420
Drogas ilegales	1.40	1.234-1.566
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.017
Tranquilizantes	0.08	0.046-0.107
Sedantes	0.03	0.000-0.065
Anfetaminas	0.03	0.010-0.058
Mariguana	0.67	0.552-0.787
Cocaína	0.27	0.201-0.333
Crack	0.05	0.023-0.083
Alucinógenos	0.02	0.002-0.033
Inhalables	0.07	0.037-0.103
Heroína	0.01	0.000-0.021
Metanfetaminas	0.07	0.043-0.099
Otra droga	0.01	0.000-0.018
Cualquier droga	1.00	0.853-1.141
Drogas médicas	0.15	0.094-0.198
Drogas ilegales	0.90	0.761-1.038

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A31**

Consumo de drogas en la población masculina del país. Nayarit, México, 2008

<b>Consumo alguna vez</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Opiáceos	0.14	0.071-0.206
Tranquilizantes	0.75	0.581-0.910
Sedantes	0.25	0.126-0.365
Anfetaminas	0.44	0.292-0.587
Mariguana	7.19	6.634-7.741
Cocaína	4.15	3.728-4.563
Crack	1.03	0.810-1.244
Alucinógenos	0.59	0.441-0.730
Inhalables	1.28	1.042-1.511
Heroína	0.27	0.167-0.372
Metanfetaminas	0.79	0.617-0.969
Otra droga	0.10	0.033-0.166
Cualquier droga	9.13	8.501-9.755
Drogas médicas	1.27	1.055-1.484
Drogas ilegales	8.77	8.146-9.384
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.03	0.000-0.059
Tranquilizantes	0.16	0.097-0.223
Sedantes	0.09	0.007-0.178
Anfetaminas	0.13	0.041-0.212
Mariguana	1.73	1.472-1.984
Cocaína	0.76	0.603-0.920
Crack	0.23	0.145-0.316
Alucinógenos	0.09	0.028-0.144
Inhalables	0.21	0.132-0.284
Heroína	0.08	0.034-0.116
Metanfetaminas	0.16	0.099-0.229
Otra droga	0.02	0.000-0.040
Cualquier droga	2.49	2.176-2.797
Drogas médicas	0.36	0.241-0.484
Drogas ilegales	2.33	2.028-2.633
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.013
Tranquilizantes	0.07	0.027-0.118
Sedantes	0.05	0.000-0.115
Anfetaminas	0.06	0.009-0.108
Mariguana	1.18	0.963-1.389
Cocaína	0.46	0.332-0.579
Crack	0.11	0.048-0.173
Alucinógenos	0.02	0.000-0.045
Inhalables	0.14	0.070-0.203
Heroína	0.02	0.000-0.044
Metanfetaminas	0.11	0.060-0.166
Otra droga	0.01	0.000-0.037
Cualquier droga	1.65	1.391-1.911
Drogas médicas	0.18	0.086-0.275
Drogas ilegales	1.57	1.313-1.822

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A32**

Consumo de drogas en la población femenina del país. Nayarit, México, 2008

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.15	0.066-0.226
Tranquilizantes	0.42	0.318-0.527
Sedantes	0.12	0.056-0.178
Anfetaminas	0.17	0.110-0.234
Mariguana	1.42	1.181-1.650
Cocaína	0.72	0.576-0.870
Crack	0.19	0.118-0.271
Alucinógenos	0.14	0.049-0.230
Inhalables	0.19	0.119-0.256
Heroína	0.02	0.000-0.052
Metanfetaminas	0.21	0.135-0.283
Otra droga	0.03	0.003-0.057
Cualquier droga	2.57	2.262-2.878
Drogas médicas	0.80	0.647-0.956
Drogas ilegales	1.94	1.660-2.215
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.09	0.024-0.149
Tranquilizantes	0.15	0.092-0.209
Sedantes	0.04	0.000-0.085
Anfetaminas	0.06	0.019-0.096
Mariguana	0.38	0.255-0.502
Cocaína	0.14	0.079-0.206
Crack	0.03	0.000-0.064
Alucinógenos	0.02	0.000-0.044
Inhalables	0.05	0.012-0.081
Heroína	0.01	0.000-0.036
Metanfetaminas	0.06	0.025-0.086
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.83	0.661-1.001
Drogas médicas	0.32	0.221-0.423
Drogas ilegales	0.54	0.399-0.680
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.026
Tranquilizantes	0.08	0.040-0.122
Sedantes	0.01	0.000-0.030
Anfetaminas	0.01	0.002-0.020
Mariguana	0.20	0.105-0.298
Cocaína	0.09	0.037-0.147
Crack	0.00	0.000-0.002
Alucinógenos	0.02	0.000-0.035
Inhalables	0.01	0.000-0.017
Heroína	0.00	0.000-0.000
Metanfetaminas	0.03	0.009-0.055
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.39	0.273-0.511
Drogas médicas	0.11	0.068-0.162
Drogas ilegales	0.28	0.171-0.391

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Resultados estatales

### Cuadro B1

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 435	.8	258 972	33.3
Baja California	6 119	.3	420 914	18.4
Baja California Sur	2 650	.6	125 068	30.4
Campeche	2 758	.5	159 776	28.5
Coahuila	12 239	.7	334 852	18.2
Colima	4 149	1.0	94 042	22.0
Chiapas	32 651	1.1	429 753	14.0
Chihuahua	38 797	1.6	650 901	27.3
Distrito Federal	19 578	.3	2 086 555	32.2
Durango	8 472	.8	250 263	23.7
Guanajuato	9 638	.3	733 743	21.5
Guerrero	12 360	.6	561 476	27.1
Hidalgo	24 135	1.4	498 757	29.8
Jalisco	72 715	1.5	1 497 921	31.1
Estado de México	50 145	.5	2 850 223	26.8
Michoacán	46 278	1.7	902 705	33.4
Morelos	11 394	1.0	409 116	35.6
Nayarit	8 419	1.3	221 084	32.9
Nuevo León	40 089	1.3	947 170	29.7
Oaxaca	24 813	1.0	531 783	22.3
Puebla	34 557	.9	1 127 782	29.4
Querétaro	25 062	2.1	374 771	31.1
Quintana Roo	18 316	1.9	287 795	30.4
San Luis Potosí	15 662	.9	399 486	23.9
Sinaloa	10 691	.6	469 343	25.2
Sonora	3 101	.2	504 802	28.6
Tabasco	14 683	1.0	369 327	25.6
Tamaulipas	14 111	.6	626 093	27.7
Tlaxcala	5 881	.8	249 721	32.0
Veracruz	22 298	.4	1 101 373	21.8
Yucatán	10 155	.8	261 287	19.3
Zacatecas	14 522	1.6	279 184	30.0
Nacional	622 873	.8	20 016 038	26.6

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B2**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	42 736	5.5	61 232	7.9
Baja California	113 508	5.0	34 615	1.5
Baja California Sur	27 705	6.7	21 492	5.2
Campeche	39 467	7.0	44 919	8.0
Coahuila	101 629	5.5	82 313	4.5
Colima	26 086	6.1	12 942	3.0
Chiapas	85 627	2.8	77 213	2.5
Chihuahua	218 191	9.2	112 518	4.7
Distrito Federal	287 497	4.4	364 085	5.6
Durango	72 254	6.8	65 541	6.2
Guanajuato	138 013	4.0	77 977	2.3
Guerrero	78 952	3.8	124 548	6.0
Hidalgo	109 552	6.6	114 527	6.8
Jalisco	309 877	6.4	273 703	5.7
Estado de México	481 829	4.5	621 799	5.8
Michoacán	155 019	5.7	209 659	7.8
Morelos	63 858	5.6	96 298	8.4
Nayarit	51 827	7.7	66 706	9.9
Nuevo León	303 269	9.5	158 254	5.0
Oaxaca	105 220	4.4	129 098	5.4
Puebla	152 070	4.0	296 095	7.7
Querétaro	87 535	7.3	104 334	8.7
Quintana Roo	76 222	8.0	66 162	7.0
San Luis Potosí	100 235	6.0	103 040	6.2
Sinaloa	106 197	5.7	90 975	4.9
Sonora	95 430	5.4	83 223	4.7
Tabasco	55 383	3.8	78 184	5.4
Tamaulipas	188 889	8.4	140 001	6.2
Tlaxcala	20 007	2.6	45 983	5.9
Veracruz	173 120	3.4	284 275	5.6
Yucatán	60 201	4.4	47 116	3.5
Zacatecas	59 056	6.4	79 236	8.5
Nacional	3 986 461	5.3	4 168 063	5.5

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro B3**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 306	1.7	180 946	48.9
Baja California	5 280	.5	271 534	23.6
Baja California Sur	1 141	.5	86 504	41.1
Campeche	1 734	.6	112 232	40.9
Coahuila	11 905	1.3	245 299	27.0
Colima	2 982	1.4	63 474	30.4
Chiapas	31 232	2.1	300 586	20.2
Chihuahua	37 388	3.2	480 826	40.8
Distrito Federal	16 738	.6	1 277 221	42.0
Durango	8 335	1.6	190 757	37.6
Guanajuato	4 727	.3	510 442	32.2
Guerrero	11 867	1.2	401 325	41.1
Hidalgo	20 172	2.6	366 493	46.6
Jalisco	69 376	3.0	1 004 752	42.9
Estado de México	31 552	.6	1 950 777	38.0
Michoacán	31 268	2.5	613 879	48.7
Morelos	8 061	1.5	260 788	49.1
Nayarit	8 049	2.5	144 065	44.0
Nuevo León	33 502	2.1	751 569	47.5
Oaxaca	21 892	2.0	397 770	35.8
Puebla	27 203	1.5	825 845	45.9
Querétaro	23 062	4.0	262 724	45.9
Quintana Roo	16 132	3.4	192 220	40.1
San Luis Potosí	14 387	1.8	327 208	41.1
Sinaloa	10 691	1.2	357 780	39.0
Sonora	3 101	.4	405 620	46.2
Tabasco	10 647	1.5	274 443	39.2
Tamaulipas	14 111	1.3	510 860	46.1
Tlaxcala	4 590	1.2	178 545	48.1
Veracruz	22 298	.9	793 048	33.1
Yucatán	6 805	1.0	178 279	27.0
Zacatecas	11 255	2.6	211 752	48.4
Nacional	527 789	1.5	14 129 563	39.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B4**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	33 191	9.0	51 034	13.8
Baja California	89 612	7.8	27 555	2.4
Baja California Sur	21 712	10.3	17 201	8.2
Campeche	36 341	13.3	36 202	13.2
Coahuila	79 166	8.7	68 497	7.5
Colima	21 100	10.1	9 573	4.6
Chiapas	71 448	4.8	66 928	4.5
Chihuahua	190 179	16.2	99 550	8.5
Distrito Federal	209 327	6.9	252 788	8.3
Durango	66 327	13.1	56 450	11.1
Guanajuato	108 094	6.8	68 657	4.3
Guerrero	75 101	7.7	101 196	10.4
Hidalgo	92 479	11.8	95 800	12.2
Jalisco	241 366	10.3	217 356	9.3
Estado de México	407 199	7.9	500 463	9.7
Michoacán	129 889	10.3	180 891	14.4
Morelos	52 892	10.0	79 095	14.9
Nayarit	41 264	12.6	56 464	17.2
Nuevo León	283 719	17.9	153 774	9.7
Oaxaca	102 373	9.2	120 929	10.9
Puebla	127 473	7.1	266 885	14.8
Querétaro	71 966	12.6	80 863	14.1
Quintana Roo	62 349	13.0	57 542	12.0
San Luis Potosí	93 093	11.7	94 076	11.8
Sinaloa	85 687	9.3	83 186	9.1
Sonora	89 382	10.2	68 055	7.7
Tabasco	45 586	6.5	64 691	9.2
Tamaulipas	173 078	15.6	128 379	11.6
Tlaxcala	15 424	4.2	41 602	11.2
Veracruz	149 262	6.2	243 318	10.2
Yucatán	50 745	7.7	40 271	6.1
Zacatecas	50 169	11.5	68 675	15.7
Nacional	3 366 993	9.3	3 497 946	9.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B5**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	129	***	78 026	19.1
Baja California	839	.1	149 380	13.1
Baja California Sur	1 509	.7	38 564	19.2
Campeche	1 024	.4	47 544	16.6
Coahuila	334	***	89 553	9.6
Colima	1 167	.5	30 568	13.9
Chiapas	1 419	.1	129 167	8.1
Chihuahua	1 409	.1	170 075	14.1
Distrito Federal	2 840	.1	809 334	23.5
Durango	137	***	59 506	10.9
Guanajuato	4 911	.3	223 301	12.2
Guerrero	493	***	160 151	14.6
Hidalgo	3 963	.4	132 264	14.9
Jalisco	3 339	.1	493 169	19.9
Estado de México	18 593	.3	899 446	16.3
Michoacán	15 010	1.0	288 826	20.0
Morelos	3 333	.5	148 328	24.0
Nayarit	370	.1	77 019	22.4
Nuevo León	6 587	.4	195 601	12.2
Oaxaca	2 921	.2	134 013	10.6
Puebla	7 354	.4	301 937	14.9
Querétaro	2 000	.3	112 047	17.8
Quintana Roo	2 184	.5	95 575	20.4
San Luis Potosí	1 275	.1	72 278	8.2
Sinaloa	--	--	111 563	11.8
Sonora	--	--	99 182	11.2
Tabasco	4 036	.5	94 884	12.8
Tamaulipas	--	--	115 233	10.0
Tlaxcala	1 291	.3	71 176	17.4
Veracruz	--	--	308 325	11.6
Yucatán	3 350	.5	83 008	12.0
Zacatecas	3 267	.7	67 432	13.7
Nacional	95 084	.2	5 886 475	15.1

\*\*\* El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B6**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Nayarit, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	9 545	2.3	10 198	2.5
Baja California	23 896	2.1	7 060	.6
Baja California Sur	5 993	3.0	4 291	2.1
Campeche	3 126	1.1	8 717	3.0
Coahuila	22 463	2.4	13 816	1.5
Colima	4 986	2.3	3 369	1.5
Chiapas	14 179	.9	10 285	.6
Chihuahua	28 012	2.3	12 968	1.1
Distrito Federal	78 170	2.3	111 297	3.2
Durango	5 927	1.1	9 091	1.7
Guanajuato	29 919	1.6	9 320	.5
Guerrero	3 851	.4	23 352	2.1
Hidalgo	17 073	1.9	18 727	2.1
Jalisco	68 511	2.8	56 347	2.3
Estado de México	74 630	1.4	121 336	2.2
Michoacán	25 130	1.7	28 768	2.0
Morelos	10 966	1.8	17 203	2.8
Nayarit	10 563	3.1	10 242	3.0
Nuevo León	19 550	1.2	4 480	.3
Oaxaca	2 847	.2	8 169	.6
Puebla	24 597	1.2	29 210	1.4
Querétaro	15 569	2.5	23 471	3.7
Quintana Roo	13 873	3.0	8 620	1.8
San Luis Potosí	7 142	.8	8 964	1.0
Sinaloa	20 510	2.2	7 789	.8
Sonora	6 048	.7	15 168	1.7
Tabasco	9 797	1.3	13 493	1.8
Tamaulipas	15 811	1.4	11 622	1.0
Tlaxcala	4 583	1.1	4 381	1.1
Veracruz	23 858	.9	40 957	1.5
Yucatán	9 456	1.4	6 845	1.0
Zacatecas	8 887	1.8	10 561	2.1
Nacional	619 468	1.6	670 117	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Intervalos de confianza

### Cuadro B7

Intervalos de confianza de la población total del país. Nayarit, México, 2008

	Población total		Hombres		Mujeres	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Consumo diario	0.8	0.706-0.952	1.5	1.227-1.697	0.2	0.158-0.330
Consumo alto	26.6	25.917-27.370	39.1	38.066-40.229	15.1	14.261-15.902
Bebedores consuetudinarios	5.3	4.954-5.658	9.3	8.671-9.986	1.6	1.325-1.849
Abuso/dependencia	5.5	5.196-5.900	9.7	9.038-10.345	1.7	1.454-1.980

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas\*

## Cuadro C1

Perfil sociodemográfico de la población global que acuden a los centros de tratamiento no gubernamentales (SISVEA). Nayarit, México

Características	Global	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	N = 6870	N=1187	N=950	N=1038	N=969	N=1232	N=1494
<b>Sexo</b>							
Masculino	88.3	92.6	91.7	91.9	91.3	87.3	78.9
Femenino	11.7	7.4	8.3	8.1	8.7	12.7	21.1
<b>Edad</b>							
5 - 9 años	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
10 - 14 años	3.2	2.1	2.1	4.8	4.1	2.8	3.2
15 - 19 años	18.8	22.2	19.4	17.5	17.3	19.2	17.4
20 - 24 años	19.8	19.3	20.7	19.7	20.1	19.8	19.5
25 - 29 años	17.5	17.0	19.7	17.1	19.2	17.9	15.5
30 - 34 años	15.6	14.9	16.2	15.5	15.6	16.7	14.9
35 años o más	25.1	24.4	21.9	25.3	23.5	23.7	29.5
<b>Escolaridad</b>							
Sin escolaridad	2.3	1.9	1.6	1.9	2.8	2.4	3.0
Primaria	24.4	23.9	23.1	25.0	24.0	27.1	23.5
Tec. Post-primaria	0.2	0.3	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2
Secundaria	42.8	44.1	46.0	44.3	47.0	40.9	37.8
Tec. Post-secundaria	1.7	1.8	1.3	1.4	1.4	1.5	2.3
Bachillerato	19.6	19.5	19.5	20.2	19.1	18.8	20.4
Licenciatura	8.6	8.4	7.3	6.8	5.6	8.6	12.7
Posgrado	0.3	0.3	0.8	0.1	0.1	0.4	0.1
<b>Estado Civil</b>							
Soltero	46.2	43.5	47.8	46.7	45.8	48.6	45.0
Casado	26.8	32.0	25.3	24.2	25.4	24.1	28.4
Divorciado	2.8	2.6	2.5	2.4	2.9	3.6	2.9
Separado	10.0	8.7	10.1	11.8	9.7	10.9	9.4
Víudo	0.7	0.7	1.2	0.6	0.3	0.4	1.0
Unión libre	13.5	12.5	13.1	14.4	15.9	12.4	13.3
<b>Situación laboral</b>							
Estudiante	7.5	6.1	7.3	9.5	6.6	6.8	8.3
Desempleado	19.4	18.1	22.8	24.4	19.2	16.9	16.9
Desocupado	4.6	3.8	2.0	3.2	3.2	7.3	6.6
Trabajo fijo	26.6	31.6	28.9	23.7	20.3	26.2	27.4
Trabajo ocasional	38.4	38.2	36.7	36.8	48.7	39.2	33.5
Ama de casa	2.9	1.8	1.7	1.2	1.4	3.1	6.5
Jubilado	0.7	0.3	0.6	1.2	0.5	0.5	0.8
<b>Acudió</b>							
En forma voluntaria	48.5	70.5	57.3	43.8	31.8	41.3	45.6
Por amigos o familia	29.6	15.6	15.4	32.1	36.1	38.8	36.3
Por indicación legal	19.6	13.1	24.6	22.8	30.4	16.4	15.1
Por indicación médica	0.8	0.8	0.9	0.4	0.7	0.9	0.9
Otros	1.4	0.0	1.8	1.0	0.9	2.6	2.1

\* Los cuadros de este anexo provienen de los reportes de SISVEA y de los de CIJ.

**Cuadro C2.A**

**Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según Droga de Inicio. Nayarit, México, 2007**

Características	Global		Mariguana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. Ilicitas***									
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%						
<b>Sexo</b>																																
Masculino	1179	100	196	16.6	534	45.3	18	1.5	353	29.9	7	0.6	49	4.2	2	0.2	0	0.0	15	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	3	0.3		
Femenino	315	100	8	2.5	183	58.1	5	1.6	105	33.3	1	0.3	10	3.2	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Edad</b>																																
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 - 14 años	48	100	8	16.7	11	22.9	3	6.3	24	50.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	260	100	38	14.6	105	40.4	10	3.8	89	34.2	0	0.0	10	3.8	0	0.0	6	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0
20 - 24 años	291	100	54	18.6	115	39.5	5	1.7	99	34.0	0	0.0	11	3.8	1	0.3	6	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	232	100	28	12.1	116	50.0	1	0.4	69	29.7	0	0.0	16	6.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
30 - 34 años	222	100	37	16.7	112	50.5	2	0.9	56	25.2	3	1.4	10	4.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
35 años o más	441	100	39	8.8	258	58.5	2	0.5	121	27.4	5	1.1	11	2.5	1	0.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
<b>Escolaridad</b>																																
Sin escolaridad	45	100	3	6.7	25	55.6	1	2.2	13	28.9	0	0.0	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	351	100	52	14.8	162	46.2	10	2.8	103	29.3	3	0.9	16	4.6	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
Tec. Post-primaria	3	100	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	564	100	96	17.0	246	43.6	9	1.6	177	31.4	3	0.5	20	3.5	2	0.4	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
Tec. Post-secundaria	34	100	1	2.9	22	64.7	0	0.0	9	26.5	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bachillerato	305	100	43	14.1	137	44.9	3	1.0	100	32.8	1	0.3	14	4.6	0	0.0	6	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
Licenciatura	190	100	9	4.7	123	64.7	0	0.0	53	27.9	1	0.5	4	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Posgrado	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Estado civil</b>																																
Soltero	672	100	106	15.8	288	42.9	17	2.5	217	32.3	1	0.1	28	4.2	0	0.0	12	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0
Casado	424	100	49	11.6	241	56.8	4	0.9	110	25.9	2	0.5	14	3.3	1	0.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Divorciado	43	100	5	11.6	28	65.1	0	0.0	6	14.0	2	4.7	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Separado	141	100	14	9.9	61	43.3	1	0.7	52	36.9	2	1.4	7	5.0	1	0.7	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
Viudo	15	100	1	6.7	6	40.0	0	0.0	5	33.3	1	6.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	199	100	29	14.6	93	46.7	1	0.5	68	34.2	0	0.0	6	3.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
<b>Situación laboral</b>																																
Estudiante	124	100	6	4.8	69	55.6	5	4.0	41	33.1	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desempleado	252	100	39	15.5	91	36.1	6	2.4	102	40.5	1	0.4	6	2.4	0	0.0	7	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Desocupado	99	100	18	18.2	40	40.4	5	5.1	23	23.2	2	2.0	6	6.1	0	0.0	5	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajo fijo	410	100	51	12.4	243	59.3	3	0.7	76	18.5	2	0.5	28	6.8	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	2	0.5		
Trabajo ocasional	500	100	87	17.4	209	41.8	4	0.8	179	35.8	3	0.6	13	2.6	1	0.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2		
Ama de casa	97	100	1	1.0	60	61.9	0	0.0	32	33.0	0	0.0	3	3.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jubilado	12	100	2	16.7	5	41.7	0	0.0	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
<b>Acudió</b>																																
En forma voluntaria	681	100	60	8.8	388	57.0	6	0.9	200	29.4	3	0.4	17	2.5	2	0.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1		
Por amigos o familia	543	100	91	16.8	238	43.8	10	1.8	150	27.6	5	0.9	33	6.1	0	0.0	14	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2				
Por indicación legal	225	100	45	20.0	81	36.0	5	2.2	83	36.9	0	0.0	9	4.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4		
Por indicación médica	14	100	5	35.7	5	35.7	0	0.0	4	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Otros	31	100	3	9.7	5	16.1	2	6.5	21	67.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

\* Cocaína. Basuco. Crack  
 \*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Mofina  
 \*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

**Cuadro C2.B**

Patrón de consumo de población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales, según droga de inicio. Nayarit, México, 2007

Características	Global		Mariguana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Frecuencia actual</b>																										
Diario	742	100	145	19.5	174	23.5	14	1.9	364	49.1	7	0.9	24	3.2	1	0.1	12	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
2 - 3 veces por semana	170	100	14	8.2	118	69.4	2	1.2	26	15.3	0	0.0	6	3.5	1	0.6	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
1 vez por semana	298	100	20	6.7	221	74.2	3	1.0	27	9.1	1	0.3	20	6.7	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7
1 - 3 veces por mes	172	100	12	7.0	137	79.7	2	1.2	14	8.1	0	0.0	7	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-11 veces al año	111	100	13	11.7	67	60.4	2	1.8	27	24.3	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Edad de inicio</b>																										
9 años o menos	52	100	8	15.4	21	40.4	3	5.8	19	36.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	526	100	99	18.8	172	32.7	17	3.2	211	40.1	3	0.6	15	2.9	1	0.2	6	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2
15 - 19 años	727	100	84	11.6	413	56.8	3	0.4	191	26.3	4	0.6	20	2.8	1	0.1	8	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3
20 - 24 años	120	100	10	8.3	73	60.8	0	0.0	23	19.2	0	0.0	13	10.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	35	100	1	2.9	18	51.4	0	0.0	8	22.9	0	0.0	7	20.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 - 34 años	18	100	1	5.6	9	50.0	0	0.0	4	22.2	1	5.6	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35 años o más	16	100	1	6.3	11	68.8	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

\* Cocaína. Basuco. Crack

\*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Mofina

\*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

**Cuadro C3.A**

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según Droga de impacto. Nayarit, México, 2007

Características	Global		Mariguana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sexo</b>																										
Masculino	1179	100	195	16.5	439	37.2	25	2.1	44	3.7	8	0.7	244	20.7	28	2.4	180	15.3	1	0.1	0	0.0	9	0.8	6	0.5
Femenino	315	100	15	4.8	158	50.2	13	4.1	75	23.8	2	0.6	19	6.0	3	1.0	28	8.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
<b>Edad</b>																										
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	48	100	18	37.5	10	20.8	10	20.8	3	6.3	0	0.0	5	10.4	0	0.0	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	260	100	59	22.7	87	33.5	15	5.8	20	7.7	0	0.0	34	13.1	3	1.2	37	14.2	0	0.0	0	0.0	3	1.2	2	0.8
20 - 24 años	291	100	52	17.9	85	29.2	5	1.7	16	5.5	0	0.0	57	19.6	12	4.1	60	20.6	1	0.3	0	0.0	2	0.7	1	0.3
25 - 29 años	232	100	21	9.1	86	37.1	3	1.3	19	8.2	2	0.9	56	24.1	1	0.4	41	17.7	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.4
30 - 34 años	222	100	21	9.5	94	42.3	3	1.4	11	5.0	2	0.9	56	25.2	2	0.9	32	14.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
35 años o más	441	100	39	8.8	235	53.3	2	0.5	50	11.3	6	1.4	55	12.5	13	2.9	36	8.2	0	0.0	0	0.0	3	0.7	2	0.5
<b>Escolaridad</b>																										
Sin escolaridad	45	100	6	13.3	20	44.4	1	2.2	5	11.1	0	0.0	7	15.6	0	0.0	5	11.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
Primaria	351	100	54	15.4	127	36.2	15	4.3	27	7.7	3	0.9	62	17.7	8	2.3	50	14.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.1
Tec. post-primaria	3	100	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	564	100	93	16.5	191	33.9	20	3.5	26	4.6	4	0.7	119	21.1	12	2.1	93	16.5	1	0.2	0	0.0	5	0.9	0	0.0
Tec. post-secundaria	34	100	1	2.9	17	50.0	0	0.0	8	23.5	0	0.0	5	14.7	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
Bachillerato	305	100	43	14.1	124	40.7	2	0.7	24	7.9	2	0.7	53	17.4	7	2.3	47	15.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7
Licenciatura	190	100	13	6.8	115	60.5	0	0.0	28	14.7	1	0.5	17	8.9	4	2.1	10	5.3	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0
Posgrado	2	100	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Estado civil</b>																										
Soltero	672	100	128	19.0	228	33.9	29	4.3	42	6.3	1	0.1	114	17.0	14	2.1	106	15.8	1	0.1	0	0.0	6	0.9	3	0.4
Casado	424	100	24	5.7	227	53.5	4	0.9	42	9.9	4	0.9	77	18.2	2	0.5	42	9.9	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
Divorciado	43	100	6	14.0	19	44.2	1	2.3	4	9.3	1	2.3	8	18.6	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.7
Separado	141	100	17	12.1	51	36.2	2	1.4	9	6.4	3	2.1	24	17.0	10	7.1	23	16.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
Viudo	15	100	1	6.7	3	20.0	0	0.0	6	40.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	199	100	34	17.1	69	34.7	2	1.0	16	8.0	1	0.5	37	18.6	5	2.5	34	17.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
<b>Situación laboral</b>																										
Estudiante	124	100	20	16.1	69	55.6	10	8.1	13	10.5	0	0.0	7	5.6	3	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
Desempleado	252	100	46	18.3	74	29.4	12	4.8	8	3.2	4	1.6	42	16.7	11	4.4	53	21.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0
Desocupado	99	100	18	18.2	22	22.2	6	6.1	7	7.1	1	1.0	20	20.2	5	5.1	18	18.2	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0
Trabajo fijo	410	100	27	6.6	208	50.7	6	1.5	40	9.8	1	0.2	82	20.0	2	0.5	39	9.5	1	0.2	0	0.0	3	0.7	1	0.2
Trabajo ocasional	500	100	97	19.4	164	32.8	4	0.8	19	3.8	3	0.6	104	20.8	10	2.0	91	18.2	0	0.0	0	0.0	3	0.6	5	1.0
Ama de casa	97	100	1	1.0	56	57.7	0	0.0	27	27.8	1	1.0	6	6.2	0	0.0	6	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jubilado	12	100	1	8.3	4	33.3	0	0.0	5	41.7	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Acudió</b>																										
En forma voluntaria	681	100	51	7.5	332	48.8	10	1.5	87	12.8	4	0.6	104	15.3	16	2.3	71	10.4	0	0.0	0	0.0	4	0.6	2	0.3
Por amigos o familia	543	100	80	14.7	197	36.3	20	3.7	24	4.4	5	0.9	103	19.0	13	2.4	91	16.8	1	0.2	0	0.0	6	1.1	3	0.6
Por indicación legal	225	100	67	29.8	61	27.1	4	1.8	1	0.4	1	0.4	51	22.7	1	0.4	37	16.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
Por indicación médica	14	100	3	21.4	2	14.3	0	0.0	5	35.7	0	0.0	2	14.3	1	7.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	31	100	9	29.0	5	16.1	4	12.9	2	6.5	0	0.0	3	9.7	0	0.0	8	25.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

\* Cocaína. Basuco. Crack

\*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Mofina

\*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos



**Cuadro C3.B**

Patrón de consumo de población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales, según droga de impacto. Nayarit, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**		D. ilícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
<b>Frecuencia actual</b>																												
Diario	725	100	163	22.5	156	21.5	16	2.2	81	11.2	8	1.1	141	19.4	24	3.3	128	17.7	0	0.0	0	0.0	6	0.8	2	0.3		
2 - 3 veces por semana	243	100	21	8.6	101	41.6	5	2.1	12	4.9	0	0.0	41	16.9	6	2.5	55	22.6	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0		
1 vez por semana	268	100	14	5.2	164	61.2	7	2.6	9	3.4	2	0.7	49	18.3	1	0.4	16	6.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	4	1.5		
1 - 3 veces por mes	157	100	7	4.5	110	70.1	4	2.5	7	4.5	0	0.0	24	15.3	0	0.0	5	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
1-11 veces al año	89	100	5	5.6	61	68.5	5	5.6	7	7.9	0	0.0	6	6.7	0	0.0	3	3.4	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0		
<b>Edad de inicio</b>																												
5 - 9 años	52	100	10	19.2	10	19.2	2	3.8	1	1.9	1	1.9	10	19.2	2	3.8	15	28.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0		
10 - 14 años	526	100	108	20.5	143	27.2	32	6.1	36	6.8	4	0.8	96	18.3	16	3.0	81	15.4	1	0.2	0	0.0	5	1.0	4	0.8		
15 - 19 años	727	100	79	10.9	344	47.3	4	0.6	56	7.7	2	0.3	130	17.9	12	1.7	94	12.9	0	0.0	0	0.0	4	0.6	2	0.3		
20 - 24 años	120	100	11	9.2	66	55.0	0	0.0	13	10.8	1	0.8	16	13.3	1	0.8	12	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
25 - 29 años	35	100	0	0.0	15	42.9	0	0.0	7	20.0	1	2.9	8	22.9	0	0.0	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
30 - 34 años	18	100	1	5.6	10	55.6	0	0.0	2	11.1	1	5.6	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0		
35 años o más	16	100	1	6.3	9	56.3	0	0.0	4	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
<b>Droga de Inicio</b>																												
Alcohol	717	100	46	6.4	462	64.4	10	1.4	33	4.6	2	0.3	92	12.8	8	1.1	53	7.4	0	0.0	0	0.0	10	1.4	1	0.1		
Marihuana	204	100	85	41.7	17	8.3	2	1.0	6	2.9	3	1.5	48	23.5	7	3.4	35	17.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Inhalables	23	100	1	4.3	2	8.7	13	56.5	0	0.0	1	4.3	2	8.7	1	4.3	2	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3		
Alucinógenos	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0		
Heroína	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Opio-Morfina y deriv.	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Cocaína	49	100	0	0.0	3	6.1	3	6.1	0	0.0	0	0.0	31	63.3	1	2.0	11	22.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Tranquilizantes	8	100	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0		
Barbitúricos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Anfetaminas	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0		
Anticolinérgicos	1	100	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Tabaco	458	100	77	16.8	111	24.2	10	2.2	79	17.2	2	0.4	80	17.5	13	2.8	86	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Antidepresivos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Otros Psicotrópicos	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0		
Basuco o pasta base	5	100	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Cristal	18	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	2	11.1	0	0.0	15	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Flunitrazepan (Rohypnol)	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Crack	5	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
Refractil Ofteno	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

\* Cocaína. Basuco. Crack

\*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Mofina

\*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

## Cuadro C4

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas. Nayarit, México, 2007

Características	Global	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Cocaína	Heroína	Tabaco	Cristal
	n=57	n=34	n=3	n=10	n=24	n=1	n=36	n=3
<b>Sexo</b>								
Masculino	98.2	97.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Femenino	1.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Edad</b>								
5 - 9 Años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 Años	17.9	15.2	33.3	10.0	13.0	0.0	20.0	0.0
15 - 18 Años	82.1	84.8	66.7	90.0	87.0	100.0	80.0	100.0
<b>Escolaridad</b>								
Primaria	49.1	58.8	66.7	10.0	45.8	100.0	47.2	100.0
Secundaria	38.6	35.3	33.3	60.0	37.5	0.0	38.9	0.0
Prepa	1.8	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Licenciatura o posgrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No estudio	10.5	5.9	0.0	20.0	16.7	0.0	13.9	0.0
<b>Ocupación</b>								
Estudiante	17.9	14.7	0.0	11.1	20.8	0.0	14.3	66.7
Empleado	1.8	2.9	0.0	0.0	4.2	0.0	2.9	0.0
Subempleado	60.7	61.8	0.0	66.7	58.3	100.0	60.0	33.3
Hogar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ninguna	19.6	20.6	100.0	22.2	16.7	0.0	22.9	0.0
<b>Usa tatuajes</b>								
Sí	28.1	41.2	0.0	30.0	29.2	100.0	30.6	0.0
No	71.9	58.8	100.0	70.0	70.8	0.0	69.4	100.0
<b>Ha pertenecido a una banda</b>								
Sí	7.0	5.9	33.3	0.0	12.5	100.0	2.8	0.0
No	93.0	94.1	66.7	100.0	87.5	0.0	97.2	100.0
<b>Infracción bajo intoxicación</b>								
Sí	36.8	50.0	66.7	50.0	41.7	0.0	33.3	66.7
No	63.2	50.0	33.3	50.0	58.3	100.0	66.7	33.3
<b>Tipo de infracción</b>								
Robo	71.9	67.6	100.0	90.0	66.7	0.0	69.4	33.3
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Homicidio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lesiones a terceros	5.3	8.8	0.0	0.0	8.3	0.0	5.6	0.0
Daños en propiedad ajena	7.0	5.9	0.0	10.0	4.2	0.0	11.1	0.0
Secuestro	1.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Delitos contra la salud	10.5	8.8	0.0	0.0	16.7	100.0	13.9	33.3
Consumo de drogas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Portación de arma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	3.5	5.9	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	33.3
<b>Lugar de la infracción</b>								
Vía pública	59.6	55.9	66.7	70.0	50.0	100.0	66.7	100.0
Hogar	31.6	35.3	0.0	30.0	37.5	0.0	27.8	0.0
Trabajo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escuela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aeropuerto internacional (aduana)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugar de recreo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	8.8	8.8	33.3	0.0	12.5	0.0	5.6	0.0

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007

**Cuadro C5**


Mortalidad por causas múltiples al consumo de sustancias psicoactivas. Nayarit, México, 2006

CIE	10a Rev. Causa	No de muertes	Tasa por un millón de hab.
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol.	60	59.8
F11	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos.	0	0.0
F12	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides.	0	0.0
F13	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos	0	0.0
F14	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína.	1	1.0
F15	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína.	0	0.0
F16	Trastornos mentales y del comportamientos debido al uso de alucinógenos.	2	2.0
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco.	41	40.8
F18	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles.	1	1.0
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos y al uso de otras sustancias psicoactivas.	6	6.0
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	50	49.8
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0.0
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte.	0	0.0
X62	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0.0
X85	Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas	0	0.0
Y11	Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada.	0	0.0
Y12	Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	0	0.0
Y15	Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada.	0	0.0

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2006, DGE/SSA

**Figura C1**

Tendencias en el consumo de drogas alguna vez en la vida para la población que acude a Centros de Tratamiento. Nayarit, México







**Cuadro C8**

Tendencias de la droga de inicio en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales. Nayarit, México

Droga inicio	Año					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	33.1	40.5	33.2	36.5	39.1	48.0
Mariguana	8.4	11.2	12.2	15.0	13.8	13.7
Inhalables	0.6	0.7	1.5	2.6	2.2	1.5
Alucin	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1
Heroína	0.6	0.0	0.4	0.9	0.2	0.1
Opio/morf	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Cocaína	1.7	1.3	2.0	2.7	4.1	3.3
Tranq	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5
Anfeta	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
Tabaco	54.8	44.9	49.0	40.8	38.4	30.7
Cristal	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	1.2
Crack	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticoli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Antidepre	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Basuco	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.3
Rohypnol	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

**Cuadro C9**

Tendencias de la droga de impacto en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales. Nayarit, México

Droga impacto	Año					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	29.2	30.8	27.7	28.1	32.0	40.0
Mariguana	24.3	18.1	19.8	18.8	14.9	14.1
Inhalables	1.8	2.7	3.9	3.5	3.5	2.5
Alucin	1.0	2.6	0.2	0.2	0.1	0.3
Heroína	7.8	4.8	6.3	6.3	5.0	2.1
Opio/morf	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1
Cocaína	15.5	19.7	16.3	13.6	13.2	9.6
Tranq	2.6	1.2	0.9	0.4	0.5	0.7
Anfeta	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5
Tabaco	2.8	0.7	1.2	1.2	2.8	8.0
Cristal	1.8	3.3	10.1	16.4	14.4	13.9
Crack	11.9	15.2	12.6	10.6	10.3	6.5
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Anticoli	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
Otros	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
Basuco	0.5	0.1	0.3	0.3	2.7	1.5
Rohypnol	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1

---

Encuesta Nacional de Adicciones 2008  
Resultados por entidad federativa, Nayarit

---

Se terminó de imprimir en Junio del 2009.  
La edición consta de 200 ejemplares y estuvo al cuidado  
de la Subdirección de Comunicación Científica  
y Publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública.

